




Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.1.5.45





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.1.5.45



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.1.5.45




Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.1.5.45

Ala. 1/5.



Ex Libris Joannis Nenoini
1874

LIBRARY
FIRENZE
INT.
EVCINI



IN HOC VOLUME HAEC
CONTINENTVR.

AVRELII CORNELII CELSI MEDICINAE
LIBRI. VIII. QVAM EMENDATISSIMI,
GRAECIS ETIAM OMNIBVS
DICTIONIBVS RESTITVTIS.

QVINTI SERENI LIBER DE MEDICINA
ET IPSE CASTIGATISS.

ACCEDIT INDEX IN CELSV, ET SERENVM
SANE QVAM COPIOSVS.



*Venetorum decreto, ne quis aliquo in loco Venet. & ditionis
hos libros imprimat, impressos ne alibi
vendat, cautum est.*

AMPLISSIMO, ET MERITISSIMO HERCV-
LI GONZAGAE .SS. ROMANAE SEDIS
CARDINALI IOANNES BAPTI-
STA EGNATIVS VENETVS.

c Vm multa, & ampla sunt ea, quae Principes viros, cuiq;
similes illustrare maxime solent: tum nihil maius aut
honestius, quam cum bonarum artium studiosos homines
exornant: & bonas literas omni studio, atq; opera in lu-
cem prodire contendunt siue q; is semper literarum Genius fuit, ut
augustissimus merito iudicetur: siue q; si doctorum hominum discipli-
nam negligas: veluti solem de caelo sustuleris, omnis hominum vita
in tenebris sit futura. Fecit hoc ipsum patrum nostrorum memoria
summa sua cum laude senior Alphonsus, qui cum propria virtute re-
gnum Neapolitanum armis sibi quaeisset, ad pacis studia conuersus,
omnes eius aetatis viros, qui doctrinae aliquod specimen praesferret,
miru in modum est complexus. Eandem propensionem literas fomen-
di secutus no multo post Nicolaus Quintus Pont. Max. est. ut incredi-
bile dictu sit quantum breui licet eius Potificatu profecerint bonae lite-
rae: ut si uerum fateri uelis, huic uni plus debeamus Potifici, q; omnibus
alijs, qui aut multis ante illum floruerint annis: aut qui ad huc die nixe-
re in Barionae sede Pontificibus. Ceterum obscurauit penè hanc cla-
rissimorum Principum beneficentiam Laurentius Medices perpetuus
Florentinae Reip. dictator. qui uitam, paternamq; laudem emula-
tus prouehendi ueteres disciplinas, & artes, magno studio, & im-
pensa primu bibliothecam copiosissimam comparandam iussit: qua
do sine mutis hisce magistris, qd aiunt, aut paru, aut certe nihil profici-
mus: tum doctissimos viros quotquot tera Italia id tepestatis alebat,
ad sese euocandos curauit. quos et praemijs longe maximis inuitaret:
& ad ocium hoc literarium ita inflammaret, ut nihil omnino his
deesse pateretur. Et quoniam Principum, ac Regum exempla pluri-
mum in utraq; partem ualent: non defuit eadem tempestate Prin-
ceps bellicae gloria clarissimus Fridericus Vrbinas, qui Laurentijs splen-
dore uicini, et amicissimi Principis cum exarsisset: eandem emulatus
laudem, no paruum librorum copiam, & praecipue qui ad sacra re-
spectant, comparauit: & a sole, puluerq; martio saepe in spatia, atq;
ambulacra philosophorum diuerterit. Vt quicquid illi a bellicis arti-
bus erat ocij, id totum familiaribus doctorum hominum sermonibus
libenter impederet. Sed enim nec Gonzagae tui minus operae semper
huic uni dedere rei, quam bellicis rebus, quibus maxime florere. Na

sub initia renascentium literarum, quæ sexcentissimum iacuerant
 annum in tera Italia, Victorinum Feltrensem sibi adsciuere. cuius
 doctrinam regij adulescentes uestri iam tum à primis annis imbibe-
 rent. Tu uero ut uideo cum alijs artibus maiorum tuorum adæquas
 laudem: tum hac una literarū, et doctorū hominum exornandi cura
 superare contendis. qui summo studio iam ab annis adolenscentiæ do-
 ctissimum quensq; in familiam adsciuisti tuam: magnisq; semper
 præmijs ornasti. Nam ut omittam Tarnum merito abs te semper ho-
 nestatum: Romulum certe sic complexus ab initio es, ut non prius
 desisteris, q̃ illum studiorum tibi perpetuum asciueris comitem. quæ
 laus eò maior est, q̃ et temporum hæc iniquitas etiam octosissimos
 homines ab literis auocat: et Romulus cum honestissime Bononiæ pro-
 fiteretur, maluit tamen te sequi: et tecum, ut cum optimo Principe,
 conuiescere. non dubitans quin ingrauescens eius ætas sub te Prin-
 cipe uiro efflorescere etiam possit. sed quid ego dicam quanto studio
 Franciscum Afulanum tibi addictissimum feceris? qui hereditariam
 Aldi laudem secutus, nihil nõ egit ut bonæ literæ cum græcæ, tum la-
 tinæ in dies maiorem recipiant cultum. Et ille quidem cum noctes
 ac dies hanc curam animo coqueret: accessit mox authoritas, ampli-
 tudoq; tua: quæ currentem, quod aiunt, equum fortius ad cursum ex-
 citaret. Nam cum alia in tui unius gratiam suscepit: tum Celsi Cor-
 nelij de medicina libros longe utilissimos, et elegantissimos inuulgan-
 dos recepit. quod eo libentius suscepit, q̃ abs te imprimis codicē sanè
 castigatū statim acceperit. id oneris ut scilicet Celsus q̃ emendatissimus
 publicum acceperet: non quod ego unus omnium doctissimus, sed q̃
 Franciscus, et familie, et Aldi præsertim nomini maxime semper fã-
 ni: suscepi non inuitus: idq; , uti spero, non atris auibus præstisse me
 confido: ut docti etiam homines libenter hosce Celsi libros legant: in-
 docti non aspernentur. Quod opus tui unius auspicijs in lucem cum
 prodeat, tuum patrociniū merito exposcit. huic addidimus. Q. se-
 reni poemā non inutile: in quo uates ille non infeliciissimus et morbos
 aliquot, et morborum remedia complexus est. hoc ipsum cum lege-
 nix posset, legent hodie ni fallor, docti hoies et perlibenter, et incun-
 de. Ego uero quicquid opellæ in Celso emendando impendi, id ipsum
 tibi nuncupo: qui uirtutis tuæ amplificator, oēm meam industriā uni
 tibi ppetuo antea dicarā. Testatū tamē apud te relinquens, q̃ si plus
 ocij datū mihi esset, i magnis occupationibus profitēdi uersanti, efficas-
 sem ut Cornelius nõ dicā nitidior, certe amabilius oculus prodiret. quā
 do breues notulas uocabulorū, sensuum etiam obscuriorū, græcarum
 etiā dictionum interpretamēta instituerā. Quin et ex Galeno, Hip-

pocrateq; multa adtexere decreuerā: ut nostrates medici cum Hippo-
crate intelligerent penē à Cornelio in linguam latinam uersum, li-
bentius multo illum legerent. Cornelij Celsi Fabius, quod sciam, ex
ueteribus tantum meminit, laudās hominis industriam, q̃ cum Lenata
rhetorice multo q̃ ante illum alij accuratius explicari. sed & idem
Sceptios imitatus, non parum multa summo cum nitore, & cultu scri-
psit. artē quoq; militare, & disciplinas ferē græcis omnes ample-
xus, eas latine loqui docuit. & ex his medicinam omnium nostratum
princeps ita absoluit: ut æmulari potius multi, q̃ assequi parem laudē
possint. Bene, ac feliciter Vale.

QVÆ TOTO OPERE CONTINENTVR.

Proœmium.	pagina.	1	De notis, quas aliquis in singu-
Quemadmodũ sanos agere			lus morborum generibus ha-
conueniat.	5		bere possit.
Quæ stomacho imbecilli ser-			15
uanda sint.	6		Quæ notæ in quoq; morbi gene-
Observationes quædã prout res			re, uel spem, uel pericula o-
nonne accidunt: Et prout corpo-			stendant.
rum genera, Et sexus, Et æta-			17
tes, Et tempora anni sunt.	6		De morborum curationibus.
De his, qui aliqua parte corporis			20
laborant: Et primum de his,			De sanguinis detractione per
quibus caput infirmum est.	9		uenas.
De his qui lippitudine, grauedi-			20
ne, defillatione, tonsillisq; la-			De sanguinis detractione per
borant.	9		cucurbitulas.
Ad solutam aluum remedia.	9		21
Remedia ad coli dolorem.	9		De deiectione.
Quæ agenda sint stomacho			22
laborantibus.	10		De uomitu.
Quid obseruandum sit dolore			22
neruorum laborantibus.	10		De frictione.
Observatio in pestilentia.	10		23
			De gestatione.
			24
			De abstinentia.
			24
			De sudore.
			24
			Qui cibi, potiones'ue, aut ualen-
			tis, aut medicæ, aut imbecillæ
			materiæ sint.
			25
			Quæ natura, ac proprietas cu-
			iusq; rei sit, qua nescimur.
			26
			Quæ res boni succi sint.
			26
			Quæ res mali succi sint.
			26
			Quæ res lenes, quæ'ue acres
			sint.
			26
			Quæ res crassiorem, quæ'ue te-
			nuuiorem pituitam faciunt.
			26
			Quæ res stomacho idoneæ
			sunt.
			26
			Quæ res alienæ stomacho
			sunt.
			27
			Quæ inflant, aut inflationem
			lenant.
			27
			Quæ res aut calefaciunt, aut
			refrigerant.
			27
			Quæ res intus facile uitiantur,
			uel minime corrumpuntur.
			27

Quæ res aluum mouent. 27
Quæ res aluum astringunt. 27
Quæ res urinam mouent. 28
*Quæ res somnum mouet, aut
 sensus exatant.* 28
*Quæ res corpus aut erodât, aut
 reprimant, aut refrigerent, aut
 calefaciant, aut durent, aut
 emolliant.* 28

LIBER TERTIVS.

De morborum generibus. 29
*Quomodo morbi cognoscantur:
 Et an incrementum, an consistant,
 an minuantur: Et qua ratione
 ab initio qui languere incipit,
 curari debeat.* 29
De febrium generibus. 30
*De curationum diuersis ge-
 neribus.* 30
*De febrium speciebus, Et singu-
 larum curationibus, Et primo
 quando abus febricitantibus
 dandus sit.* 32
*Quando portiones febricitanti-
 bus dari expediat.* 33
*Quando pestilentes febres cu-
 rari debeant.* 34
*Curatio semitertianæ febris, quæ
 hemitritæos dicitur.* 35
Curatio lentarum febrium. 35
*Remedia in febribus ad capitis
 dolorē, et præcordiorum inflā-
 mationem, et ariditatem, Et
 scabritiem lingue.* 35
*Remedia contra frigus, quod
 febrem præcedit.* 36
Curatio horroris in febribus. 36
Curatio cotidianæ febris. 37

Curatio tertianæ febris. 37
Curatio quartanæ febris. 37
Curatio duarū quartanarū. 37
*Curatio cotidianæ febris, quæ ex
 quartana facta sit.* 38
*De tribus insanie generibus: Et
 primo de eius curatione, quæ à
 græcis phrenitis dicitur.* 38
Cardiaci morbi curatio. 40
*De lethargo, Et eius curatio-
 ne.* 40
*De aqua inter cutem, hoc est hy-
 dropico morbo.* 41
*De tabe, Et eius speciebus, Et
 curationibus.* 42
*De comitialis morbi curatio-
 nibus.* 44
De regij morbi curatione. 44
De elephantia curatione. 45
*De attonitis, Et eorum cura-
 tione.* 45
*De resolutione nervorum: quæ apo-
 plesia, vel paralysis dicitur.* 45

LIBER QVARTVS.

*De humani corporis interio-
 ribus sedibus.* 47
*De curationibus morborū, qui na-
 scuntur à capite: Et primo de
 eius dolore: deinde de morbo, q-
 uæ circa faciem nascitur: tum de lin-
 guæ resolutione: postremo de de-
 stillatione, ac grauedine.* 48
*De morbo, qui circa faciem nasci-
 tur: quem græci cynicum spas-
 mum uocant.* 48
De resolutione lingue. 49
De destillatione, ac grauedine. 49
De cerniis morbis, curationi-

busq. 50
 De faucium morbis, ac curationi-
 bus, et primum de angina, de-
 inde de difficultate spirandi,
 ultimo de tussi. 50
 De difficultate spirandi. 51
 De tussi. 51
 De stomachi morbis, et cura-
 tionibus. 52
 De laterum doloribus. 53
 De viscerum morbis: et primo de
 pulmone, deinde de iocinere, tum
 de liene, postremo de renibus. 54
 De iocineris morbo, et cura-
 tione. 55
 De lienis morbo, et curatione. 55
 De renium morbis, et curatio-
 nibus. 55
 De intestinorum morbis, et
 primo de cholera. 56
 De coeliaco uentriculi morbo. 56
 De tenuioris intestini morbo. 57
 De morbo intestini plenioris. 57
 De torminibus. i. dysenteria. 57
 De leuitate intestinorum. 58
 De lumbricis aluum occupan-
 tibus. 58
 De tenasmo intestinorum morbo. 58
 De uetris fluxu, et curatione. 59
 De uulua morbo, et curatio-
 nibus. 59
 De nimia profusione seminis
 ex naturalibus. 60
 De coxarum morbis, et cura-
 tionibus. 60
 De genuum doloribus, et cura. 60
 De articularum doloribus in
 manibus, pedibusq. 61

LIBER QVINTVS.

De simplicibus facultatibus qua-
 runq; rerum, ex quibus me-
 dicamenta fiunt: et primo de his,
 quae sanguinem supprimunt. 62
 Quae uulnus glutinant. 62
 Quae coquunt, et mouet pus. 62
 Quae aperiunt uulnera. 62
 Quae purgant. 62
 Quae rodunt. 62
 Quae exedunt corpus. 63
 Quae adurunt. 63
 Quae crustas ulceribus inducunt.
 Quae crustas ulceribus resoluunt.
 Quae discutiant ea, quae in ali-
 qua parte corporis coierunt. 63
 Quae euocant, et educant. 63
 Quae exasperata leuent. 63
 Quae carnem nutriunt, et
 ulcus implent. 63
 Quae molliunt. 63
 Quae cutem purgant. 63
 De mixturis simplicium rerum,
 et de ratione ponderum, et
 quid malagma, et emplastrum,
 et pastillus inter se differat. 63
 De malagmatis. 64
 Malagma ad materiam extra-
 hendam. 64
 Malagma ad iecur dolens. 64
 Malagma ad lienem. 64
 Malagma ad laterum dolores. 64
 Malagmata ad resoluenda quae
 astricta sunt: et mollienda quae
 dura sunt: et digerenda quae
 coeunt. 65
 Aliud malagma ad eadem. 65
 Malagma moschi ad mollien-
 dum. 65

Malagma medi ad digerenda quæ coeunt.	65	matu, & strumam.	66
Malagma Panthemi ad ea- dem.	65	Malagma ad articulos.	67
Malagma ad strumas.	65	Malagma Aristonis aduersus po- dagras, et recentia phyma-	67
Aliud malagma ad id ualens.	65	ta, & omnis dolores.	67
Malagma ad strumam, & phymata.	65	Theoni malagma ad pedum dolores.	67
Malagma ad strumam, & tubera, & carinodas.	65	Numenij malagma ad podagrâ cæter. s; articulos indura- tos.	67
Malagma proterchi ad paroti- das, & faum, & mala ul- cera.	65	Dexij malagma si quando callus in articulis increuit.	67
Malagma aduersus panum, & phymata.	65	De emplastris.	67
Malagma aduersus phyma- ta.	66	Barbarum emplastrum nigrum, quod eruentis protinus uul- neribus iniicitur.	67
Malagma ad supprimendum omne quod abscedit.	66	Coscon emplastrum nigrum ad idem ualens.	67
Malagma ad sanguinem sup- primendū, & phymata.	66	Basilicon emplastrū nigrum ad idem.	67
Malagma ad carinodas, & phymata lenienda.	66	Smaragdinum emplastrum ad idem.	67
Malagma ad liuorem faciei contuse.	66	Emplastrū ruffum ad idē.	67
Malagmata stomachiat ad aperiendum.	66	Paracollecticum emplastrum ad idem.	67
Niconis malagma ad resoluē- dum, aperiendumq; ac pur- gandum.	66	Cephalicum emplastrū phi- lotæ capiti conueniens.	68
Malagma ad ossa, & neruos.	66	Emplastrum uiride ad idem ualens.	68
Malagma Euhylei ad articu- los, & ad omnem dolorē.	66	reſapapuanor emplastrū ad pus mouendum.	68
Malagma Sasogoræ ad dolo- res articulorum.	66	Enneapharmacum emplastrum ad pus mouendum, & ad purgandum ualens.	68
Chrysippi malagma ad idē ualens.	66	Attalum emplastrū ad uul- nera.	68
Clesipontis malagma ad idem ualens, & ad parotidas, et phy-		Iudæi emplastrum fracto ca- piti accomodatum.	68
		Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum.	68

Aliud

Aliud dicitur ad extrahendum, & pus mouendum. 68
 Philocratis emplastrum ad extrahendum, & pus mouendum. 68
 Iulianus ad extrahendum. 68
 Emplastrum Hecatei ad extrahendum. 69
 Alexandrinum emplastrum viride ad extrahendum. 69
 De emplastris exedentibus. 69
 Emplastrum quod exest corpus, & ossa resoluit: & super crescentem carnem coeret. 69
 Emplastrum aduersus morsus, & alia recentiora vulnera. 69
 Iulianus ad idem ualens. 69
 Aliud emplastrum ad idem ualens. 69
 Aponia emplastra non grauibus uulneribus accommodata, et maxime senilibus. 69
 Elephantinum emplastrum. 69
 Lenia emplastra. 69
 Emplastrum lene. 69
 Archagathi emplastrum lene. 69
 Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta. 70
 De pastillis, & primo de his, qui ad recentia vulnera glutinanda, sanandaq; apti sunt. 70
 Alius pastillus ad glutinanda vulnera. 70
 De sphragide pastillo, quem Polybus conficit, ad glutinandum uulnus. 70
 Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, ob-
 scenis partibus, inflammationesq; eorum. 70
 Pastillus andronis ad uiam inflammata, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia. 70
 Pastillus ad fissam anam, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum. 70
 Pastillus ad expellendum calculum cum urina. 70
 De pessis. 70
 Ad sanguinem euocandum. 70
 Ad uulnam molliendam. 70
 Alia pessi compositio ad idem ualens. 71
 Ad inflammationes uulue Numenij, Pessus. 71
 Ad eiciendum uulna infan- tem mortuum. 71
 Simulier uitio locorum concidit, qua curatione utendum sit. 71
 De medicamentis quibus aridis u- timur, ad carnem supercre- scentem exedendam. 71
 Ad putrem carnem continendam ne ultra serpat: eamq; leniter exedendam plures compositio- nes. 71
 Hieræ compositio. 71
 Iudæi compositio. 71
 Iolæ compositio. 71
 Ad sanguinis profluvia, uel ex membrana cerebri, uel alijs locis & ad cancerum, & ad inducendam cicatricem, & ad coer- cendam carnem crescentem. 71
 Timi compositio ad ignem sa- crum, uel cancerum. 72
 Ad sternutamenta excitanda. 72
 Gargarizationes quibus fieri de-

beant.	72	que maxime per tela infe-	
De antidotis, et quibus malis		runtur.	74
opitulentur.	72	Que vulnera isanabilia sint.	74
Compositio antidoti.	72	Que vulnera difficilem cu-	
Aliud antidotum Ambrosiano-		rationem habeant.	75
minatum, quod Zopyrus Pto-		Que vulnera tutiorem cu-	
lemæo regi composuit.	72	rationem habeant.	75
Antidotum Mithridatis.	72	Observationes quedam et ætu-	
De acopis.	72	tis, et corporis, et vitæ, et	
Acopum ad oculos nervis utile.	72	temporis in vulneribus.	75
Erxipisæ ad ulcera purganda,		Signa percussæ cordis.	75
et implenda.	73	Signa pulmonis icti.	75
Ad sacrum ignem.	73	Signa iocineris vulnerati.	75
De catapotijs.	73	Signa percussorum renium.	75
Catapotium valentis ad somnū.	73	Signa vulnerati lienis.	75
Catapotium ad plurimos dolores		Signa percussæ miluæ.	75
per somnum leniendos.	73	Signa percussæ cerebri, vel mem-	
Catapotium aliud ad multam		branzæ eius.	76
valens.	73	Signa percussæ stomachi.	76
Catapotium ad inducendū somnū:		Signa ieiuni intestini, et uentri-	
quod milua dolens prohibuit.	73	culi vulnerati, et aliorum	
Ad iecur sanandum.	73	intestinarum.	76
Ad finiendos dolores lateris.	73	Signa percussæ medullæ, que	
Ad thoracis dolores finiendos.	73	in spina est.	76
Catapotium Athenienis ad		Signa septi transversæ percussæ.	76
tussim.	74	Signa vesicæ vulneratæ.	76
Catapotium Heraclidis tarenti-		De sanguine, et sanie, et pure, et	
ni ad tussim, et somnū.	74	eorum speciebus quando ne me-	
Catapotium ad purganda ulcera		liora, deteriora ne sint.	76
in faucibus tussientibus.	74	Curatio aduersus profusionem	
Collice cassij medica.	74	sanguinis in vulneribus.	76
Ad infantem mortuum, aut se-		Curationes aduersus vulnereum	
cundas expellendas.	74	inflammationem.	77
Laborantibus ex partu quid		De glutinatione vulnereum.	77
dari debeat.	74	Quomodo vulnus ligari con-	
Ad adiuvandam vocem.	74	ueniat.	78
Aduersus difficultatē urinz.	74	De ratione uictus, et notis vul-	
Arteriace compositio quod fiat.	74	nerū, curationibusque eorū.	78
De quinque generibus noxarū cor-		Curatiōes propriæ articulorū.	78
poris, et primo de vulneribus,		Vulnus quomodo purgandum est.	79

Quo vulnus implendum est.	79	De carbunculo, et eius curatione.	83
De vulneribus, curationibusq;		De carcinomate, et eius cura.	84
eorum.	79	De Theriomate, et eius cura.	84
Curatio ulcers.	79	De sacro igne, et eius cura.	85
Curatio erysipelarum.	80	De Chironeo ulcere, et eius cu.	85
Curatio Gangrenæ.	80	De ulceribus, quæ ex frigore in	
Quomodo cicatrix vulnere indu-		pedibus, et manibus oriuntur,	
cenda, purgandaq; sit.	81	et eorum curationibus.	85
De vulneribus, quæ p morsus in-		De struma, et eius curatione.	86
feruntur, eorūq; curationibus.	81	De furunculo, et eius curatione.	86
Curatio aduersus rabiosi canis		De phymate, et eius cura.	86
morsum.	81	De phygeto, et eius curatione.	86
Curationes communes aduersus		De fistulis, et earum generibus,	
omnes morsus serpentium.	81	et curationibus.	87
Speciales curationes aduersus		De melicera.	88
ictus serpentium, et primo aduer-		De Acrochordone, et Thymio, et	
sus ictum Aspidis.	82	Myrmecio, et Clauo, curationi	
Aduersus ictum scorpionis.	82	busq; eorum.	88
Aduersus aranei, et scorpio-		De pustularum generibus, et	
nis ictum.	82	earum curationibus.	89
Aduersus Cerastris, et Dipsæ, et		De scabie, et eius curatione.	89
Hæmorrhoidis ictum.	82	De impetiginis speciebus, et	
Aduersus Chersydri ictum, et		curationibus.	90
cerastris.	82	De papulis, et earū curatione.	90
Aduersus Phalangij ictum.	82	De vitiliginis speciebus, idest de	
Aduersus ictus italorum anguū, q		Alpho, et Mela, et leuce, et	
minus terribiles pegris sunt.	82	earum curatione.	90
Remedium generale aduersus			
omnia uenena.	83		
Specialia remedia aduersus quæ			
dam uenena, et primo ad-			
uersus cantharidas.	83		
Aduersus cicutam.	83		
Aduersus hyoscyannum.	83		
Aduersus cerussam.	83		
Aduersus sanguisugam si epota			
est, et lac quod intus coijt.	83		
Aduersus fungos inutiles.	83		
De adultis corporis locis, et quo-			
modo curari debeant.	83		

LIBER SEXTVS.

De capillis fluentibus.	91
De porrigine, et eius curatione.	91
De syphi, et eius curatione.	91
De Areis, et earū curationibus.	91
De Varis, et Lenticulis, et Ephe-	
lide, et eorū curationibus.	91
De oculorum morbis, curationi-	
busq; eorum: et primo de his	
morbis, qui lenibus medicamen-	
tis curantur.	92

De diuersis oculorū collirijs.	93	curationibus.	96
Philonis collirium.	93	Hermionis collirium.	96
Dionysij collirium.	93	De catarricibus oculorum, quæ ex	
Cleonis collirium.	93	ulceribus factæ sunt: & quomo	
Theodoti collirium, Archari-		do curari debeant: & de Ascle	
stum appellatum.	93	pia, & Canopite, & Pyxino	
Cythion, uel tephriion colliriū.	93	collirijs.	96
Euelpidis collirium, trygodes		De alio genere inflammatio-	
nominatum.	93	nis oculorum,	96
Nilei collirium omnium opti-		Cæsarianum collirium.	97
mum.	94	Hieracis collirium.	97
De carbunculis oculorum, &		De Xerophthalmia.	97
eorum curatione.	94	Rhinion collirium.	97
De pustulis oculorum, & cu-		Ad oculos scabros colliria.	97
ratione earum.	94	Ad caligantem oculorum, quæ	
πρασινού's collirium ad pu-		propter lippitudinem oritur	
stulas oculorum.	95	remedia, & colliria.	97
De ulceribus oculorum, & eorū		πράσινον collirium.	97
curatione, & de δια βανάριον		Ad caligantem oculorum, quæ	
collirio.	95	propter senectutem, aut alia	
Curatio oculorum aliquo ca-		imbecillitate fit.	98
su immutatorum.	95	De suffusione oculorum.	98
De pediculis palpebrarū.	95	De resolutione oculorum, quæ	
De oculorum grauioribus mor-		paralysis dicitur.	98
bis, qui ex inflammationibus oriū		De mydriasi oculorum.	98
tur: & ualidioribus medicamen-		De imbecillitate oculorum.	98
tis curantur, & de Andreae col-		Ad oculos qui extrinsecus offen-	
lirio, & de δια νέπατος.	95	duntur: cum sanguine suffu-	
Memigmenon Euelpidis colli-		si sunt.	98
rium.	95	De aurium morbis, & cura-	
De oculorum ulceribus supercre-		tionibus.	99
scantibus, sordidis, cauis, ueteri-		Aduersus aurium uermes.	100
bis, & de curationibus singu-		Ad compressa aurium fora-	
lorum.	96	mina.	100
σφαιρίον collirium.	96	Ad grauem auditum.	100
Phynon collirium Euelpidis.	96	Ad sonitum aurium intra se	
Sphæriion collirium Euelpi-		ipsas.	100
dis.	96	Ad ea, quæ in aurem inciderunt	
Liquidum Euelpidis colliriū.	96	extrahenda.	100
De canis oculorum ulceribus, &		De narium morbis, & curatio-	

nibus.	101	LIBER SEPTIMVS.
De dentium dolore, & cura- tionibus.	101	De chirurgica, & qui in ea cla- ruerint: & qualis esse chirur- gus debeat: & quid in hoc li- bro describatur.
De tonsillis, & earũ cura.	102	108
De oris ulceribus, & curationi- bus, & quæ antheræ sint.	102	De luxatis.
De gingivarum ulceribus.	103	108
De unæ morbo, et curatione.	103	De his, quæ per se intumescunt quomodo exadenda, & curan- da sunt.
De cancro oris.	104	108
De parotibus, quæ sub auribus oriuntur.	104	De bonis, malis, & signis exulce- ratorum.
De umbilici prominentis cura- tione.	104	109
De obscenarum partium uicijs, et curationibus.	104	De fistulis.
De colis morbis, & curatio- nibus.	104	109
De canceri, qui in colle nasci- tur, curatione.	105	De ani fistulis.
De phagedænæ in cole nascentis curatione.	106	110
De carbunculo, qui in cole na- scitur.	106	De telis è corpore extrahendis
De testiculorũ morbis, & eo- rum curatione.	106	110
De rhagadijs, & Condylomate, & hæmorrhoidibus, alijsq; ani morbis, & curationibus eorũ, & primo de rhagadijs.	106	De ganglijs, & meliceride, & a- theromate, & steatomate capi- tis tuberculis.
De condylomate.	106	111
De hæmorrhoidibus.	107	De oculorum uicijs quæ scalpel- lo, & manu curantur.
Si anus, uel os uulnæ procidit, qua curatione utendũ sit.	107	112
De ulcere fungo simili i ano.	107	De crithæ tuberculo palpebra- rum.
De digitorum ulceribus.	107	112
		De chalaſia palpebrarũ.
		112
		De ungue oculorum, quod mēp- uor à græcis uocatur.
		112
		De enchanti tuberculo.
		113
		De ancyloblepharo oculorum uicio.
		113
		De ægylopa fistula oculorũ.
		113
		De pilis palpebrarum oculum irritantibus.
		113
		De lagophthalmo oculorum.
		114
		De ectropio.
		114
		De staphylomate oculi.
		114
		De clauis oculorum.
		115
		De natura oculorum, & eorum suffusione.
		115
		De pituita oculorum.
		116
		De aurium morbis, qui manu, et scalpello curantur.
		116

Curta in auribus, labrisq; ac na-	Et de calculo, curationibusq;	
ribus, quomodo sanari, Et cura	eorum.	125
ri possint.	Que curatio calculosis adhi-	126
De polypi curatione p ferru.	beat.	126
De ozena.	Signa calculorum, uel harenoso-	127
De ore uicijs, quæ manu, Et fer-	rum, uel mollium.	127
ro curantur.	De calculis foeminarum.	127
De dentibus.	Quæ curatio calculo emulso ha-	128
De uua.	benda sit.	128
De lingua.	De cancro qui excisa uescia nasci-	128
De abscessu sub lingua.	tur, et qua cura uti deceat.	128
De labris.	Si naturalia foeminarum concu-	129
De cernicis uicijs, et curatiõe.	bitum non admittunt, quomo-	129
De umbilici uicijs.	do curari conueniat.	129
Quomodo aqua hydropicis	Quæ curatione partus emortuus	130
emittatur.	ex utero excutatur.	130
De intestinorum uulneratorum	De ani uicijs, Et eorum cura-	130
curationibus.	tione.	130
De interiore parte abdominis ru-	De condylomatum curatiõe.	131
pta, Et qua ratione curanda	De uaricum curatione.	131
sit.	Curatio digitoru coherentiũ.	131
De uariabus uentris.	De atngrenæ curatione.	131
De testiculorum natura, Et mor-		
bis eorum.	LIBER OCTAVVS.	
De testiculoru curatiõibus cõibus,	De positu, Et figura totius huma-	
Et primo de incisione, Et cura	ni corporis.	132
tione inguinis, uel scroti.	Ossa uiciata, Et corrupta quibus	
De intestini curatione.	signis cognoscantur: Et qua	134
De omenti curatione.	ratione curentur.	134
De ramcis curatione.	Quomodo os excidatur, et de mo-	
De carne, quæ iter tunicas testicu-	diolo, Et terebra ferramentis	
lorum concreuit: Et de nervo	ad id paratis.	135
indurato.	De caluarie curatione.	136
De ramice inguinis.	De narium fracturarum curatio-	
Ad tegendam glâdem colis si nu-	ne.	138
da est.	De auriu fractaru curatiõe.	138
Quomodo glans penis contracta	De maxillæ fractæ curatione:	
aperiri possit.	deq; quibusdam ad omnia ossa	
Infibulandi ratio.	pertinuitus.	138
De urinae reddendæ difficultate,		

beinguli fracti curatione. 139

De costarum fractarum cura-
tione. 139

De spine curatione. 140

De humerorum, brachiorum, fe-
morum, crurum, digitorum fra-
ctorum, uel emulorum, commu-
nibus curationibus. 140

De fracti humeri curatione. 141

De brachij fracti curatione. 141

De crurum, femorumq; fracto-
rum curatione. 142

De fracti digiti curatione. 142

Comunes curationes ad humeros,
brachia, crura, femina, digitosq;
confractos pertinentia. 142

De luxatis ossibus. 143

De maxillæ luxatæ curatione. 144

De capite luxato. 144

De spine luxata. 144

De humero luxato. 144

De cubiti luxati curatione. 145

De manu luxata. 145

De palma. 145

De digitis. 146

De femore. 146

De genu. 146

De tulo. 146

De planta. 147

De digitis. 147

INDEX QUINTI SERENI.

Capiti medendo. 149

Hemicranio medendo. 149

Porrigini depellendæ. 149

Capillo tingendo. 149

Phthiriasi arcendæ. 149

Prurigni, papulis, et scabiei ar-
cendis. 150

Frenesi, ac capiti purgando. 150

Fluori capillorum, et maculis
capitis tollendis. 150

Frigori sedando. 150

Elephantiasi propellendæ. 150

Cutis, et faciei uitij propellen-
dis. 150

Aurium uitij succurrendis. 151

Oculorum dolori mitigando. 151

Dentium uitio, et oris factori
medendo. 152

Vulvæ faucibus, et quæ mollienda
sunt medendis. 152

De rigore cervicis. 152

Tussi, et coleribus medendis. 152

Digestioni, et stomacho. 153

Felli uomitu, uel phthiriasi arcen-
dis. 153

Mammis sanandis, uel stringen-
dis. 153

Reiectioni cibi, aut sanguinis ab-
stinendæ. 153

Iecoris, et lateris uitij meden-
dis. 154

Spleni curando. 154

Præcordijs sanandis. 154

Libus, et renibus sanandis. 154

Ventris dolori mitigando. 155

Hydropisi depellendæ. 155

Ventri molliendo. 155

Solutioni uentris, & dysenteriae compescenda.	156	Comiciali morbo medendo.	162
Lumbricis, & tinea purgan- dis.	156	Regio morbo expellendo.	162
Colo sedando.	156	Dentibus, uel strigis inquietatis infantibus.	162
Vesicae, & calculo purgando: & urinae prouocandae.	156	Combusturis igne, uel frigore factis.	162
De conceptione, & partu.	157	Venenis prohibendis.	162
Proflusio cuiusq; sanguinis, & matri.	157	Venenis datis.	162
Pilis quibuscunq; interneandis, quae oculos impediunt.	157	Vulneribus, & rei dubiae cu- randis.	163
Omnibus obscenis medendis.	157	Verrucis tollendis.	163
Scies, & articulari morbo.	158	Hæmorrhoidis medendis.	163
Furunculo medendo.	158	Paralysi depellendae. primo die ita agendum.	163
Carboni medendo.	158	Secunda ita medendum est.	163
Pani, uomicae, & strumae depel- lendis.	158	Tertia die ita curandum est.	163
Igni sacro medendo.	159	Quid quarta die, & reliquis peragendum sit.	164
Podagrae depellendae.	159		
Vulneribus ferro, aut uerberi- bus factis.	159		
Vulneribus quibuscunq; casibus actis.	159		
Ab homine, uel simia morsus	159		
Serpentum moribus, & uenenis pellendis.	159		
Ictibus scorpij, & moribus mu- ris caeci, uel aranei.	160		
Subitaneo dolori, feбри, atq; ostho- wpo.	160		
Ad Typum quartanae.	160		
Ad Typum tertianae.	161		
Ad Typum quotidianae.	161		
Hemitritæo depellendo.	161		
Fracturis, & luxis sanandis.	161		
Neruis inactis, & dolentibus, atq; contractis.	161		
Aegris somno asciscendo.	161		
Lethargiae expellendae.	162		

AVRELII CORNELII CELSI ARTIVM
LIBER SEXTVS, IDEM MEDI-
CINAE LIBER PRIMVS.

T alimenta sanis corporibus agricultura, sic
sanitatem aegris medicina promittit. haec qui-
dem nusquam non est. siquidem etiam im-
peritissimae gentes herbas, aliq; prompta in
auxilium vulnerym, morborumq; nouerunt.
Veruntamen apud Graecos aliquanto magis,
quam in caeteris nationibus excolta est. ac ne
apud hos quidem à prima origine, sed paucis ante nos saeculis: ut po-
te cū uetustissimus author Aesculapius celebretur. qui quoniam adhuc
rudem, et uulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deo-
rum numerum receptus est. huius deinde duo filij Podalirius, et Ma-
chaon bello troiano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrē opē
commilitonibus suis attulerunt. quos tamen Homerus non in pestilen-
tia, neq; in uarijs generibus morborum aliquid attulisse auxilij: sed
vulneribus tantūmodo ferro, et medicamentis mederi solitos esse pro-
posuit. ex quo apparet has partes medicinae solas ab his esse tentatas:
easq; esse uetustissimas. Eodemq; authore disci potest morbos tum ad
iram deorum immortalium relatos esse: et ab iisdem opem posci so-
litam. ueriq; simile est inter nonnulla auxilia aduersae ualitudinis,
plerunq; tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neq; dese-
dia, neq; luxuria tentant. si quidem haec duo, corpora prius in Grae-
cia, deinde apud nos affligerunt. Ideoq; multiplex ista medicina neq;
olim apud Graecos, neq; apud alias gentes necessaria, uix aliquos ex
bonis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos, de quibus
reuli, nonnulli clari uiri medicinam exercebant, donec maiore stu-
dio literarum disciplina agitari coepit. quae ut animo praecipue omnium
necessaria, sic corpori inimica est. Primoq; medendi scientia sapientiae
pars habebatur. ut et morborū curatio, et rerum naturae contem-
platio sub iisdem authoribus nata sit. scilicet his hanc maxime requi-
rentibus, qui corporū suorū robor a quietā cogitatione, nocturna q; ui-
gilia minuerant. Ideoq; multos ex sapientiae professoribus peritos, eius
fuisse accipimus. clarissimos uero ex his Pythagorā, et Empedoclem,
et Democritum. huius autem, ut quidā crediderunt, discipulus Hip-
pocrates Coss. primus quidē ex omnibus memoria dignus, ab studio
sapientiae disciplinam hanc separauit: uir et arte, et facundia insi-
gnis. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras, et Chrysippus,
Aurelij Cor.

LIBER

tum Herophilus, et Erasistratus sic artem hanc exercuerunt, ut etiā in diuersas curandi vias processerint. Iisdemq; temporibus in tres partes medicina diducta est, ut una esset quæ victu, altera quæ medicamento, tertia quæ manu mederetur. Primā διατροφήν, secundā φαρμακωτικήν, tertiam χειρουργικήν Græci nominauerunt. Eius autē quæ victu morbos curat longe clarissimi authores etiam altius quædam agitare conati, rerum quoq; naturæ sibi cognitionem uendicauerunt, tanquam sine ea trunca, et debilis medicina esset. Post quos Serapion primus omnium nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinā professus, in usu tantum, et experimentis eam posuit. quem Apollonius, et Glaucias, et aliquanto post Heraclides Tarentinus, et aliqui non mediocres uiri secuti, ex ipsa professione se etiam prius appellauerunt. Sic in duas partes ea quoq; quæ victu curat, medicina diuisa est: alijs rationalem artem, alijs usum tantum sibi uendicantibus. nullo uero quicq; post eos, qui supra comprehēsi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi rationē ex magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse quoq; quædam in senectute deflexit. Et per hos quidem maxime uiros salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus medicinæ partibus ut difficillima, sic etiam clarissima est ea, quæ morbis medetur: ante omnia de hac dicendum est. Et quia prima in ea dissensio est, quod alijs sibi experimentorum tantummodo notitiā necessariā esse contendunt: alijs nisi corporum, rerumq; ratione comperta, non satis potentem usum esse proponunt: indicandum est quæ maxime ex utraq; parte dicantur: quo facilius nostra quoq; opinio interponi possit. Igitur hi qui rationalem medicinā proficiunt, hæc necessaria esse proponunt. abditarum, et morbos continentium causarū notitiā, deinde euentium: post hæc etiam naturalium actionum nouissime partū interiorū. Abditas causas uocant in quibus requiritur ex quibus principijs nostra corpora sint: quid secundam, quid aduersam ualēdinem faciat. Neq; enim credunt posse eum scire quomodo morbos curare conueniat, qui unde hi sint, ignoret. Neq; esse dubiū, quin alia curatione opus sit, si ex quatuor principijs uel superans aliquid, uel deficiens aduersam ualēdinem creat: ut quidam ex sapientie professoribus dixerunt. Alia si in humidis omne uitium est, ut Herophilo uisum est. alia si in spiritu, ut Hippocrati. alia si sanguis in eas uenas, quæ spiritui accommodatæ sunt, transfunditur: et inflammationem quam Græci φλεγμὴν nominant, excitat: eaq; inflammatio talem motum efficit, qualis in febre est: ut Erasistrato placuit. alia si manantia corpuscula per inuisibilia foramina subsisten-

do iter claudunt: ut Asclepiades contēdit. Eum uero recte curaturū, quem prima origo causae non fefellerit. Neque uero insiciantur experi-
menta quoque esse necessaria. sed ne ad haec quidē adiūm fieri potuisse, nisi ab aliqua ratione contendunt. Non enim quidlibet et antiquiores uir os
aegris inculcasse: sed cognasse quod maxime conueniret: et id usque ex-
plorassee, quod ante coniectura aliqua duxisset. neque interesse an initia per-
rasque explorata sint, si a consilio tamen coeperunt. et id quidē in mul-
tis ita se habere. Saepē uero ēt noua inuadere genera morborū, in quibus
nihil adhuc usus ostenderit. et ideo necessariū sit animaduvertere
unde ea coeperint, sine quo nemo mortaliū reperire possit, cur hoc,
quā illo potius utatur. et ob haec quidē in obscuro positae causas per-
sequuntur. Euidentes uero has appellant, in quibus querunt initium mor-
bi calor attulerit, an frigus. famus, an satietas. et quae similia sunt. Oc-
cursum enim uitio dicunt eum, qui originē non ignorarit. Naturales
uero corporis actiones appellat, per quas spiritū trahimus, et emitti-
mus cibum: potionemque, et assumimus, et concoquimus. Idemque per quas
eadē haec in omnes membrorum partes digeruntur: tum requirunt et
quare uenae nostrae modo submittant sese: modo attollant. quae ratio
somnia, quae uigiliae sit. sine quorum notitia neminem putant uel occur-
rere, uel mederi morbis, inter haec nascentibus, posse. Ex quibus quia
quā maxime pertinere ad rem concoctio uidetur. Huic potissimum in-
stituunt: et duce alij Erasistrato atteri cibū inuenire contendunt. alij Pli-
stonico Praxagorae discipulo putrescere. Alij credunt Hippocrati per
calorem cibos concoqui. Acceduntque Asclepiadis amuli, quod omnia ista uia
na, et superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudā mate-
riā, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et haec quidē inter eos
parū constant. Illud uero cōuenit, alium dandū cibum laborantibus, si
hoc: alium si illud uerū est. Nam si teritur intus, eum querendū esse,
qui facillime teri possit. Si putrescat, eū in quo hoc expeditissimū est.
Si calor concoquit, eū qui maxime calorem moueat. At nihil ex his eē
querendū, si nihil concoquitur. Ea uero sumenda, quae maxime manēt,
qualia assumpta sunt. Eadēque ratione cū spiritus grauis est, cū somnus
aut uigilia urget, eū mederi posse arbitrantur: quod prius illa ipsa, quali-
ter eueniant, peperit. Praeter haec cū in interioribus partibus et dolores,
et morborū uaria genera nascantur, neminē putant his adhibere posse
remedia, quae ipse ignoret. Necessariū ergo esse inuadere corpora mor-
tuorum: eorumque uiscera, atque intestina scrutari. Longeque optime fecisse Hiero-
philū, et Erasistratū, quod nocētes homines a regibus ex carcere acceptos,
uiuos inuaderint: considerantque et spiritu manente, ea quae natura an-
te clausisset: eorumque positurā, colorem, figurā, magnitudinē, ordinem,

LIBER

duritiem, mollitiem, leuorem, contactum: processus deinde singulorum,
 et recessus: et siue quid inseritur alteri: siue quid partē alterius in
 se recipit. Neque enim cum dolor inus incidit, scire quid doleat eum,
 qui qua parte quodque uiscus intestinumue sit, non cognouerit. Neque ca
 rari id quod aegrum est, posse ab eo, qui quid sit, ignoret. Et cum p
 mul
 nus alicuius uiscera patefacta sunt, eum, qui sanæ cuiusque colorē par
 tis ignoret, nescire quid integrum, quid corruptum sit. Ita ne succurre
 re quidem posse corruptis, aptiusque extrinsecus imponi remedia, cō
 pertis interiorum, et sedibus, et figuris. Cognitaque eorum magnitudi
 ne, similesque omnia, quæ posita sunt, rationes habere. Neque esse crude
 le, sicut plerique proponunt, hominū nocentium: et horum quoque pau
 corum supplicij remedia populus innocentibus seculorum omnium que
 ri. Contra hi, qui se e
 utriusque ab experientia nominant: euidenter
 quidē causas ut necessarias amplectuntur. Obscurarū uero causarum,
 et naturalium actionum quæstionem ideo supernam esse conten
 dunt, quoniam incōprehensibilis natura sit. non posse uero cōprehē
 di, patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia: cum de ista re,
 neque inter sapiētiæ professores, neque inter ipsos medicos conueniit. Cur
 enim potius aliquis Hippocrati credat, quā Herophilo? Cur huic potius,
 quā Asclepiadi? si rationes sequi uelit, omnium posse uideri non impro
 bables. si curationes, ab omnibus his egros perductos esse ad sanitatē.
 Ita neque disputationi, neque authoritatī cuiusque fidē derogari oportuisse.
 Etiam sapientiæ studiosos maximos medicos esse, si ratioinatio hoc fa
 ceret. nunc illis uerba superesse, deesse medendi scientiam. Differre
 quoque pro natura locorū genera medicinæ: et aliud opus esse Romæ:
 aliud in Aegypto: aliud in Gallia. Quod si morbos eadem causæ fa
 rent ubique, remedia quoque ubique eadē esse debuissent. sæpe et causas ap
 parere: ut puta lippitudinis, uulneris, neque ex his patere medicinam.
 Quod si scientiā hanc non subiiciat euidentis causa, multo minus eam
 posse subijcere, quæ in dubio est. Cū igitur illa incerta incōprehēsi
 bilis sit, a certis potius, et exploratis petendū esse præsidium. i. his, quæ
 experientia in ipsis curationibus docuerit, sicut in cæteris omnibus ar
 tibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed
 usu fieri. ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere. Eo quoque
 discat, quod qui diuersa de his scripserint, ad eandē tamen sanitatē ho
 mines perduxerint. id enim fecisse, quod non ab obscuris causis, neque a na
 turalibus actionibus, quæ apud eos diuersæ erant: sed ab experimen
 tis pro ut cuique responderant, medendi uias traxerint: ne inter initia
 quidem ab istis quæstionibus deductā esse medicinam, sed ab experi
 mentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erāt, alios propter auaritiā

primis diebus protinus cibum assumpsisse: alios propter fastidium absti-
nuisse: lenatumq; magis eorū morbum esse, qui abstinerant. Itemq;
alios in ipsa febre aliquid disse: alios paulo ante ea: alios post remissio-
nem eius. optime deinde his cessasse, qui post finē febris id fecerint. Ea
dēq; ratione alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore: alios
exiguo: grauioreq; eos factos, qui se impleverant. Hæc similiaq; cū coti-
die inciderent, diligentes homines notasse, quæ plerunq; melius respon-
derent: deinde ægotatibus ea præcipere cœpisse. sic medicinam oriā,
subinde aliorū salute, aliorū interitu: perniciosa discernentē à salutaribus.
Repertis deinde medicine remedijs, hoies de rationibus eorū disse-
rere cœpisse: nec post rationē medicinam esse inuentam, sed post inue-
tam medicinā rationē esse quæsitam. Requiritur et si ratio id doceat
quod experientia, an aliud. Si idē, superuacuum esse. si aliud, et con-
trariam. Primo tamen remedia explorāda summa cura fuisse. nunc
uero iam explorata esse: neq; ulla, aut noua genera morborū reperiri,
aut nouam desiderari medicinā. Quod si iā incidat mali genus ali-
quod ignotū: non ideo tamen fore medico de rebus cogitandū obscu-
ris: sed eū protinus uisurū, cui morbo id proximū sit: tentaturūq; re-
media similia illis, quæ uicino malo sæpe succurrerint. Et per eius sē-
militudinē opem reperturū. Neq; n. se dicere consilio medicū non ege-
re: Et irrationale animal hanc artē posse præstare. sed has latentiu
rerū coniecturas ad rē non pertinere: quia non inter sit, quid morbi
ficiat, sed quid tollat. Neq; ad rē pertineat quomodo, sed qd optime
digeratur: siue hac de causa cōcoctio inadat, siue de illa. Et siue cō-
coctio sit illa, siue tantū digestio. Neq; quædū esse quomodo spiremus:
sed quid graue, tardumq; spiritū expediat. neq; quid uenas moueat:
sed quid quæq; motus genera significant. Hæc aut cognosci experimē-
tis, Et in omnibus eiusmodi cogitationibus in utrāq; partē differi pos-
se. Itaq; ingeniū Et faciundiam uincere: morbos aut non eloquentia,
sed remedijs curari. Quæ si quis elinguis usu discretu bene norit: hūc
aliquanto maiore medicum futurū: q̄ si sine usu linguā suā excolue-
rit. Atq; ea quidē, de quibus est dictū, superuacua esse tantummodo.
Id uero quod restat et crudele: uiuorū hominum alui, atq; præcor-
dia incidū: Et salutis humanæ præsidē artē non solū pestem alicui,
sed hanc et atrocissimam inferre: cū præsertim ex his, quæ tanta uio-
lentia quærantur, alia non possint omnino cognosci: alia possint et
sine scelere. nā colorem, leuorē, mollitiem, duritiem, similiaq; omnia
nō esse talia in cō corpore, qualia integro fuerint. q̄ cū corporibus in-
uolatis hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, mille alijs
mediocribus affectibus sæpe mutantur: multo magis uerisimile est inte-

LIBER

riora, quibus maior mollities lux ipsa noua sit, sub grauissimis ulneribus et ipsa trucidatione mutari: neque quicquam esse stultius, quam quale quodque uiuo homine est, tale existimare esse moriente, immo iam mortuo. Nam utrum quidem, qui minus ad rem pertineat, spirante homine posse diduci? simulatque uero ferrum ad praecordia accessu: et dissimum transuersum septum est: quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit, (διασπαρμας graeci uocant) hominem protinus animam amittere. Ita demum mortui praecordia, et uiscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale mortui sit: non quale uiui fuit. Itaque consequi medicum ut hominem crudeliter iugulet: non ut sciat qualia uiui uiscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui subiiciatur, id saepe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena, uel militem in acie, uel uiatorem a latronibus exceptum, sic vulnerari: ut eius interior aliqua pars aperiatur: et in alio alia sita: sedem, positum, ordinem: figuram: similiaque alia cognoscere prudentem medicum non cedere, sed sanitatem molientem: idque per misericordiam discere, quod alii dira crudelitate cognouerint. Ob haec ne mortuorum quidem laceratione necessariam esse: quae et si non crudelis, in foeda sit: cum aliter pleraque in mortuis se habeant. Quantum uero in uiuis cognosci potest, ipsa curatio ostendat. Cum haec per multa uolumina, per quae magnae contentionis disputationes a medicis saepe tractatae sint, atque tractentur: subiiciendum est, quae proxima uero uideri possint: ea neque addicta alterutri opinioni sunt: neque ab utraque nimium abhorrentia, media quodammodo inter diuersas sententias. Quod in plurimis contentionibus deprehendere licet sine ambitione uerum scrutantibus: ut in hac ipsa re. Nam quae demum causae uel secundam ualitudinem praestent: uel morbos excitent: quomodo spiritus, aut cibis uel detrahatur, uel digeratur: ne sapientiae quidem professores scientia comprehendunt: sed coniectura persequuntur. cuius autem rei non est certa notitia, eius opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quamquam igitur multa sint ad ipsas artes proprie non pertinentia: tamen eas adiuvat excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturae rerum contemplatio quae non faciat medicum aptiorem, tamen medicinae reddit perfectum. Verique simile est Hippocrati, et Erasistrato, et quicunque alij non contenti febres et ulcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sint: non ideo quidem medicos fuisse: uerum ideo quoque maiores medicos extitisse. Ratione uero opus est ipsi medicinae, et si non inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, in saepe. Est enim haec ars coniecturalis: neque respondet ei plerumque non solum coniectura,

sed etiam experientia. et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Rarius, sed aliquando tamen morbus quoque ipse nouus est, quem non incidere, manifeste falsum est: cum aetate nostra quaedam ex naturalibus partibus carne prolapsa, et arente, intra paucas horas expirauerit: sic ut nobilissimi medici neque genus mali, neque remedium inuenerint: quos ego nihil ideo tentasse iudico: quia nemo in splendida persona periclitari coniectura sua uoluerit: ne occidisse, nisi seruasset, uideretur. Veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitare detracta tali uerecundia: et fortasse responsurum fuisse id quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinae genus neque semper similitudo aliquid confert: et si quando confert: tamen id ipsum rationale est inter multa similia genera et morborum, et remedium cogitare, quo potissimum medicamento sit utendum. Cum igitur talis res incidit: medicus aliquid oportet inueniat: quod non utique fortasse, sed sepius tamen etiam respondeat. Petet autem nouum quoque consilium non ab rebus latentibus (ista enim dubiae, et incertae sunt) sed ab his quae explorari possunt: id est euidentibus causis. Interest enim fatigatio morbum: an sitis, an frigus, an calor, an uigilia, an fames fecerit: an cibi, uinique abundantia: an intemperantia libidinis: neque ignorare hunc oportet, quae sit aegri natura, humidum magis, an magis siccum corpus eius sit: ualidi nerui, an infirmi: frequens aduersa ualeitudo, an rara, ea, quae cum est, uehemens esse soleat: an leuius, breuis, an longi. Quod is uitae genus sit secutus, laboriosum, an quietum, cum luxu, an cum frugalitate. ex his enim, similibusque saepe cograndi noua ratio ducenda est. Quamuis ne haec quidem sic praeteriri debent, quasi nulla controuersia recipiant. Nam et Erasistratus non ex his fieri morbos dixit: quoniam et alij, et ipse alijs post ista non febri citarent: et quidam medici saeculi nostri sub authore (ut ipsi uideri uolunt) Themisone, contendunt nullius causae notitiam quicquam ad curationes pertinere: satisque esse quaedam cōia morborum intueri. si quidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere aegros, modo nimium: modo alia parte partem, alia nimium. Haec autem genera morborum modo acuta esse, modo longa: et modo incrementum, modo consistere: modo minui consueuerunt. Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse: si profusio laborat, continendum. si mixtum utrumque habet, occurrendum subinde uehementiori malo. et aliter acutis morbis medendum, aliter uetustis. aliter incrementibus, aliter substantibus. aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Horum observationem medicinam esse: quam ita finiunt, ut quasi uiam quandam quam methodo graeci nominant: eorumque quae in

LIBER

morbis cōia sunt, contemplatricē esse contendunt: ac neq; rationalibus
 se, neq; experimenta tantum spectantibus annumerari uolunt: cū ab illis
 eo nomine dissentiant, quod in cōiectura rerū latentū nolunt esse me-
 dicinā: ab his eo quod parū artis esse in obseruatione experimentorū
 credunt. Quod ad Erasistratū pertinet, primū ipsa euidentia eius
 opinioni repugnat: q̄a raro nisi post horū aliquid morbus uenit. De-
 inde non sequitur, ut quod aliū non afficit, aut eundē aliās: id ne al-
 teri quidē, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quædā subesse
 corpori, uel ex infirmitate eius, uel ex aliquo affectu: quæ uel i alio nō
 sunt: uel in hoc aliās nō fuerunt. eaq; p se non tanta uī concitant mor-
 bum: tamen obnoxiiū magis alijs iniurijs corpus efficiunt. Quod si cō-
 tēplationem rerū naturæ, quā temere medici sibi uendicant: satis cō-
 prehēdisset: et illud scīsser: nihil omnino ob unā causam fieri, sed id pro
 causa apprehendi: quod cōtulisse plurimū uidetur. Potest aut id dū so-
 lum est, nō mouere: quod iunctū alijs maxime mouet. A credit ad hæc,
 quod ne ipse quidē Erasistratus, qui trāssuso in arterias sanguine, fe-
 brem fieri dicit: idq; nimis repleto corpore incidere repperit: cur ex
 duobus æque repletis, alter in morbu incidit: alter omni periculo
 uacuit: quod cotidie fieri apparet, nō discreuerit. Ex quo disci pōt, ut
 uera sit illa trāssusio, tamen illā non p se, cum plenū corpus est, fieri:
 sed cū horū aliquid accesserit. Themisonis uero æmuli, si ppetua quæ
 promittunt, habent: magis ēt q̄ ulli rationales sunt. Neq; n si quis nō
 omnia tenet, quæ rationalis alius probat: protinus alio nouo nomine
 artis indiget. Si modo, quod primū est: non memoriæ soli, sed rationi
 quoq; insit. Si quod uero propius est, uix ulla perpetua præcepta
 medicinalis ars recipit: ijdē sunt, quod hi, quos experimenta sola susti-
 nent. Eo magis qm si cōpresserit aliquē morbus, an fuderit: quilibet
 ēt imperitissimus uidet. Quid aut cōpressum corpus resoluat: quid so-
 lutū teneat: si à ratione tractū est, rationalis est medicus. Si ut ei, qui
 se rationale negat, cōfiteri necesse est: ab experientia empiricus est. Itz
 apud eū morbi cognitio extra artē, medicina intra usum ē. Neq; ad-
 iectum quicq̄ empiricorū professioni, sed demptum est: qm illi multa
 circūspiciunt: hi tantum facillima & non plusq̄ uulgaria. Nā & hi
 qui pecoribus ac iumentis medentur, cū propria cuiusq; ex multis ani-
 malibus uosse non possint: cōibus tantummodo insistant. Et exteræ gē-
 tes, cum subtile medicinæ rationē non nouerint: cōia tantum uident.
 Et qui ample ualitudinarios nutriunt, quia singulis summa cura cō-
 sulere non subsistent: ad cōia ista confugunt. Neq; Hercules istud, et
 antiqui medici nescierunt: sed his contenti non fuerunt. Ergo ēt uetu-
 stissimus author Hippocrates dixit mederi oportere & cōia, & pro-

pria inueniē. Ac ne isti quidē ipsi intra suam professionem consistere ullo modo possunt. si quidē & cōpressorum, & fluentium morborum genera diuersa sunt: faciliusq; id in his quæ flunt, inspicia pōt. Aliud est. n. sanguine, aliud bilem, aliud cibū uomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri: aliud tabe cōsumi. Atq; in partes quoq; humor erumpit, ut in oculos, auresq;. quo piculo nullum humanū membrum uacat: nihil aut horū sic, ut aliud curatur. Ita protinus in his à cōi fluentis morbi contēplatione ad propriam medicina descendit. Atq; in hac quoq; rursus alia proprietatis noticia sepe necessaria est: quia non eadē omnibus ē in similibus casibus opitulatur. si quidē certæ quædā res sunt, quæ in pluribus uē trem aut astringunt, aut resolvunt: inueniuntur tñ in quibus aliter, atq; in cæteris idem eueniat. In his ergo cōmunium inspectio contraria est: priorū tantū salutaris: et causæ quoq; æstimatio sepe morbum soluit. Ergo ē ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper uidimus, Cassius febricitanti quidam, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eū premi cœpisse cognosceret: aquam frigidā ingessit: quæ ille epotæ, cum uini uim miscendo fregisset, protinus febrē pummo & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex causā, quæ ante præcesserat. Estq; etiam proprium aliquid & loci, & temporis istis quoq; authoribus: qui cum disputant quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt ut grauib; aut locis, aut temporibus magis uitetur. frigus, æstus, sacietas, labor, libido: magisq; ut conquiescat hisdem aut locis aut temporibus, si quis grauitatem corporis sentit: ac neq; uomitu sto machum, neq; purgatione aluum sollicitet. Quæ uera quidem sunt: à communibus tamen ad quædam propria descendunt. nisi persuadere nobis uolunt, sanis quidem considerandum esse: quod cœlum, quod tempus anni sit, ægris uero non esse: quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quin etiam morborum in hisdem hominibus aliæ, atq; aliæ proprietates sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est: contrarijs sepe restituitur. Plurimaq; in dando cibo discrimina reperiuntur: ex quibus contentus uno ero. nam famem facilius fert adulescens, quàm puer: facilius in denso cœlo, quàm in tenui: facilius in hyeme, quàm in æstate: facilius uno cibo, quàm prandio quoq; assuetus: facilius in exercitatus, quàm exercitatus homo sustinet. Sepe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus in ediam tolerat. Ob quæ competit eum qui propria non nouit, communia tantum intueri debere: cumq; qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negli-

LIBER

gere, sed his quoque insistere. Ideoque cum par scientia sit, utiliore me-
men medicum esse amicum, quam extraneum. Igitur ut ad propositum meum
redeam, rationalem quidem puto medicinam esse debere: instrui uero
ab evidentibus causis, obscuris omnibus non à cogitatione artificis, sed
ab ipsa arte reiectis. Incidere autem uiuorum corpora, et crudele, et
superuacuum est: mortuorum corpora discantibus necessarium. Nam
positum, et ordinem nosse debent, quæ cadauera melius, quam ui-
uus et uulneratus homo representant: sed et cætera quæ modo in
uiuis cognosci possunt, in ipsis curationibus uulneratorum paulo tar-
dius, sed aliquando mitius usus ipse monstrauit. His propositis, pri-
mum dicam quemadmodum sanos agere conueniat: tum ad ea tran-
sibo, quæ ad morbos, curationesque eorum pertinebunt.

Caput primum quemadmodum sanos agere conueniat.

Annus homo qui et bene ualet, et suæ spontis est, nul-
lis obligare se legibus debet: ac neque medico, neque ia-
trollopta egere. Huc oportet uariū habere uitæ genus:
modo ruri esse, modo in urbe: sæpiusque in agro, nauiga-
re, uenari, gescere interdum: sed frequentius se exerce-
re. Siquidem ignauia corpus hebetat: labor firmat, illa maturam se
nequitiam: hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum
balneo, interdum aquis frigidis uti. modo ungi, modo id ipsum negli-
gere. nullum tibi genus fugere, quo populus utatur. interdum in conui-
uium esse: interdum ab eo se retrahere. modo plus iusto, modo non am-
plius assumere. bis die potius, quam semel cibum capere, et semper
quam plurimum, dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis exer-
citationes, cibusque necessarij sunt, sic athletici superuacui: nam et inter-
missus propter ciuiles aliquas necessitates ordo exercitationis corpus
affligit: et ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, celerrime, et
senescunt, et agrotant. Concubitus uero neque nimis concupiscendus,
neque nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat: frequens soluit.
Cum autem frequens non numero sit, sed natura: ratione ætatis et cor-
poris: scire licet eum non inutilem esse, quem corporis neque languor,
neque dolor sequitur. Idem interdum peior est, nocturnus tamen se
neque illum cibus, neque hunc cum uigilia labor statim sequitur. Hæc fir-
mis seruanda sunt: cauendumque ne in secunda ualentudine aduersæ
præsidia consumantur.

Quæ stomacho imbecilli seruanda sint, Caput secundum.

T imbecillis stomacho, quo in numero magna pars urbanorum, omnesq; penè cupidi literarum sunt: obseruatio maior necessaria est. ut quod uel corporis, uel loci, uel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur q; bene concoxit, mane tuto surget. qui parū, quiescere debet. Et si mane surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui nō concoxit, ex toto conquiescere: ac neq; labori se, neq; exercitationi, neq; negotio credere. Qui crudū sine præcordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquā frigidā bibere: et se nihilominus continere. Habitare uero ædificio lucido per statum æstiuum hibernum solem habente. cauere meridianum solem: matutinū, et uespertinum frigus: itemq; auras fluminum, atq; stagnorum: minimēq; nubilo cælo soli aperienti se committere: ne modo frigus, modo calor moueat. quæ res maxime grauedines, distillationesq; concitat. Magis uero grauib; locis ista seruanda sunt: in quibus et pestilentiam faciunt. Scire aut licet integrum corpus esse, cum cotidie mane urina alba, dein ruffa est. Illud concoquere, hoc concoxisse significat. Vbi expectectus est aliquis, paulum intermittere: deinde nisi hyems est, fouere os multa aqua frigida debet, longis diebus meridiari potius ante cibum, sin minus, post eum. per hyem potissimum totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, nō post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdū uel domestica, uel ciuilia officia tenuerunt: huic tempus aliquod seruandum curationi corporis sui est. Prima autem eius curatio exercitatio est: quæ semper antecedere cibum debet: in eo qui minus laborauit, et bene concoxit, amplior. in eo qui fatigatus est, et minus concoxit, remissior. Commodè uero exercent clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio: atq; hæc non utiq; plana commodior est. siquidem melius ascensus quoq; et descensus cum quadam uarietate corpus moueat: nisi tamen id perquam imbecillum est. melior autem est sub diuo, quàm in porticu. melior si caput patitur, in sole, quàm in umbra. melior in umbra, quam parietes, aut uiridaria efficiunt, quàm quæ tecto subest. melior recta, quàm flexuosa. exercitationis autem plerunq; finis esse debet sudor: aut certe lassitudo, quæ citra fationem sit: idq; ipsum modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne his quidem athletarum exemplo, uel certa esse lex, uel immodicus esse labor debet. Exercitationem recte sequitur modo unctio uel in sole, uel ad ignem: modo balneū, sed conclauī quammaxime, et alto, et lucido, et spaciōso. Ex his uero neutrum sæpe fieri oportet: sed sæpius alterutrum

LIBER

pro corporis natura. Post hæc paulum conuiuere opus est. ubi ad cibum uentum est: nunquam utilis est nimia sacietas. sæpe etiam inutilis nimia abstinentia. sæpe si qua intemperantia subest: tutior est in potione quam in esca. Cibus a salsamentis, oleribus, similibusq; rebus melius incipit. Tum caro assumenda est, quæ assa optima, aut elixa est. Conditæ omnia duabus de causis inutilia sunt. quoniam & plus propter dulcedinem assumitur: et quod modo par est, tamen ægrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet: in imbecillo coarcescit. si quis itaq; hoc parum ualet, palmulas, pomaq; et similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quæ aliquantum sitim excusserunt, nihil edendū est. post sacietatem, nihil agendum. Vbi expletus est aliquis, facilius concoquit: si quicquid assumpsit, potione aquæ frigida includit: tum paulisper inuigilat: deinde bene dormit. Si quis interdū se implebit: post alium neq; frigori, neq; aestui, neq; labori se debet committere. neq; enim tam facile hæc inani corpore, quā repleto nocet. Si quibus de causis futura inedia est: labor omnis uitandus est.

Observationes quedam prout res nouæ accidunt: & prout corporū genera, & sexus, & ætates, & tempora anni sunt. Caput tertium.

Itq; hæc quidem penè perpetua sunt. Quasdam autem observationes desiderant & nouæ res, et corporū genera, & sexus, et ætates, & tempora anni. Nam neq; ex salubri loco in grauem, neq; ex graui in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima hyeme, ex graui in eum, qui salubris est, prima æstate transire melius est. Neq; uero ex multa fame nimia sacietas: neq; ex nimia sacietate fames idonea est. Periclitaturq; & qui semel, & qui bis die cibum incontinententer contra consuetudinem assumit. Item neq; ex nimio labore subitum otium: neq; ex nimio otio subitus labor sine graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid uolet, paulatim debet assuescere. Omnem etiam laborem facilius uel puer, uel senex, quam insuetus homo sustinet. Atq; ideo quoq; nimis ociosa uita utilis non est, quia potest inadere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laborauit, aut multo plus quam solet; etiam si qui assueuit, huic ieiunio dormiendum est: multo magis si etiam os amarum est: uel oculi caligant: aut uenter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiunio est, sed etiam in posterum diem permanendum: nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est: surgere oportet, & lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis

aliquis laborauit, tamen ingredi aliquid eodē modo debet. Cōmunia
deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumpturus, ubi paulum
ambulauerunt, si balneum nō est, calido loco uel in sole, uel ad ignem
ungi: atq; sudare. si est, ante omnia in tepidario residere. Deinde ubi
paulum conquieuerunt, intrare, et descendere in solium. tum multo oleo
ungi, leniterq; perfricari: iterum in solium descendere. Post hæc os
aqua calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruens idoneū nō
est. Ergo si nimium alicui fatigatio penē febris est, huic abunde est loco
tepidus demittere se in quibus tenuis in aquam calidam, cui paulū olei
adiectum: deinde totum quidē corpus, maxime tamen eas partes, quæ
in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui uinum, et paulum con
triti salis sit adiectum. Post hæc omnibus fatigatis, aptum est cibum
sumere, eoq; humido uti. aqua, uel certe diluta potione esse contentos, ma
ximeq; ea, quæ moueat urinam. Illud quoq; nosse oportet, quod ex la
bore sudanti frigida potio perniciosissima est. atq; etiam cum sudor se
remisit, itinere fatigatis inutilis. A balneo quoq; uenientibus Asclepia
des inutilem eam iudicauit. quod in his uerum est, quibus alius faci
le nec tuto resoluitur: quiq; facile inhorrescunt. perpetuū in omnibus
non est, cum potius naturale sit potione æstuantem stomachum refri
gerari: frigentem calefieri. quod ita præcipio, ut tamen sciat ne ex
hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse. Solet etiā
prodesse post uariū cibum, frequentesq; dilutas potiones, uomitus, et
postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio
urget, inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est: raroq; balneo
utendum. Leuatq; lassitudinem etiam laboris mutatio: eumq; quem
nouum genus eiusdem laboris pressit, id quod in consuetudine est, re
ficiat. Fatigatio cotidianum cubile tutissimū est: insolitum contra lassat.
quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.
proprie quedam ad eum pertinent, qui ambulando fatigatur. Hunc
reficit in ipso quoq; itinere frequens frictio: post iter, primum sedile,
deinde unctio: tum calida aqua in balneo magis superiores partes, q̃
inferiores foueat. si quis uero exustus in sole est, huic in balneum pro
tinus eundem est: perfundendumq; oleo corpus, et caput. deinde in
solium bene calidum descendendum est. tum multa aqua per caput in
fundēda prius calida, deinde frigida. At ei qui perfrigit, opus est in
balneo primum inuoluto sedere, donec insudet: tum ungi, deinde lau
ari. cibum modicum, deinde potiones meras assumere. Is uero qui na
uigauit, et nausea pressus est, si multam bilem euomit, uel abstinere
cibo debet: uel paulum aliquid assumere. Si pituitam acidam effu
dit, utiq; sumere cibum: sed assueto leuiorem. si sine uomitu nausea

LIBER

fuit, uel abstinere, uel post cibū uomere. Qui uero toto die, uel in uehi-
culo, uel in spectaculis sedet, huic nihil currendū, sed lente ambulan-
dum est. Lenta quoq; in balneo mora, dein cœna exigua prodisse con-
sueuerunt. Si quis in balneo astat, reficiat hunc ore exceptum, & in
eo retentum acetum. si id non est, eodem modo frigida aqua assum-
pta. Ante omnia autem norit quisq; naturā sui corporis: quoniam alij
graciles, alij obese sunt. alij calidi, alij frigidiores. alij humidi, alij sic-
ci. alios astricta, alios resoluta aluus exercet. raro quisquam non ali-
quam partem corporis imbecillam habet. Tenuis uero homo imple-
re se debet: plenus extenuare: calidus refrigerare: frigidus calefac-
ere: madens siccare: siccus madefacere. itemq; aluum firmare is, cui
fusa soluere is, cui astricta est. Suauitudo quoq; semper parti maxi-
me laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequen-
tior quies, unctio. & si post prandium est balneum, contracta aluus,
modicum frigus hyeme, somnus & plenus, & non nimis longus.
molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos, & potiones maxime
dulcia & pingua cibis & frequentior, & quantus plenissimus po-
test concoqui. Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit,
magisq; si salsa est. in ieiunio balneū, inurēs sol, et omnis calor, cura,
uigilia, somnus nimium uel breuis, uel longus. lectus per æstatem ter-
ra, hyeme durum cubile. curfus, multa ambulatio, omnisq; uehemens
exercitatio, uomitus, deiectio, acida res et austera, & semel die assum-
pta epula, & uini non perfrigidi, ieiunio potio in consuetudinem ad-
ducta. Cum uero inter extenuantia posuerim uomitum, & deiectio-
nem, de his quoq; proprie quadam dicenda sunt. Eiectum esse ab
Asclepiade uomitum in eo uolumine, quod de tuenda sanitate com-
posuit, uideo. neq; reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui
cotidie eiicendo uorandi facultatem moluntur. paulo etiam longius
prociessit, idem purgationes quoq; eodem uolumine expulit. & sunt
hæ permiciose, si nimis ualentibus medicamentis fiunt. Sed hæc tamen
subueniendæ esse, non est perpetuum. quia corporum, temporumq; ra-
tio potest ea facere necessaria, dū & modo, & non nisi cum opus est,
adhibeantur. Ergo ille quicq; ipse, si quid iam corruptum esset, expelli
debere confisus est. Ita non ex toto res condemnanda est. sed esse eius
etiam plures causæ possunt. estq; in ea quadam paulo subtilior obser-
uatio adhibenda. Vomitus utilior est hyeme, quam æstate. Nam tum
& pituitæ plus, & capitis grauitas maior subest. inutilis est grac-
ilibus, & imbecillum stomachum halentibus. utilis est plenis & bi-
liosius emulus, si uel nimium se repleuerint: uel parum concoxerunt.
nam siue plus est, quàm quod concoqui possit, periclitari ne corrup-

pater, non oportet. Si uero corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua uia primum expelli potest, eijcere. Itaq; ubi amari ructus cum dolore, et grauitate praecordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Itē prodest ei, cui pectus aestuat, et frequens salina uel nauſea est: aut cui sonant aures: aut madent oculi: aut os amarum est. Similiterq; ei, qui uel coelum, uel locum mutat: hisq; quibus, si per plures dies non uomuerunt, dolor praecordia infestat. Neq; ignoro inter haec praeci quietem. quae non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaq; istud luxuriae causa fieri non oportere confiteor. interdum ualitudinis causa recte fieri experimentis credo. Commoneo tamen ne quis, qui ualere et senescere uolet, hoc cotidianum habeat. Qui uomere post cibum uolet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere. si difficilior, aquae, uel salis, uel mellis paulum adijcere. At qui mane uomiturus est, ante bibere mulsum, uel hyssopum, aut esse radicula debet. deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Caetera quae antiqui medici praeeperunt, stomachum omnia infestant. Post uomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi sed huius idonei, gustandum: et aquae frigidae cyathi tres bibendi sunt. Si autem uomitus fauces exasperauit, q̄ uomuit, si mane id fecit, ambulare debet: tum ungi, deinde coenare. si post coenam, postero die lauare: et in balneo sudare: hinc proximus cibus, mediocris utilior est: isq; esse debet cum pane hesterno, uino austero meraco, et carne assa, cibisq; omnibus quam siccissimis. Qui uomere bis in mense uult, melius consulet, si biduo continuarit, quam si post quintum decimum diem uomuerit: nisi haec mora grauitatem pectori faciat. deiectio autem medicamentis quoq; petenda est, ubi uenter suppressus parum reddit. ex eoq; inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaq; superioris partis mala incrementum. Quid enim inter haec adiuuare possunt quies, et inedia quae per illas maxime eueniunt? Qui eijcere uolet, primum cibis, uinisq; utetur his, quae hoc praestant. dehinc si parum illa proficiunt, aloem sumat. sed purgationes quoq; ut interdum necessariae sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit. non ali corpus: et ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit. Caleſcat autem unctio, aqua salsa, magisq; si calida est. omnia salsa, amara, carnosae. si post cibum est balneum, uinum austerrum. Refrigerat in ieiunio et balneum, et somnus nisi nimis longus est: et omnia acida, aqua q̄ frigidissima, oleum si aquae miscetur. Humidum autem corpus efficit labor maior q̄ ex consuetudine, frequens balneum, cibus plenior, multa potio, post hac ambulatio

LIBER

Et uigilia. Per se quoque ambulatio multa, et uehemens, et matutina exercitatio, et non protinus cibus adiectus, ea genera escæ quæ ueniunt ex locis frigida, et pluuijs, et irriguis. Contra siccit modica exercitatio, fames, unctio sine aqua, calor, sol modicus, frigida aqua, cibus exeritationi statim subiectus, et is ipse ex siccis, et æstuosis locis ueniens. Alium astringit labor, sedile, creta figularis corpori illita, cibus imminutus, et is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet. exiguua potio, neque adhibita nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit. post cibum quies. Contra soluit aucta ambulatio, atque escæ post motus, qui post cibum est. subinde potiones cibo immixtæ. Illud quoque scire oportet, quod uentrem uomitus solum comprimit: compressum soluit. Itemque comprimit is uomitus, qui statim post cibum est: soluit is qui tarde superuenit. Quod ad ætates uero pertinet, in mediam facillime sustinent mediæ ætates: minus iuuenes: minime pueri, et senectute confecti. quod minus fert facile quisque, eò sæpius debet cibum assumere: maximeque eo eget, qui increscit. Calida lauatio et pueris, et senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius. neutri ætati quæ inflationes mouent. Iuuenum minus quæ assumant, et quomodo currentur, interest. quibus iuuenibus fluxit aluus, plerumque in senectute contrahitur. Quibus in adolescentia fuit astricta, sæpe in senectute soluitur. Melior est autem in iuvene fusior: in senē astrictior. Tempus quoque anni considerare oportet. hyeme plus esse conuenit. minus, sed meracius bibere. multo pane uti. carne potius elixa. modica oleribus. semel die cibum capere: nisi si nimis uenter astrictus est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, et ipsum siccum sine carne, sine portione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, uel calorem mouentibus. Venus tum non æque perniciosa est. At uere paulum cibo demendum, adiiciendumque potioni: sed dilutius tamen bibendum est. magis carne utendum. magis oleribus. transeundum paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Aestate uero et portione, et cibo corpus sæpius eget. ideo prandere quoque modum est. Eo tempore aptissima sunt et caro, et olus. potio quamdiu lutissima, ut et sitim tollat: nec corpus incēdat. Frigida lauatio, caro assa, frigidi cibi, uel qui refrigerent. Vt sæpius autem cibo utendum, sic exiguo est. Per autumnum propter coeli uarietatem periculum maximum est. Itaque neque sine ueste, neque sine calciamentis prodire oportet, præcipueque diebus frigidioribus. neque sub diuo nocte dormire: aut certe bene operiri. Cibo uero iam paulo pleniore uti licet. minus, sed meracius bibere. Poma uacere quidam putant, quæ immodice toto die plerumque sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed

hæc, sed consumatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamē minus q̄ in his noxæ est. Sed his uti non sæpius quā in alio cibo conuenit. Deniq; aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neq; æstate uero, neq; autumno utilis uenus est: tolerabilior tamen per autumnum: æstate uero & toto (si fieri potest) abstinendum.

De his, qui aliqua parte corporis laborant: et primum de his, quibus caput infirmum est. Caput. iiii.

Proximū est ut de his dicā, qui partem aliquam corporis imbecillas habent, cui caput infirmum est: is si bene concoxerit, leniter perfricare id mane manibus suis debet. nūquam id, si fieri potest, ueste uelare: aut ad cutem tonderi. Vtileq; lunam uitare, maximeq; ante ipsum lunæ, solūq; concursum. sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos cotidie pectere: multum ambulare sed si licet, neq; sub tecto, neq; in sole. Vbiq; autem uitare solis ardorem, maximeq; post cibum, & uinum. potius ungi, q̄ lauari. nunq̄ ad flammam ungi: interdum ad prunam. Si in balneum uenit: sub ueste primum paulum in tepidario insudare: ibi ungi: tum trāsire in calidarium: ubi sudabit, in solum non descendere: sed multa calida aqua per caput se totū perfundere: tum tepida uti, dein frigida: diutiusq; ea caput, quā cæteras partes perfundere: deinde id aliquādiu perfricare: nouissime detergere, & ungere. Capiti nihil æque prodest atq; aqua frigida. Itaq; is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali cotidie debet aliquandiu subijcere. Semper autem etiam si sine balneo unctus est, neq; totum corpus refrigerare sustinet: caput tamen aqua frigida perfundere. sed cum cæteras partes attingi nolit: demittere id ne ad cervices aqua descendat: eamq; ne quid oculis, alijs uel partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regere. huic modicus abusus necessarius est, quem facile concoquat. isq; si ieiunio caput læditur, assumendus etiam medio die est. si non læditur, semel potius. Bibere huic assidue uinum dilutum, leue, quā aquam magis expedit: ut cum caput ut grauius esse cæperit, sit quod confugiat: eiq; ex toto neq; uinum, neq; aqua semper utilia sunt. medicamentum utrumq; est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, uoce contendere, huic opus non est utiq; post cœnam: post quam ne cogitatio quidem ei satis tuta est: maxime tamen uomitus alienus est.

Aurelij Cor.

6

Eq̄ uero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus
 aque frigidae prodest: sed his etiā, quos assidue lip=
 pitudines, grauedines, desillationes, tonsillaeq̄ male
 habent. his autem non caput tantum cotidie persun=
 dendum est: sed os quoq̄ multa frigida aqua soun=
 dum est. præcipueq̄ omnibus, quibus hoc utile auxilium est: eo uten=
 dum est, ubi grauius cœlum Austri reddiderunt. cumq̄ omnibus
 inutilis sit post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tum his præci=
 pue, qui uel capitis, uel arteriæ dolores habere consuerunt, uel quos li=
 bet alios oris affectus. Vitari etiā grauedines, desillationesq̄ possunt:
 si quamminime eum, qui his oportunus est, aerem, uel loca, aquasq̄
 mutet. si caput in sole protegit, ne incendatur: ne' ue subitum ex repen=
 tino nubilo frigus id moueat. Si post concoctionem ieiunius caput ra=
 dit. Si post cibum neq̄ legit, neq̄ scribit.

Ad solutam aluum remedia. Caput VI.

Vem uero frequenter citata aluus exercet, huic opus
 est pila, similibusq̄ superiores partes exercere: dum
 ieiunus est, ambulare: uitare solis nimium ardorem,
 continua balnea, unq̄ citra sudorem: non uti cibis na=
 rijs, minimisq̄ iurulentis, aut leguminibus, oleribus'ue
 his, quæ celeriter descēdunt: omnia deniq̄ fugere, quæ tarde cōcoquun=
 tur. Venatio, duriq̄ pisces, & ex domesticis animalibus assa caro ma=
 xime inuuant. Nunquam uinum salsum bibere expedit: ne tenue qui=
 dem, aut dulce, sed austerum, & plenius, neq̄ id ipsum peruetus. Si
 mulso uti uolet, id ex decocto molle faciendum est. Si frigida potiones
 uentrem eius non turbant, his utendum potissimum est. Si quid offen=
 se in caena sensit, uomere debet: idq̄ postero quoq̄ die facere. tertio
 modici ponderis panem ex uino esse, adiecta uina, uel olea, uel ex
 defruto, similibusq̄ alijs: deinde ad consuetudinem redire. Semper au=
 tem post cibum conquiescere: ac neq̄ intendere animum: neq̄ ambu=
 latione quamuis leui dimoueri.

Remedia ad colī dolorem. Caput VII.

T si laxius intestinum dolere consuevit, quod uō lo=
 nominant: cum id nihil nisi genus inflationis sit:
 id agēdū est, ut cōcoquat aliquis, ut lectione et alijs ge=
 neribus exercatur: utatur balneo calido: cibis quoq̄,
 & potionibus calidis: deniq̄ omnimodo frigus euitet.
 item dulcia omnia, leguminaq̄, & quicquid inflare consuevit.

Quæ agenda sint stomacho laborantibus.

Caput octauum.

I quis uero stomacho laborat, legere clare debet: post lectionem ambulare, tum pila, uel armis, alio uero quo genere, quo superior pars mouetur, exerceri. Non aquam, sed uinum calidum bibere ieiunus. Tum cibum bis die assumere: sic tamen ut facile concoquat.

Vti uino tenui, et austero: et post cibum frigidis potionibus potius. Stomachum autem infirmum indicant pallor, macies, præcordiorum dolor, nausea, et nolentium uomitus. in ieiunio dolor capitis: quæ in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum utique nostris est: qui cum in aduersa ualitudine uinum, aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent. At qui tarde concoquunt, et quorum ideo præcordia instantur, quine propter ardorem aliquem noctu sitire consueverunt, antequam conquiescant, duos tres uel cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest et aduersus tardam concoctionem clare legere: deinde ambulare: tum uel ungi, uel lauari assidue: uinum frigidum bibere: et post cibum magnam potionem, sed, ut supra dixi, per siphonem. deinde omnes potionem aqua frigida includere. Cui uero abus accit, is ante eum bibere aquam egelidam debet, et uomere. At his, cui ex hoc frequens deiection incidit, quotiens aluus ei consiterit, frigida potione potissimum utatur.

Quid obseruandum sit dolore neruorum laborantibus. Caput nonum.

I cui uero dolere nerui solent, quod in podagra, chiragra uel esse consuevit, huic quantum fieri potest, exercendum id est quod affectum est: obijciendumque labori, et frigori, nisi cum dolor increuit. Sub diuo quies optima est. Venus semper inimica est. Concoctio, sicuti in omnibus corporis affectibus, necessaria est. Cruditas enim id maxime lædit: et quotiens offensum corpus est, uiciosa pars maxime sentit. Vt concoctio autem omnibus uitiis occurrat: sic rursus alijs frigus, alijs calor. Quæ sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicus est seni, tenui, uulneri, præcordijs, intestinis, uescicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, neruis, uulue, cerebro. Idem summam autem facit pallidam, aridam, duram, nigram. ex hoc horrores, tremoresque nascuntur. At prodest inuenibus, et omnibus plenius. et etiorque mens est, et melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed attenuetur. Aqua uero frigida infusa præter quam capiti, etiam stomacho

LIBER

prodest. Item articulis, doloribusq; qui sunt sine ulceribus. item rubi-
cundis nimis hominibus, si dolore uacant. Calor aut adiuvat omnia,
quæ frigus infestat. ite lippietes: si nec dolor, nec lachrymæ sunt. Ner-
uos quoq; q contrahuntur, præcipueq; ea ulcera, quæ ex frigore sunt.
Idem corporis colorem bonum facit: urinā mouet. si nimius est, corpus
effæminat: neruos emollit: stomachum soluit. Minime uero aut frigus,
aut calor tuta sunt: ubi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolo-
res, aliq; uitia, frigida aqua strumas excitat. Calor cōcoctionem pro-
hibet: somnum aufert: sudorem digerit: obnoxium morbis pestilenti-
bus corpus effiat.

Observatio in pestilentia. caput. x.

St etiā obseruatio necessaria, quā quis in pestilentia
utatur adhuc integer: cum in securus esse non possit.
Tum igitur oportet peregrinari: nauigare. Vbi id nō
licet, gestari: ambulare sub diuo ante æstum leniter: eo
demq; modo ung: Et ut supra cōprehensum est, ui-
tare fætigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoq; ma-
gis se continere, si qua grauitas in corpore est. Tū neq; mane surgen-
dum, neq; pedibus nudis ambulandum est. minimeq; post cibum aut
balneum: neq; ieiuno, neq; coenato uomendum est. neq; mouenda alius:
atq; etiam si per se mota est, cōprimenda est. Abstnendum potius si
plenius corpus est. Itemq; uitandum balneum, sudor, meridianus som-
nus utiq; si cibus quoq; antecessit: qui tamen semel die tunc commodius
assumitur: insuper etiā modicus, ne cruditatem moueat. Alternis die-
bus inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est. quibus serua-
tis, ex reliqua uictus cōsuetudine quā minimum mutari debet. Cum
uero hæc in omni pestilentia facienda sint: tum in ea maxime, quam
Austri excitariunt. Atq; etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt,
ubi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus: uel ubi in graues
regiones uenerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit: utiq; abstinere
debebit. Atq; ita à uino ad aquam, ab hac ad uinum eo, qui supra
positus est modo, transitus ei esse.

Nstantis autem aduersæ ualitudinis signa com-
plura sunt: in quibus explicandis non dubita-
bo authoritate antiquorum uirorum uti, maxi-
mèq; Hippocratis: cum recentiores quoq; medi-
ci, quamuis quædam in curationibus mutarint:
tamen hæc illum optime præfagisse fateantur.

Sed antequam dico quibus præcedentibus mor-
borum timor subfit: non alienum uidetur exponere, quæ tempora
anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora ma-
xime tuta, uel periculis opportuna sint: quod genus aduersæ uale-
tudinis in quoq; timeri maxime possit. Non quo non omni tempore, in om-
ni tempestatum genere, omnis ætatis, omnis habitus hominum per om-
nia genera morborum & egrotent, & moriantur: sed quod fre-
quentius, tamen quædam eueniant. Ideoq; utile est scire unūquenq;
quid, & quando maxime caveat.

Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qua-
lia corpora uel tuta, uel morbis oportuna sunt: & quod ualitudinis
genus in quoq; timeri possit. Caput. I.

Citur saluberrimum uer est: proxima deinde ab
hoc hyems: periculosior æstus. autumnus longe peri-
culosissimus. Ex tempestatibus uero optimæ æquales
sunt, siue frigida, siue calida: pessimæ, quæ uariant
maxime. quo fit ut autumnus plurimos opprimat.

Nam ferè meridianis temporibus calor: nocturnis atq; matutinis, si-
mulq; etiam uespertinis frigus est. Corpus ergo & æstate, & subinde
meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tē-
pore id maxime fit: sic quandoq; euenit, noxium est. Vbi æquali-
tas aut est: tamen saluberrimi sunt sereni dies: meliores pluri, quàm
tantum nebulosi, aut nubili: optimiq; hyeme, q omni uento uacant: æsta-
te, quibus Fauonij perflant. Si genus aliud uentorū est, salubriores sep-
tentrionales, q̄ sub solani, uel austri sunt. sic, tamē ut hæc interdum re-
gionum forte mutantur. Nam ferè uentus ubiq; à mediterraneis regio-
nibus ueniens salubris, à mari grauis est. Neq; solū in bono tempesta-
tum habitu certior ualitudo est: sed priores morbi quoq; si qui incā-
derunt, leuiorē sunt: & promptius finiuntur. Pessimum ergo cœlu
est, q̄ ægrum fecit: adeo ut in id quoq; genus, quod natura peius est in

Aurelij Cor.

b iij

LIBER

hoc statim, salubris mutatio sit. At ætas media tutissima est: quæ neq; iuuentæ calore, neq; senectutis frigore infestatur. Longis morbis se-
 nectus, acutis adolescentia magis patet. Corpus autem habilissimum
 quadratum est, neq; gracile, neq; obesum. Nam longa statura ut in iu-
 uenta decora est: sic matura senectute conficiatur. gracile corpus,
 infirmum, obesum, hebes est. Vere tamen maxime quæcunq; humoris
 motu mouentur, in metu esse consueverunt. ergo tum lippitudines, pustu-
 le, profusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀποστήματα græci nomi-
 nant: bilis atra, quam μέλας χολή appellat: insania, morbus comi-
 tialis, angina, grauedines, desillationes oriri solent. hi quoq; morbi, q;
 in articulis, nervisq; modo urgent, modo quiescunt: tum maxime et
 inchoantur, et repetunt. At æstus non quidem nascit plerisq; ab his
 morbis: sed adiicit febres, uel continuas, uel ardentes, uel tertianas, uo-
 mitus, alui deiectiones, auricularum dolores, ulcera oris, cancri, et in
 cæteris quidem partibus, sed maxime obsecnis: et quicquid sudore
 hominem resoluit. uix quicquam ex his in autumnum non incidit:
 sed oriuntur eo quoq; tempore febres incertæ: lienis dolor, aqua in-
 tercurem, tabes, quam græci φθίσις nominant: urinæ difficultas, quam
 σπασμὸς πύσας appellant: tenuioris intestini morbus, quem ἰλεὺς nomi-
 nant. Fit item lenitas intestinorum, quæ κενεσις vocatur: coxæ dolo-
 res: morbi comitiales. Idemq; tempus, et diutinis malis fatigatos, et
 ab æstate tantum proxima pressos interimit: et alijs nouis morbis
 conficit: et quosdam longissimis implicat, maximeq; quartanis: quæ
 per hyemem quoq; exercent. Neq; aliud magis tempus pestilentie
 patet: cuiuscunq; ea generis est, quamuis uarijs rationibus nocet. Hyems
 autem capitis dolores, tussim, et quicquid in faucibus, in lateribus, in
 uisceribus mali contrahitur, irritat. Ex tempestatibus Aquilo tussim
 mouet: fauces exasperat: uentrem astringit: urinam suppressit: hor-
 rores excitat: item dolores lateris, et pectoris. Sanum tamen corpus
 spissat, et mobilius, atq; expeditius reddit. Auster aures hebetat: sen-
 sus tardat: capitis dolores mouet: aluum soluit: totum corpus effiat he-
 bes, humidum, languidum. Cæteri uenti quo uel huic, uel illi propio-
 res sunt: eo magis uicinos his, illis uel affectus faciunt. Deniq; omnis ca-
 lor, et iecur, et lienem inflammat: mentem hebetat: ut anima defi-
 ciat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus, modo nervorum distentio-
 nem, modo rigorem infert. Illud σπασμὸς, hoc τέντωρ græce nomi-
 natur: nigritiem in ulceribus, horrorem in febribus excitat. In siccita-
 tibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinæ difficultas, articulo-
 rum dolores oriuntur. Per imbres longæ febres, alui deiectiones,
 angina, cancri, morbi comitiales, resolutio nervorum, quam τρεπάλυ-

et græci nominant. Neq; solum interest quales dies sint: sed etiam
 quales ante præcesserint. Si hyems siccæ septentrionales uentos ha-
 buit, uer autem austros, et pluuias exhibet: ferè subeunt lippitudi-
 nes, tormina, febres, maximèq; in mollioribus corporibus: ideoq;
 præcipue in mulieribus. Si uero Austri, pluuiæq; hyemem occupa-
 runt: uer autem frigidum, et siccum est: grauidæ quidem foemi-
 næ, quibus tum adest partus, abortu periclitantur. hæ uero quæ
 gignunt, imbecillos, uixq; uitaless edunt. cæteros lippitudo arida,
 et si seniores sunt, grauedines, atq; destillationes male habent. At
 si à prima hyeme Austri ad ultimum uer continuarunt: laterum do-
 lores, et insania febricitantium, quam *ῥευτιν* appellant, quam ce-
 lerrime rapiunt. Vbi primo calor à primo uere orsus, æstatem quoq;
 similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At
 si siccæ æstas Aquilones habuit: autumno uero imbres, Austriq; sunt:
 tota hyeme, quæ proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibus-
 dam etiam tabes oriuntur. Sin autem autumnus quoq; æq; siccus
 hisdem Aquilonibus perflatur: omnibus quidem mollioribus corpo-
 ribus, inter quæ muliebria esse proposui: secunda ualētudo contin-
 get. durioribus uero instare possunt et aridæ lippitudines, et fe-
 bres partim acutæ, partim longæ, et hi morbi: qui ex atra bile na-
 scuntur. Quod ad ætates uero pertinet: pueri, proximèq; his, uere op-
 time ualent: et æstate prima tutissimi sunt. Senes æstate, et autumnū
 prima parte iuuenes hyeme: quiq; inter iuuetam, senectutemq; sunt.
 inimicior senibus hyems: æstas adolescentibus est. Tum si qua imbe-
 cillitas oritur, proximum est ut infantes, tenerosq; adhuc pueros ser-
 pentia ulcera oris, quæ *ἀφθαῖ* græci nominant, uomitus, nocturnæ ui-
 giliæ, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerceant.
 Propria etiam dentientium, ginguarūq; exulcerationes, distintio-
 nes neuorum, febriculæ interdum, alui deiectiones, maxillæq; caninis
 dentibus orientibus male habent. quæ pericula plenissimi cuiq; sunt:
 et cui maxime uenter astrictus est. At ubi ætas paulum prociussit:
 glandulæ, et uertebrae, quæ in spina sunt: aliqua inclinationes,
 strumæ, uerrucarum quædam genera dolentia, (*ἀποχρόδρα* græ-
 ci appellant) et plura alia tubercula oriuntur. Incipiente uero iam
 pube ex hisdem multæ, et longæ febres: sanguinis ex naribus cur-
 sus. maximeq; omnis pueritia primum circa quadragesimum diem,
 deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem
 periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem incide-
 runt: ac neq; pubertate, neque primis coitibus, neq; in foemina pri-

in his mensuris finita sunt: ferè longi sunt. Sæpius tamen morbi pueriles, q̃ diutius manserunt: terminantur. Adolescentia morbis acutis, itē comitialibus, tabiq̃ maxime obiecta est: ferèq̃ iuuenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc ætatem laterum, & pulmonis dolores, lethargus, cholera, insania, sanguinis per quædam etiam uelut ora uenarum (αἱμορροΐδας græci appellant) profusio. In senectute spiritus, & urinae difficultas: grauedo articulorum, & renum dolores: nervorum resolutiones: malus corporis habitus (καχεξία græci appellant): nocturnæ uigilie: uitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præcipueq̃ soluta aliis: et quæ sequuntur hæc tormina: uel leuitas intestinorum, ceteraq̃ fusi uetris mala. Præter hæc gradales: tabes, deiectiones, destillationes, item uiscerū, & laterum dolores fatigant. Obesi plerumq̃ acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur: subitoq̃ sæpe moriuntur. quod in corpore tenuiore uix euenit.

De notis aduersæ ualeitudinis futuræ. Caput. II.

Nte aduersam autem ualeitudinē, ut supra dixi, quædam notæ oriuntur, quarū omnium commune est, aliter se corpus habere, atq̃ consuevit: neq̃ in peius tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet. quæ quia neq̃ in eodem habitu subsistere, neq̃ ultra progredi possunt: ferè retro quasi ruina quadam reuoluntur. Peius tamen signum est ubi aliquis contra consuetudinem emacruit, & colorem, decoremq̃ amisit. quoniam in his quæ superant, est quod morbus demat: in his quæ desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc protinus timeri debet, si grauiora membra sunt: si crebra ulcera oriuntur: si corpus supra consuetudinem incaluit: si grauior somnus preffit: si tumultuosa somnia fuerunt: si sæpius expergiscitur aliquis q̃ assuevit: deinde iterū soporatur. si corpus dormientis circa partem aliquam contra consuetudinē insudat: maximeq̃ circa pectus, aut ceruices, aut crura, uel genua, uel coxas. Itē si marcet animus: si loqui, & moueri piget. si corpus torpet: si dolor præcordiorū est, aut totius pectoris: aut qui in plurimis euenit capitis: si saliuæ plenum est os: si oculi cum dolore uertuntur: si tēpora astricta sunt: si membra inhorrescunt: si spiritus grauior est: si circa frontem intentæ uenæ mouentur: si frequentes oscitationes: si genua quasi fatigata sunt: totum uel corpus lassitudinē sentit. Ex quibus sæpe plura, nunq̃ non aliqua se-

brem antecedunt. In primis tamen illud considerandū est, nunquid
sepius horum aliquid eueniat: ac ideo neq; corporis ulla difficultas
subsequatur. Sunt enim quædam proprietates hominum, sine quarū
notitia non facile quicquam in futurum præfagiri potest: Facile itaq;
securus est in his aliquis, quæ sepe sine piculo euasit. Ille sollicitari de-
bet, cui hæc noua sunt: aut q̄ ista nunq̄ sine custodia sui, tuta habuit.

Quæ bona in ægrotantibus signa sint. Caput III.

Bi uero febris aliquem occupat: scire licet non peri-
clitari, si in latus, aut dextrum, aut sinistrum, ut ipsi
uisum est, cubat: cruribus paulū reductis: qui fere sani
quoq; iacentis habitus est: si facile conuertitur: si noctu
dormit: si interdum uigilat: si ex facili spirat: si nō cō-
fluctatur: si circa umbilicum, & pubem cutis plana est: si præcordia
eius sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraq; pte sunt. quod
si paulo humidiora sunt: sed tamen digitis cedunt, & nō dolent: hæc
ualetudo, ut spacium aliquod habebit: sic tuta erit. Corpus quoq; quod
æqualiter molle, & calidum est: quodq; æqualiter totum insudat: &
cuius febricula eo sudore finitur: securitatem pollicetur: quando iam
ad sanitatem uenit corpus. Sternutamentum etiā inter bona indicia est.
Et cupiditas cibi uel à primo seruata, uel etiam post fastidium orta.
neq; terrere debet ea febris, quæ eodem die finita est: ac ne ea quidē,
quæ quamuis longiore tempore euasit: tamen ante alterā accessio-
nem ex toto quieuit sic, ut & corpus integrum, quod ei antea priuē græci
uocant, fieret. Si quis autē incidit uomitus, mixtus esse et bile, & pitui-
ta debet: & in urina subsidere album: leue, æquale sic, ut etiam si
quæ quasi nubecule innatarint: inimum deferantur. At uenter ei qui
à periculo tutus est, reddit modo mollia figurata eodē fere tempore,
quo secunda ualetudine assueuit: modo conuenientia his quæ assumun-
tur. prior citi alius est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet: si
matutinis temporibus coacta magis est: aut si procedente tempore pau-
latim contrahitur, & ruffa est: neq; foeditate odoris similem aluum
sani hominis excedit. Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine morbi de-
scendisse nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus dolorē,
tumorēq; fecit, bonum signum est. sonus uentris inde ad infēio-
res partes euolutus, magisq; etiam si sine difficultate cum stercore
excessit.

Contra grauis morbi periculum est: ubi supinus æger
 iacet porrectis manibus, & cruribus. ubi residere
 c. mult in ipso acuti morbi impetu, præcipueq; pulmo
 nibus laborantibus. ubi nocturna uigilia premitur:
 etiam si interdiu somnus accedit. Ex quo tamen peior
 est, qui inter quartam horam, & noctem: q̄ qui matutino tempore ad
 quartam. Pessimum tamen est si somnus neq; noctu, neq; interdiu acce-
 dit. id enim ferè sine continuo dolore esse non potest. Acq; uero signū
 malum est etiam somno ultra debitum urgeri: peiusq; quo magis se
 sopor interdiu, noctuq; continuat. Mali etiam morbi testimonium est
 uehementer, & crebro spirare: à sexto die cœpisse inhorrescere: plus
 expuere: uix excreare: dolore habere continuū: difficulter ferre mor-
 bum: iactare brachia, & crura: sine uoluntate lachrymare: habere
 humorem glutinosum dentibus inhærentem: cutē circa umbilicam, et
 pubem macram: præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, inten-
 ta: magisq; si hæc dextra parte, q̄ sinistra sunt: periculosissimum ta-
 men est: si uenæ quoq; ibi uehementer agitantur. Mali ē morbi signū
 est, nimis celeriter emacrescere: caput, et pedes, manusq; calidas habe-
 re: uentre, & lateribus frigentibus, aut frigidas extremas partes ac-
 to morbo urgente: aut post sudorem inhorrescere: aut post uomitū sin-
 gultum esse: uel rubere oculos: aut post cupiditatē cibi, post uel longis fe-
 bres hūc fistidire: aut multū sudare, maximeq; frigido sudore: aut ha-
 bere sudores non per totum corpus æquales, quiq; febrem non fini-
 ant: & eas febres, quæ cotidie tempore eodē reuertantur: quæ uel sem-
 per pares accessiones habeant: neq; tertio quoq; die leuentur, quæ uel
 continuant, ut per accessiones increuant: per discessiones tantum mol-
 liantur: nec unquam integrum corpus dimittant. Pessimum est si ne le-
 uatur quidem febris: sed æque concitata continuat. Periculosum est
 etiam post arquatū morbū febrem oriri, utiq; si præcordia dextra
 parte dura manserunt: ac dolentibus his leua. Nulla acuta febris leui-
 ter terrere nos debet. neq; unquam in acuta febre, aut à somno non
 est terribilis neruorum distentio. timere ēt ex somno, mali morbi est.
 Itemq; in prima febre protinus mentem esse turbatam: membrum uel
 aliquod esse resolutum. ex quo casu quamuis uita redditur: tamen id
 ferè membrum debilitatur. Vomitus etiam periculosus est sinceræ pi-
 tuitæ uel bilis: peiorq; si uiridis, aut niger est. At mala urina est, in
 qua subsidunt uel rubra, aut liuida, deterior, in qua quasi fila quædā
 tenuia, atq; alba. pessima ex his, si tanq̄ ex furfuribus factas nubes =

las representat. diluta quoq; atq; alba vitiosa ē: sed in phreneticis maxime. Alius aut mala est ex toto suppressa. Periculosa etiā quae inter febres fluens, conuiescere hominem in cubili non patitur: utiq; si quod descendit est perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans. Præter hæc periculum ostendit id quod excernitur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idemq; subpallidum: uel si est aut liuidum, aut biliosum, aut cruentum, aut peioris odoris, quā ex consuetudine. Malum est etiam, quod post longas febres sincerum est.

De signis longæ ualentinis. Caput. V.

Ost hæc inditia notum est longum morbum fieri. sic enim ne esse est: nisi occidit. Neq; ulla alia spes in malis magnis est: q̄ ut impetum morbi trahendo, aliquis effugiat: porrigaturq; in id tempus, quod curationi locum præstet. protinus tñ signa quedam sunt: ex quibus colligere possumus morbum & si non interemerit: longius tñ tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non auras circa caput tantum, & ceruices oritur: aut ubi febre non quiescente corpus insudat: aut ubi corpus modo frigidum, modo calidum est, & color alius ex alio fit: aut ubi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatē nō peruenit: aut ubi æger pro spacio parum emarescat. Itē si urina modo liquida, et pura est: modo habet quedā subsidencia: si leuia, atq; alba, rubraue sunt, quae in ea subsidunt: aut si quasdā quasī malas representat: aut si bullulas excitat.

De indicijis mortis. Caput. VI.

Ed inter hæc quidem proposito metu spes tamen superest. Ad ultima uero iam uentum esse, testatur nares acutæ, collapsa tempora, oculi conuulsi, frigida, languidaq; aures, & in his partibus leniter uersæ: cutis circa frontem dura, et intenta: color aut niger, aut per pallidus: multoq; magis si ita hæc sunt: ut neq; uigilia præesserit, neq; uentris resolutio, neq; media. Ex quibus causis interdum hæc species oritur: sed uero die finitur. Itaq; diutius durans, mortis index est. Si uero in morbo uetere iam triduo talis est: in propinquo mors est: magisq; si præter hæc oculi quoq; lumen refrugunt et illachrymant: quæq; in his alba esse debent, rubescunt: atq; in hisdem uenulae pallēt: pituitaq; in his inuatis nouissimo angulis inhaerescit: alterq; ex his miior est: nigr; aut uehementer subsederunt: aut facti tumidiore sunt:

LIBER

perq; somnum palpebrae non committuntur: sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet: neq; id fluens aliud expressit: eademq; palpebrae pallent: & idem pallor labra, et nares decolorat. eademq; labra, & nares, oculiq; et palpebrae, et supercilia, aliquaue ex his peruertuntur: isq; propter imbecillitatem iam non audit: aut non uidet eadem: mors denuntiatur. Vbi aegri supini cubant: hisq; genua contrahuntur: ubi deorsum ad pedes subinde delabitur: ubi brachia, & crura nudat, & inaequaliter dispergit: neq; his calor subest: ubi hiat: ubi assidue dormit: ubi his qui munus suae non est: neq; id facere sanus solet: dentibus stridet: ubi ulcus quod aut ante, aut in ipso morbo natum est: aridum, & aut pallidum, aut liuidum factum est. Illa quoq; mortis indicia sunt: unguis, digitiq; pallidi: frigidus spiritus: aut si manibus quis in febre, & acuto morbo uel insania: pulmonis uel dolore, uel capitis, in ueste floccos legit: fimbrias uel diducit: uel in adiuncto pariete si qua minuta eminent: carpit. Dolores etiam circa coxas, et inferiores partes orti, si ad uiscera transierunt: subitoq; desierunt: mortem subesse testantur: magisq; si alia quoq; signa accesserunt. Neq; is seruari potest, qui sine ullo timore febricitans, subito stragulat: aut deuorare saluam suam non potest. Cui uel in eodem febris, corporisq; habitu ceruix conuertitur: sic ut deuorare aequè nihil possit: aut cui simul & continua febris, & ultima corporis infirmitas est: aut cui febre non quiescente exterior pars friget: interior sic calet: ut etiam sitim faciat: aut qui febre aequa non quiescente: simul & delirio, & spirandi difficultate uexatur: aut qui epoto ueratro exceptus distentione nervorum est: aut qui ebrius obmutuit: is enim febre, adiecta nervorum distentione consumitur: nisi aut febris accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solui debet, loqui cepit. Mulier quoq; grauida acuto morbo facile consumitur: & is, cui somnus dolorem auget: & cui protinus in recenti morbo bilis atra, uel infra, uel supra se ostendit: cui uel alterutrum modo se prompsit: cum iam longo morbo corpus eius esset extenuatum, et affectum. sputum et bilisum, & purulentum, siue separatim ista, siue mixta proueniunt: interitus periculum ostendunt. Ac si circa septimum diem tale esse coepit: proximum est ut is circa quartumdecimum diem deccat: nisi alia signa meliora, peioraue accesserint. quae quo leniora, grauioraue subsequuta sunt: eo uel ferio rem mortem, uel maturiorem denunciant. Sudor quoq; frigidus in acuta febre pestiferus est. atq; in omni morbo uomitus: qui uariis, & multorum colorum est: praecipueq; si malus in hoc odor est. Ac sanguinem quoq; in febre uomuisse pestiferum est. Urina uero rubra, & tenuis in magna cruditate esse consuevit: & saepe antequam spacio

maturescat hominem rapit. Itaq; si talis diutius permanet, periculū mortis ostendit. Pessima tamen est, præputæq; mortifera, nigra, crassa, mali odoris: atq; in uiris quidem, & mulieribus talis deterrima est. In pueris uero, quæ tenuis, & diluta est. Alius quoq; uaria pestifera est: quæ strigmentū, sanguinem, bilem uiridem, aliquid modo diuersis temporibus, modo simul: & in mixtura quadam discreta tamen representat. Sed hæc quidem potest paulo diutius trahere. In præcipiti uero iam esse denunciat quæ liquida: eademq; uel nigra, uel pallida, uel pinguis est: utiq; si magna foeditas odoris accessit. Illud interrogari me posse ab aliquo scio, si certa futuræ mortis indicia sunt: quomodo interdum deserti à medicis conualescant: quosdamq; fama prodiderit in ipsis funeribus reuixisse. Quinetiam uir iure magni nominis Democritus, ne finitæ quidē uitæ satis certas notas esse proposuit, quibus medici credidissent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa futuræ mortis essent: aduersus quos, ne dicam illud quidem, quod in uicino sæpe quedam notæ positæ non bonos, sed imperitos medicos decipiunt: quod Asclepiades funeri obuius intellexit eum uiuere, qui efferebatur: ne protinus crimen artis esset, si quod professoris sui: illa tamen moderatius subiiciam. Coniecturalē artem esse medicinam, rationemq; coniecturæ talem esse: ut cum sæpius aliquando responderit, interdum in fallat nos. Si quid itaq; uix in millesimo corpore aliquando decipit: id notā nō habet, cum per innumerabiles homines responderat. Idq; non in his tantum, quæ pestifera sunt, dico: sed in his quoq; quæ salutaria. Si quidem etiam spes interdum frustratur: & moritur aliquis, de quo medicus securus primo fuit. Quæq; medendi causa reperta sunt, non nunquam in peius aliquid conuertunt. Neq; id euitare humana imbecillitas in tanta uarietate corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides, quæ multo sæpius, perq; multo plures ægros prodest. Neq; tamen ignorare oportet in acutis morbis fallaces magis notas esse & salutis, & mortis.

De notis, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit.
Caput sextum.

*S*ed cum proposuerim signa quæ in omnia aduersa ualitudine cōia esse consueverunt: ea quoq; trāsibo, ut quas aliquis in singulis morborū generibus habere possit notis, indicē. Quædā aut sunt, quæ añ febres, quædam, quæ inter eas quid aut intus sit, aut uenturum sit, ostendunt. Ante febres, si caput graue est: aut ex somno oculi cali-

Parua signa indicia

LIBER

gant: aut frequentia sternutamenta sunt: circa caput aliquis pituitæ im-
petus timeri potest. Si sanguis, aut calor abundat: proximum est, ut ali-
qua parte profusum sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit:
ne in malum habitum corpus eius recadat, metus est. Si præcordia do-
lent: aut inflammatio grauis est: aut non toto die concocta fertur urina:
cruditate esse manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio ma-
lus est: hi uel capitis doloribus cōstictantur: uel terrā edunt. Qui diu
habent faciem pallidam, & tumidam: aut capite, aut uisceribus, aut
alio laborant. Si in cōtinua febre puero ueter nihil reddit, mutaturq;
ei color: nec somnus accedit: ploratq; is assidue: metuenda neruorū di-
stentio est. Frequens aut destillatio in corpore tenui, longoq; tabem ti-
mendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non descendit aluus, docet
aut subitam deiectionē, aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, lon-
gæ deiectiones sunt. Vbi dolor in imo uentre et icoxis est, aqua inter-
cutis instat. sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem proposui
periculum est his, quibus uoluntas desidendi est: uenter nihil reddit,
nisi & egre, & durū: tumor in pedibus est. idemq; modo dextra,
modo sinistra parte uentris inuicē oritur, atq; finitur. sed à icinore
id malum proficisci uidetur. eiusdem morbi nota est. Vbi circa um-
bilicum intestina torquentur (σπόροι γὰρ ἱεροὶ nominant) coxq; dolores
manent: eaq; neq; tempore, neq; remedijs soluantur. Dolor aut arti-
culorum, pro ut in pedibus, manibus ue, aut alia qualibet parte sic
est, ut eo loco nerui contrahantur: aut si id membrum ex leui causa
fatigatum, & frigidum, calidoq; offenditur: podagra, chiramagra ue, uel
eius articuli, in quo id sentitur, morbi futurum esse denuntiat. Qui-
bus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit: hi uel ca-
pitis doloribus cōstictentur neesse est: uel in articulis aliquas exulce-
rationes graues habeant: uel aliquo morbo etiam debilitentur. Qui-
bus foeminis menstrua non proueniunt, neesse est capitis acerbissimi
dolores sint: uel quaelibet alia pars morbo infestetur. Eademq; his
pericula sunt, quibus articulorum uitia dolores, tumoresq; sine poda-
gra, similibusq; morbis oriuntur, & desinunt. Vtiq; si saepe tempora
hisdem dolent: noctuq; corpora insudant: si frons prurit, lippitudi-
nis metus est. Si mulier à partu uehementes dolores habet: neq; alia
præter ea signa mala sunt: circa nigissimum diem aut sanguis per na-
res erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicūq;
etiam dolorem ingentem circa tempora, & frontem habebit: is alte-
rutra ratione eum finiet, magisq; si iuuenis erit, per sanguinis pro-
fusionem: si senior, per suppurationem. Febris aut quæ subito sine ra-
tione sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine, et

interdum, & noctu replentur sic, ut neq; capitis dolores, neq; præcordiorum, neq; tussis, neq; uomitus, neq; febricula præcesserit: huius aut in naribus, aut in faucibus ulcus reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est: neq; causa apparet, ulcus in uulua est. Vrina autem crassa, ex qua quod desidet, album est: significat circa articulos, aut circa uiscera dolorem, metumq; morbi esse. Eadem uiridis, aut uiscerum dolorem, tumoremq; cum aliquo periculo subesse: aut certe corpus integrum non esse testatur. At si sanguis, aut pus in urina est: uel uescit, uel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa atrum, uas quasdam exiguis quasi capillos habet: aut si bullat, aut si male olet: & interdum quasi harenam, interdum quasi sanguinem trahit: dolent autē coxæ: quæq; inter has, superq; pubem sunt: & accedunt frequentes ructus: interdum uomitus biliosus, extremæq; partes frigescent: urine crebra cupiditas, sed magna difficultas est: & quod inde excretum est, aque simile uel rufum, uel pallidum est: paulum tamen in eo leuamenti est: alius uero cum multo spiritu redditur: utiq; in renibus uitium est. Aut si paulatim desillat: uel si sanguis per hanc editur, & in eo quedam cruenta concretæ sunt, idq; ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem uescit uitium est. Calculosi uero his indicij cognoscuntur. Difficiliter urina redditur: paulatimq; interdum etiam sine uoluntate desillat. Eadem harenosa est: nonnunq; aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excreatur. Eamq; quidam promptius recti, quidam resupinati: maximeq; hi qui grandes calculos habent: quidam etiam inclinati reddunt: colemq; extendendo, dolorem leuant. Gravitatis quoq; cuiusdam in ea parte sensus est: atq; ea cursu, omniq; motu augentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis uicibus implicant. Fœminæ uero oras naturalium suorum manibus admotis scalpere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admoenerunt, ubi uescicæ ceruicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone uicium est. Mulieri grauidæ sine modo fusa alui elidere partû potest. Eidem si lac ex mamis profluit, imbecillum est, quod intus gerit. duræ mammae sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit: uel distentio neruorû, uel rigor timeri potest. At si à priore parte id euenit: uel lateris acutus dolor, uel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora uenarû sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt: aut aqua

LIBER

intercutis aut tabes sequitur: eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari nō potuit. At si longa tristitia cum longo timore, et uigilia est: atræ bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet: aut capitis dolores sunt: quos sequitur, ut quædam ante oculos tanquam imagines obuerfentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt: et os olet: aut sanguis aliqua parte prorumpit. quorum si nihil evenit, necesse est in cruribus mala ulcera, et ex his nigra cicatrices fiant. Quibus causa doloris neq; sensus eius est, his mens labat. Si in uentrē sanguis confluit: ibi in pus uertitur. Si a coxis, et ab inferioribus partibus dolor in pectus transit: neq; ullum signum malum accessit: suppuratōis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cū rubore, aut calore est: ibi aliquid suppurat. Vrina quoq; quæ in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppuratōem esse denunciat. Hæc uero cum sine febre quoq; uel latentium, uel futurarum rerū notus habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit: atq; etiam aliorū morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est: ubi expeditior alicuius, q̄ sani fuit sermo est: subitaq; loquacitas orta est: et hæc ipsa solito audacior: aut ubi raro quis, et uehementer spirat: uenasq; concitatus habet, præcordiis duris, et tumentibus. Oculorū quoq; frequens motus, et in capitis dolore offusæ oculis tenebræ: uel nullo dolore substante somnus ereptus, continuatq; nocte, et die uigilia: uel prostratum contra consuetudinem corpus in uentrem sic, ut ipsius alui dolor id non coegerit. Item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor, insaniæ signa sunt. Siquid etiam abscessit: et anteq̄ suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculū affert primum furoris, deinde interitus: auris quoq; dolor acutus cū febre continua, uehementiq; sæpe mentem turbat: et ex eo casu iuniores interdum intra septimum diē moriuntur: seniores tardius. quoniam neq; æque magnas febres experiuntur: neq; æque insaniunt: ita sustinent, dum his affectus intus uersatur. Suffusæ quoq; sanguine mulieris mammæ, furorem uenturum esse testantur. Quibus autē longæ febres sunt: his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, inflat his neruorū distentio si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit: idq; sæpe intra septimum diem occidit: quod nisi incadat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionē, tormina. Post hæc intestinorum lenitas oritur. Post nimias desillationes, tabes. post lateris dolores, uitia pulmonum. post hæc, insania. Post magnos feruores corporis, neruorum rigor, aut diſtention. Vbi

distentio. ubi caput vulneratum est, delirium. ubi uigilia torset, nervorum distentio. ubi uehementer uenæ super ulcera mouentur: sanguinis profluvium erit. suppuratio uero pluribus morbis excitatur. Nā si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent: in aliquā partem id malum incumbit, in iunioribus tamen: nam in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante uigesimum diem hominē non sustulerunt: neq; sanguis ex naribus fluxit, maximeq; in adolescentibus. utiq; si inter principia aut oculorū caligo, aut capitis dolores fuerunt: sed cum inferioribus partibus aliquid abscessit. aut si præcordia tumorem mollem habent: neq; habere intra sexaginta dies desinunt: hæretq; per omne id tempus febris. Sed tum in superioribus partibus fit abscessus: ac si inter ipsa ulcera nō fuit: circa aures erumpit. Cumq; omnis longus tumor ad suppurationem ferè spectet: magis se tendit is, qui in præcordijs, q̄ is qui est in uentre: & is qui supra umbilicū, q̄ is qui infra est. si lassitudinis etiam sensus in febre est: uel in maxillis, uel in articulis aliquid abscedit. Interdum quoq; urina tenuis, et cruda sic diu fertur: ut alia salutaria signa sint. Ex quo eo casu plerunq; infra transversum septum, quod διαφραγμα græci uocant, fit abscessus. Dolor autem pulmonis si neq; per sputa, neq; per cucurbitulas, neq; per sanguinis detractionem, neq; per uictus rationem finitus est, uomica aliquas intus excitat aut circa uigesimum diem, aut circa xxx: nonnunq; etiam circa sexagesimum. numerabimus autem ab eo die, quo primū febricitauit aliquis, aut inhorruit, aut grauitatem eius partis sensit. sed hæ uomicæ modo à pulmone, modo à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit: dolorem, inflātionemq; conatit, ipsum calidius est: et si in partem sanam aliquis decubuit: onerare eam ex pondere aliquo uidetur. Omnis etiā suppuratio quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest. Si febris nō dimittit: eaq; interdū lenior est: noctu increscat: multus sudor oritur: cupiditas tussiedī est: et penè nihil in tussi excreatur: oculi rari sunt: malæ rubent: uenæ sub lingua inalbescunt: in manibus fiunt adunci ungues, digiti, maximeq; summi pallēt: in pedibus tumores sunt: spiritus difficiliter trahitur: cibi fastidium est: pustulæ toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor & tussis fuit, & spiritus difficultas: uomica uel ante, uel circa uigesimum diem erumpet. si serius ista cœperint: necesse est quidem increscant. sed quo minus cito affecterint: eo tardius soluentur. Solent etiam in graui morbo pedes cum digitis, unguibusq; nigrescere. quod si non est mors consecuta, & reliquum corpus inualuit: pedes tamen decidunt.

Aurelij Cor.

c

Quæ notæ in quolibet morbi genere, uel spem, uel pericula ostendant.
Caput. VII.

Equitur ut in quolibet morbi genere proprias notas explicem: quæ uel spem, uel periculum ostendant. Ex uiscera do-
lente si purulenta urina processit: inquit ea leue, et album
subsedit: metum detrahit. In pulmonis morbo si sputo ipse
leuatur dolor: quantum id purulentum est: tamen æger facile spirat: fa-
cile excreat: morbum ipsum non difficulter fert: potest ei secunda ua-
letudo contingere. Neque inter initia terreri conuenit: si protinus sputum
mixtum est ruffo quodam, et sanguine, dummodo statim edatur. La-
terum dolores suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diem
purgata finiuntur. Si in icterore uomica est, et ex ea fertur pus pu-
rum, et album: salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex sup-
purationibus uero hæc tolerabiles sunt: quæ in exteriorem partem fe-
runtur, et acuiuntur. Et ex his quæ intus procedunt, hæc leuioribus: quæ
contra se cutem non afficiunt: eamque et sine dolore esse, et eiusdem
coloris, cuius reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoque quacunque par-
te erumpit: si est leue, album, et unius coloris, sine ullo metu est: et
quo effuso febris protinus conquieuit: desieruntque urgere cibi fastidium,
et potationis desiderium. Si quando etiam suppuratio descendit in cru-
ra: sputumque eiusdem factum pro ruffo purulentum est: periculi mi-
nus est. At in tabe eius, qui saluus futurus est: sputum esse debet album,
æquale totum: eiusdemque coloris sine pituita: eique etiam simile esse opor-
tet si quid in nares à capite destillat. Longe optimum est febrem omni-
no non esse. secundum est tantulum esse: ut neque cibum impediat, neque
crebram sitim faciat. Alius in hac uale tudine ea tutata est: quæ cotidie
coacta: eaque conuenientia his quæ assumuntur, reddit. Corpus, id quod
minime tenue, maximeque lati pectoris, atque setosi est: cuiusque cartilago
exigua, et carnosæ est. Super tabem si mulieri quoque suppressa men-
strua fuerunt: et circa pectus, atque scapulas dolor mansit: subitoque san-
guis erupit: leuari morbus solet. Nam et tussis minuitur: et sitis atque fe-
bricula desinunt. Sed ipsæ ferè nisi redit sanguis, uomica erumpit: quæ
quo cruentior, eo melior est. Aqua autem inter cutem minime terribi-
lis est: quæ nullo antecedente morbo caput. deinde quæ longo morbo
superuenit. Vtique si firma uiscera sunt: si spiritus facilis: si nullus do-
lor: si sine calore corpus est: equaliterque in extremis partibus macrum
est: si uenter mollis: si nulla tussis: nulla sitis: si lingua ne per som-
num quidem inarescit: si cibi cupiditas est: si uenter medicamentis mo-
uetur: si per se excrenit mollia, et figurata: si extenuatur: si urina et

uini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & morbum facile sustinet. siquidē in quo omnia hæc sunt: is ex toto tutus ē: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum uero uitia ut podagra, chiragraeq; si iuuenes tentarunt: neq; callum induxerunt: solui possunt: maximeq; torminibus leniuntur: & ex quocunq; modo uenter fluit. Item morbus comitialis ante pubertatem ortus non ægre finitur: & in quo ab una parte corporis uenientis accessionis sensus incipit. optimum est à manibus, pedibusue initium fieri: deinde à lateribus: pessimum inter hæc à capite. Atq; in his quoq; ea maxime prosunt: quæ per deiectiones excernuntur. Ipsa autem deiectio sine ulla noxa est: quæ sine febre est: si celeriter desinit: si contracto uentre nullus motus eius sentitur: si extremam aluum spiritus sequitur. Acris tormina quidem periculosa non sunt: si sanguis, & strigmenta descendunt: dum febris, cæteraq; accessiones huius morbi absint: adeo ut etiam grauida mulier non solum reservari possit: sed etiam partum reservare. Prodestq; in hoc morbo si iam ætate aliquis processit. Contra intestinorū leuitas facilius à teneris ætatibus depellitur: utiq; si fieri urina, et aliabo corpus incipit. Eadem ætas prodest, & in coxæ dolore, & humerorum, et in omni resolutione neruorum. ex quibus coxa si sine torpore est: si leniter friget: quantum magnos dolores habet: tamen & facile, & mature sanatur: resolutumq; membrū si nihilominus aliter fieri sanum potest: oris resolutio, etiam alio citā finitur: omnisq; deiectio lippienti prodest. At narix ortus, uel per ora uenarū subita profusio sanguinis, uel tormina insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas uel manus tendunt: uomitus atræ bilis soluantur. et quisquis dolor deorsum tendit: sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones supprimit uomitus. Mulier sanguinē uomens, profusis mēstruis liberatur. Quæ mēstruis nō purgatur, si sanguinē, ex naribus fudit: omni periculo uacat. Quæ locas laborat: aut difficulter partū edū: sternutamento leuatur. Aëstus quartana fere breuis est. cui calor, & tremor est: saluti delirium est. Lienosis bono tormina sunt. deniq; ipsa febris, quod maxime mirū uideri potest: sæpe præsidio est. nā & præcordiorum dolores si sine inflammatione sunt, finit: & in iecinoris dolore succurrit: & neruorū distentionem, rigoremq; si postea cæpit: ex toto tollit: & ex difficultate urinae morbu tenuioris intestini ortum, si urina nam per calorem mouet: leuat. At dolores capitis quibus oculorū caligo, et rubor cum quadā frontis prurigne accedunt: sanguinis profusione, uel fortuita, uel et petita summoventur. si capitis, ac frontis dolores ex uento, uel frigore, aut aestu sunt: grauedine, et sternutamentis finiuntur.

LIBER

Febrem autem ardentem, quam græci *ναύσωνα* uocant: subitus horror
 exoluit. si in febre aures obtusæ sunt: si sanguis e naribus fluxit: aut
 uenter resolutus est: illud malum desinit ex toto. Nihil plus aduersus
 surditatem, quàm biliosa aliis potest. Quibus in fistula urinae uti me-
 nuti apices, quos *ὀύματα* græci uocant: esse cœperūt: ipsi ubi pus ea pte
 profluxit, sanitas redditur. ex quibus cum pleraq; per se proueniant:
 scire licet interea quoq; quæ ars adhibet: naturā plurimū posse. Con-
 tra si caput febre continenti dolet: neq; quicquam reddit: malum atq;
 mortiferum est: maximeq; id periculum est pueris à septimo anno ad
 quartum decimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non
 fiat: deinde à septimo die cœpit, & ultra septimum mansit: peri-
 culosum est. Quantoq; magis mixtos, neq; inter se diductos colores ha-
 bet: tanto deterius. et tamen nihil peius est, quàm sincerum id edi: siue
 ruffum est, siue cruentum: siue album, siue glutinosum: siue palli-
 dum, siue spumans. nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo peri-
 culosa sunt tussis, destillatio, etiam quod aliàs salutare habetur, sternu-
 tamētum. Periculosissimūq; est si hæc secuta subita deiectio est. Ferè
 uero quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa,
 & asperiora esse consueverunt. Ex iecinore si pus cruentum exit: mor-
 tiferum est. At ex suppurationibus hæc pessimæ sunt: quæ intus ten-
 dunt sic, ut exteriorem quoq; cutem decolorent. Ex his deinde, quæ
 in exteriorem partem prorumpūt, quæ maximæ: quæq; planissimæ
 sunt. Quod si ne rupta quidem uomica uel pure extrinsecus emissio
 febris quiescit: aut quauis quiescit: tamen repetit. item si sitis est: si
 cibi fastidium, si uenter liquidus, si pus est liuidum, & pallidum, si
 nihil æger excreat, nisi pituitam spumantem: periculum certum est.
 Atq; ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concita-
 runt: ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores. At in tabe sputum
 mixtum, purulentum, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit: &
 siti affligit in corpore tenui: periculum subesse testatur. Si quis etiam
 in eo morbo diutius traxit: ubi capilli fluit: ubi urina quadam ara-
 neis similia subsidentia ostendit: atq; in his odor fædus est: maximeq;
 ubi post hæc orta deiectio est: protinus moritur. Vtiq; si tempus au-
 tumni est: quo ferè qui cætera parte anni traxerunt: resoluuntur. Ne
 pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum
 est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo uomica, fistulæq; ori-
 ri: quæ non facile sanescunt: nisi si multa signa bonæ ualeitudinis sub
 secuta sunt. Ex reliquis uero minime facile sanantur uirgines, aut hæ
 mulieres: quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui uero sano
 subitus dolor capitis ortus est: deim somnus oppressit, sic ut stertat:

neq;

neq; expergiscatur, intra septimum diem pereundū est: magis si cum alius cita non antecesserit. Si palpebræ dormientis non coeunt: si albi oculorum apparet. quos tamen ita mors sequitur: si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo coepit: ad sanitatem raro perducitur. utiq; si contraria his, quæ supra posita sunt: subsequuntur. æque in ea quoq; tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumq; erupit: & aqua medium corpus implevit. Quibusdam etiā in hoc morbo tumores oriuntur: deinde desinunt: deinde rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt: quā qui supra compressi sunt, si attenduntur. sed ferè fiducia secundæ valetudinis operprimuntur. Illud iure aliquis mirabitur: quomodo quadam simul & affligunt nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem implevit: siue in magno abscessu multum puris coijt: simul id omne effudisse æque mortiferum est: ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli vero, qui sic dolent, ut super eos ex callo quadam tubercula innata sint: nunquam liberantur. quæq; eorum uicia uel in senectute ceperunt: uel in senectutem ab adolescentia peruenierunt, ut aliquando leniri possint: sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoq; comitialis post annum quintum & uigintiimum ortus ægre curatur: multoq; ægrius is, qui post quadragesimum annum coepit, adeo ut in ea ætate aliquid in natura spei, uix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficiatur: neq; ante in partibus aliquis uenientis mali sensus est: sed homo ex improviso concidit: cuiuscuq; is ætatis est: uix sanescit. Si uero aut mens læsa est: aut nervorum facta resolutio: medicinæ locus non est. Deiectionibus quoq; si febris accessit: si inflammatio iocinoris, aut præcordiorum, aut uentris: si immodica sitis, si longius tempus, si alius uaria, si cum dolore est: etiam mortis periculum subest. maximeq; si inter hæc tormina uetera esse ceperunt. Isq; morbus maxime pueros absumit usq; ad annum decimum. cæteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoq; grauida eiusmodi casu rapi potest, atq; etiam si ipsa conuuluit, partum tamen perdit. Quin etiā tormina ab atra bile orsa, mortifer. sunt: aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra alius profuxit: aut intestinorum leuitas. Periculosior est si frequens deiectio est: si uenter omnibus horis, & cum somno, & sine hoc profluit: si similiter noctu, & interdiu: si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum: & præter id etiam leue, & mali odoris sit: si sitis urget: si post potionem urina non redditur: quod enenit quia tunc liquor omnis non in uesciā, sed in intestina descendit: si os exulceratur: si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distan-

Aurelij Cor.

c iij

LIBER

gnitur: si uenter est quasi fermentatus, pinguis, atq; rugosus: si & ibi cupiditas non est. Inter quæ cum euidentis mors sit, multo euidentior est: si iam longum quoq; id uitium est: maximeq; si etiã in corpore senili est. Si uero in tenuiore intestino morbus est: uomitus, singultus, nervorum distentio, delirium: mala sunt. At in morbo arquato durũ fieri iecur perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt: deinde uersa sunt: uel in aquam inter cutem, uel intestinorum leuitatem uix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris, nisi resolutus est intra septimum diem, occidit. Mulier ex partu si cum febre uehementibus etiam, & assiduus capitis doloribus premitur: in periculo mortis est. si dolor, atq; inflammatio est in his partibus, quibus uiscera continentur: frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est: & in cernices, ac scapulas transit: rursumq; in caput reuertitur: aut à capite ad cernices, scapulasq; peruenit: perniciosus est: nisi uomitam aliquam excitauit sic, ut pus extussiretur: aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit: aut nisi in capite multa prurigo, toto ue corpore pustulæ ortæ sunt. Aequè magnum malum est, ubi torpor, atq; prurigo peruagantur modo per totum caput, modo in parte: aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est: eaq; ad summam quoq; linguam perueniunt. Et cum in hisdem abscessibus auxilium sit: eo difficilior sanitas est: quo minus sæpe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ uero doloribus si uehemens torpor est: frigescatq; crus, & coxa: aliusq; nisi coacta non reddit: idq; quod excernitur, mucosum est: iamq; ætas eius hominis quadragesimum annum excessit: is morbus erit longissimus, minimeq; annuus: neq; finire poterit nisi aut uere, aut autumno. Difficilis æque curatio est in eadem ætate, ubi humerorum dolor uel ad manus peruenit: uel ad scapulas tendit: torporemq; & dolorem creat: neq; bilis uomitu leuatur. Quacumq; uero parte corporis membrum aliquod resolutum est: si neq; mouetur, & emacrescat: in pristinum habitum non reuertitur: eoq; minus quo uetustius id uitium est: & quo magis in corpore senili est. Omnisq; resolutioni nervorum ad medicinam non idonea tempora sunt hyems, & autumnus. aliquid sperari potest uere, & æstate. Isq; morbus mediocris uix sanatur: uehemens sanari non potest. Omnis etiã dolor minus medicinæ patet: qui sursum proædit. Mulieri grauidæ, si subito mammæ emacruerunt: abortus periculũ est. Quæ neq; peperit, neq; grauida est, si lac habet: à menstruis defecta est. Quartana æstus breuis: autumnalis ferè longus est: maximeq; quæ cœpit hyeme appropinquante. si sanguis profluxit: deinde secuta est dementia cum distensione nervorum: periculum mortis est. Itemq; si

medicamentis purgatum, & adhuc inanem, nervorum distentio oppres-
sit: aut si in magno dolore extremæ partes frigent: neq; is ad vitam
redit: qui ex suspendio spumante ore detractus est. Alius nigra san-
guini atro similis repentina siue cum febre, siue etiam sine hac, per-
niciosa est.

De morborum curationibus. Caput. VIII.

Ognitis inditijs, quæ nos uel spe consolentur: uel metu ter-
reant: ad curationes morborum transeundum est. Ex his
quædam cões sunt: quædam propriæ. cões, quæ pluri-
bus morbis opitulantur. propriæ, quæ singulis. ante de
communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed
sanos quoq; sustinent: quædam in aduersa tantum ualitudine adhiben-
tur. Omne uero auxilium corporis aut demit aliquam materiam:
aut adiçat: aut euocat: aut reprimit: aut refrigerat: aut calefacit: si-
mulq; aut durat: aut mollit. Quædam non uno modo tantum, sed et
duobus inter se non contrarijs adiuuant. Demitur materia sanguinis
detractione, cucurbitula, deiectione, uomitu, frictiõ, gestatione, omniq;
exercitatione corporis, abstinentia, sudore: de quibus protinus dicam.

De sanguinis detractiõne per uenas. Caput. IX.

Anguinem incisa uena mitti nouum non est. sed nullum
pene morbum esse, in quo non mittatur: nouum est. Item
mitti iunioribus, & sceminis uterũ non gerentibus, uetus
est. In pueris uero idẽ experiri, & in senioribus, & in
gravidis quoq; mulieribus uetus non est. si quidẽ antiqui primam, ul-
timamq; ætatem sustinere non posse hoc auxilij genus indicabant: per-
suasit autẽ sibi mulierem gravidã, quæ ita curata esset: abortum esse
facturã. Postea uero usus ostendit nihil ex his esse perpetuum: aliasq;
potiores obseruationes adhibendas esse: ad quas dirigi curantis consi-
lium debeat. interest enim non quæ ætas sit: neq; qd in corpore in-
tus geratur: sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est: aut si mu-
lier, quæ grauida non est: parum ualet: male sanguis emittitur. E mo-
ritur enim uis, si quæ his supererat: et hoc modo erepta ẽ. At firmus
puer, & robustus senex, & grauida mulier ualens, tuto curantur. Ma-
ximè tamen in his medicus imperitus falli põt: quia ferè minus robo-
ris illis ætatibus subest. Mulieriq; prægnatũ post curationẽ quoq; uiri-
bus opus est nõ tantũ ad se, sed et ad partiũ sustinendũ. Non qd autẽ
c iij

intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est: cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret: neque conceptionem solam uideat: sed vires æstimet: & ex eo colligat, possit nec ne superesse quod uel puerum, uel senem, uel in una muliere quod duo corpora simul sustineat. Interest enim inter ualens corpus, et obesum: inter tenue, & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem eiusmodi sustinent: celeriusque ea, si nimium est pinguis: quis affligitur. Ideoque uis corporis melius ex uenis, quam ex ipsa specie æstimatur. neque enim solum hæc consideranda sunt, sed etiam morbi genus quod sit. utrum superans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia uel deest, uel integra est: istud alienum est. At si uel copia sui male habet, uel corrupta est: nullo modo melius succurritur. Ergo uehemens febris ubi rubet corpus, plenæque uenæ tument: sanguinis detractionem requirit. Item uiscerum, morbi, nervorumque resolutio, & rigor, & distentio, quicquid denique fauces difficultate spiritus strangulat: quicquid subito suppressit uocem: quisquis intolerabilis dolor est: & quacunque de causa ruptum aliquid intus, atque collisum est. Item malus corporis habitus, omnesque acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocent: fieri tamen potest, ut morbus quidem id desideret: corpus autem uix pati posse uideatur. Sed si nullum tamen appareat aliud auxilium: periturusque sit qui laborat, nisi temeraria quoque uia fuerit adiutus: in hoc statu boni medici est ostendere: quod nulla spes sine sanguinis detractione sit: fatentique quantum in hac ipsa re sit metus. & tum demum si exigetur, sanguinem mittere. de quo dubitari in eiusmodi re non oportet: satius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. idque maxime fieri debet ubi nervi resoluti sunt: ubi subito aliquis obmutuit: ubi angina strangulatur: ubi prioris febris accessio penè conficit, paremque subsequi uerisimile est, neque eandem uidentur sustinere ægri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus: tamen ne id quidem perpetuum est. neque enim semper concoctionem res expectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decidit: si contusus est: si ex aliquo subito casu sanguinem uomit, quantum paulo ante sumpsit cibum: tamen protinus ei demenda materia est: ne si subsederit, corpus affligat. Idemque etiam in alijs casibus repentinis qui strangulabunt, dictum erit. At si morbi ratio patietur: tum demum nulla cruditatis suspicionem remanente id fiet. Ideoque ei rei uidetur aptissimus aduersæ natiuitatis dies secundus, aut tertius. sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est: sic nunquam uile post diem quartum est:

tum est:

tum est: cum iam spatio ipso materia & exhausta est, & corpus cor-
rumpit: ut detractio imbecillum id facere possit: non possit integrum.
Quod si uehemens febris urget: in ipso impetu eius sanguinem mitte-
re, hominem ingulare est. Expectanda ergo remissio est, si non decre-
scat: sed crescere desit: neque speratur remissio, tunc quoque, quamuis pe-
ior: sola tamen occasio non omittenda est. Ferè etiam ista medicina
ubi necessaria est: in biduum diuidenda est. satius est enim in primū
lenare ægrum: deinde perpurgere: quàm simul omni vi effusa for-
tasse præcipitare. Quod si in cura quoque aquæ, quæ inter cetera est,
ista respondet: quanto magis necesse est in sanguine respondeat. mitti
uero is debet, si totius corporis causa sit, ex brachio: si partis alicuius,
ex ea ipsa parte: aut certe quàm proxima. quia non ubique mitti potest,
sed in temporibus: in brachijs, iuxta talos. Neque ignoro quosdam dice-
re quamlongissime sanguinem inde, ubi lædit, esse mittendum. sic enim
auertit materiæ cursum: at illo modo in id ipsum quod grauatur, euocat-
ri. sed id ipsum falsum est. Proximum enim locum primo exaruit.
Ex ulterioribus autem catenus sanguis sequitur, quatenus emittitur.
ubi is suppressus est: quia non trahitur, ne uenit quidem. Videtur ta-
men usus ipse docuisse: si caput fractum est, ex brachio potius sangui-
nem mittendum esse. Si quod in humero uicium est, ex altero brachio:
credo quia si quid parum cesserit, opportuniore hæ partes iniuriæ
sunt: quæ iam male habent. auertitur quoque interdum sanguis, ubi
alia parte prorumpens: alia emittitur. Desinit enim fluere qua uolu-
mus: inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere. Mittere autem
sanguinem cum sit expeditissimum: usum habenti, tam ignaro diffi-
cillimum est. iuncta enim est uena arterijs, his nervi. ita si nervum
scalpellus attingit: sequitur nervuorum distentio: eaque hominem crudeli-
ter consumit. At arteria incisa neque coit, neque sanescit: interdum etiam
ut sanguis uehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque uenæ, si forte præ-
cisa est, capita comprimuntur: neque sanguinem emittunt. At si timide
scalpellus demittitur: summam cutem lacerat: neque uenam incidit. Nō
nunquam etiam ea latet: neque facile reperitur. ita multæ res id diffi-
cile incito faciunt: quod perito facillimum est. Incidenda ad medium
uena est: ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumque oportet
attendere. Nam si is crassus, & niger est, uitiosus est: ideoque utiliter
effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. eaque missio sanguinis adeo
nō prodest: ut etiā noceat protinusque is suppressendus est. Sed id eue-
nire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mitten-
dus sit. Illud magis fieri solet, ut æque niger assidue ac primo die
profluat. quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit: suppressen-

duus est: semperq; ante finis faciendus est, q̄ anima deficiat. deligendumq; brachiū super imposito expresso ex aqua frigida penicillo: et postero die auerso medio digito, non aut scalpello, uena ferienda: ut recens coitus eius resoluatur: iterumq; sanguinem fundat. Siue aut primo, siue secundo die sanguis, qui crassus, et niger initio fluxerat: et rubere, et pellucere coepit: satis materiae detractum est: atq; quod superest, sincerum est. Ideoq; protinus brachium deligandum: habendumq; ita est, donec ualens cicatrix sit: quæ celerime in uena confirmatur.

De sanguinis detractione per cucurbitulas. Caput. X.

Cucurbitularum uero duo genera sunt: æneum, et corneum. Aenea altera patet: altera clausa est. Cornea altera parte æque patens, altera foramen habet exiguum. In æneam linamentum ardēs coniicitur: ac sic os eius corpori aptatur: imprimaturq; donec inhaereat. Cornea per se corpori imponitur: deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est: superq; cæra cauum id clausum est: æque inhaereat. Vtraq; non ex his tantum materiae generibus, sed etiam ex quolibet alio recte fit. At si cætera defecerūt: caliculus quoq; aut pultarius oris compressioris ei rei commode aptatur: ubi inhaesit: si concisa ante scalpello cutis est, sanguinem extrahit. si integra est, spiritum. Ergo ubi materia quæ intus est, lædit illo modo: ubi inflatio, hoc imponi solet. Vtus autem cucurbitulae præcipuus est: ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua uitium est: quam exhauriri ad confirmandam ualitudinem satis est. Idq; ipsum testimonium est: etiam scalpello sanguinē, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte: quæ iam laesa est: esse mittendum. q̄ nemo cucurbitulam diuersæ parti imponit: nisi cum profusionem sanguinis eo auertit: sed ei ipsi quæ dolet: quæq; liberanda est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis: quandois et spaciū aliquod accessit: siue corrupta materia, siue spiritu male habente. In acutis quoq; quibusdā si et leuari corpus debet: et ex uena sanguinem mitti: uires non patiuntur. Idq; auxilium ut minus uehementis, ita magis tutum. Neq; unquam periculosum est, et si in medio febris impetu et si in cruditate adhibetur. Ideoq; ubi sanguinem mitti opus est: si incisa uena præceps periculum est: aut si in parte corporis etiam uitium est: huc potius confugendum est. cū eo tamen ut scia mus, hic ut nullum periculum, ita leuius præsidium esse: nec posse uehementi malo, nisi æque uehemens auxilium succurrere.

De deiectione. Caput. XI.

d Eiectionem aut antiqui varijs medicamentis, crebraq; alui
 ductione in omnibus ferè morbis moliebantur: dabantq;
 aut nigrum ueratrū, aut filiculam, aut squamam æris,
 quam *λεπίδος χαλκου* græci uocant: aut lactucæ marinæ
 lac: cuius gutta pani adiecta, abunde purgat: aut lac uel asininum, uel
 bubulum, uel caprimum: eiq; salis paulum adiciebant: decoquebantq;
 id: et sublatis his, quæ coierant: quod quasi serum supererat: bibere
 cogebant. Sed medicamenta stomachū ferè lædunt. ideoq; omnibus cat-
 tharticis aloë miscenda est. Alius si uehementius fluit: aut sæpius duci-
 tur: hominem infirmat. Ergo nunquam in aduersa uale tudine medica-
 mentum eius rei causa recte datur: nisi ubi is morbus sine febre est. Ut
 cum ueratrū nigrum, aut atra bile uexatis, aut cum tristitia insanien-
 tibus, aut is quorū nerui parte aliqua resoluti sunt: datur. At ubi fe-
 bres sunt: satius est eius rei causa cibos, potionesq; assumere: qui simul
 et alant: et uentrē molliant. Suntq; uale tudinis genera, quibus ex la-
 cte purgatio conuenit. Plerunq; uero alius potius ducenda est: quod ab
 Asclepiade quoq; sic uisuperatum, ut tamen seruatum sit: uideo ple-
 runq; sæculo nostro præteriri. Est autem ea moderatio, quam is se-
 ctus uidetur: aptissima: ut neq; sepe ea medicina tentetur: et tamen se-
 mel sumptum uel bis, non omittatur. Si caput graue est: si oculi cali-
 gant: si morbus maioris intestini est, quod *γραεινῶλον* nominant: si in
 imo uentre, aut in coxa dolores sunt: si in stomachū quedam biliosa
 cōcurrunt: uel et pinxit eò se, humor uel aliquis aquæ similis confert:
 si spiritus difficiliter redditur: si nihil per se uenter excernit. utiq; si
 iuxta quoq; stercus est, et intus remanet: aut si stercoris odorē nihil
 deiciens, æger ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est quod excerni-
 tur: aut si prima inedia febrē non sustulit: aut si sanguinem mitti, cui
 opus sit: uires non patiuntur: tempus uel eius rei præterijt. aut si mul-
 tum ante morbū aliquis portauit: aut si is qui sæpe, uel sponte, uel casu
 purgatus est: subito habet aluū suppressam. seruanda uero illa sunt, ne
 ante diem tertiu ducatur: ne ulla cruditate substante, ne in corpore in-
 firmo, diuq; aduersa uale tudine exhausto: ne uel in eo, cui satis alius
 reddit cotidie, qui uel eam liquidam habebit: ne in ipsa accessione in-
 petu, quæ quod tum infusum est, alio continetur: regestumq; in caput
 multo grauius piculū efficit. pridie uero abstinere debet æger: ut aptus
 tali curationi sit. Eodē die ante aliquot horas aquā calidā bibere, ut
 superiores eius ptes madescat: tum imittēda in aluū est: si leni medici-
 na cōiecti sumus: pura aqua, si paulo ualētiori: mulsa, si leni, ex aqua in

LIBER

qua fœnum græcum uel ptisana uel malua decocta sit. si reprimendi causa: ex uerbis. acris autem est marina aqua uel alia, sale adiecto: atq; utraq; decocta commodior est. Acrior fit adiecto uel oleo elu nitro uel melle quoq; si acrior est: eo plus extrahit: sed minus faciel sustinetur. Id quod infunditur: neq; frigidum esse oportet: neq; calidū: ne alterutro modo lædat. Cum infusum est: quantum fieri potest continere se in lectulo debet æger: nec primæ cupiditati deiectionis pro sinus cedere. ubi necesse est, tum demum residere. ferèq; eo modo dempta materia superioribus partibus leuatis morbum ipsum molit. Cum uero, quoties res cœgit, desidendo aliquis se exhausit: paulisper debet conuiescere, et ne uires deficiant: utiq; eo die cibum assumere. qui plenior an exiguus sit dandus: ex ratione eius accessionis, quæ expectabitur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

De uomitu. Caput. XII.

Vomitus ut in secunda quoq; ualitudine sæpe necessarius biliosis est: sic et in his morbis, quos bilis concitauit. Ergo omnibus, qui ante febres horrore, et tremore uexantur: omnibus, qui cholera laborant: omnibus et cum quadam hilaritate insanientibus, et comitiali quoq; morbo oppressis, necessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut in cholera: si febris est, ut inter horrores: asperioribus medicamentis opus nō est: sicut in deiectionibus quoq; supra dictum est. satisq; est ea uomitus causa sumi: quæ sanis quoq; sumenda esse proposui. At ubi longi ualentisq; morbi sine febre sunt, ut comitialis, aut insania: ueratro quoq; albo utendū est: id neq; hyeme, neq; æstate recte datur: optime uere: tolerabiliter autumno. quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humidius sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper ægris prodesse: semper sanis nocere.

De frictione. Caput. XIII.

Frictione uero, et gestatione adeo multa Asclepiades tanquam inuentor eius posuit: quod in eo uolumine, quod communium auxiliorum scripsit: cum trium tantum facere mentionem, uinis. s. et aque, et gestationis: tamen maximam partem in hoc consumpserit. Oportet autem neq; recentiores uiros in his fraudare: quæ uel repererunt: uel recte secuti sunt. Et tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt: authoribus suis reddere. Neque dubitari potest quin latius quidem

et dilucidius ubi, et quomodo frictione utendū esset. A sclepiades præ-
 cepit: nihil tamen reppererit, quod non à vetustissimo auctore Hip-
 pocrate paucis uerbis cōprehensum sit: qui dixit. frictione, si uichemes
 sit, durari corpus: si lenis, moliri: si multa, minui: si modica, impleri. se-
 quitur ergo ut tum utendum sit: cum aut astringendum corpus sit,
 quod fluēs est: aut moliendū quod induruit: aut digerendū in eo quod
 copia nocet. aut alendum id q̄ tenue: et infirmum est. Quas tamen
 species si quis curiosius aestimet, quod iam ad medicum non pertinet: fa-
 cile intelliget omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam et astrin-
 gitur aliqd eo dempto: quod interpositum, ut id laxaretur, efficerat.
 et molitur eo detracto, quod duriciē creabat: et impletur non ipsa
 frictione, sed eo cibo: qui postea usq; ad cutem digestionē quadam rela-
 xatam penetrat. Dīuersarum uero rerū in modo causa est. Inter un-
 ctionem autem, et frictionem multum interest. Vng. n. leuiterq; per-
 tractari corpus ēt in acutis, et recentibus morbis oportet: in remissio-
 ne tamen, et ante cibum. Longa uero frictione uti neq; in acutis mor-
 bis, neq; in crescentibus conuenit: præter q̄ cum phrenitis somnus ea
 requiritur. Amat aut hoc auxiliū ualetudo longa, et ēt à primo im-
 petu inclinata. Neq; ignoro quosdā dicere omne auxilium necessarium
 esse increscentibus morbis: non cum iam per se finiuntur. quod non
 ita se habet. Potest. n. morbus etiam qui per se finem habiturus est: ci-
 tius tamen adhibito auxilio tolli. quod duabus de causis necessarium
 est: ut et q̄ primum bona ualetudo contingat: et ne morbus qui re-
 manet, iterum quamuis leui de causa exasperetur. Potest. n. morbus mi-
 nus grauis esse q̄ fuerit: neq; ideo tamen solui: sed reliquis quibusdā
 inhærere: quas admotum aliquod auxiliū discent. Sed ut leuata quoq;
 aduersa ualetudine recte frictio adhibetur: sic nunq; adhibenda est fe-
 bre increscente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea uacabit:
 minus certe cum ea remiserit. Eodem autem modo in tutis corpori-
 bus esse debet: ut cum infirmus aliquis implendus modo est in par-
 tibus: aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit: aut quia
 alterius. Nam et capitis longos dolores ipsius frictio leuat: non in
 impetu tamen doloris, et membrum aliquod resolutum ipsius fri-
 ctione confirmatur. Longe tamen sepius aliud perfricandum est, cum
 aliud doler: maximeq; cum à summis, aut à medijs partibus corporis
 euocare materiā uolumus: ideoq; extremas partes pfricamus. Neq;
 audiendi sunt, qui numero finiunt quoties aliquis perfricandus sit. Id
 enim ex uiribus hominis colligendum est. Et si is qui per infirmus est:
 potest satis esse, quinquagies. si robustior pōt, ducenties esse faciendum.
 Inter utrumq; deinde prout uires sunt. Quo fit ut et minus saepe in

LIBER

muliere, quàm in uiro: minus sæpe in puero, uel sene, quàm in iuvene manus dimouendæ sint. Deniq; si certa membra perficiantur: multa, ualentiq; frictione opus est. Nam neq; totum corpus infirmari cito per partem pôt: & opus est quâ plurimū materiæ digerere: siue id ipsum membrum, siue per id aliud leuamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationē per totum id exigit: breuior esse debet, & lenior: ut tantummodo summam cutem emolliat: quo facilius capax ex recēti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam ægrum esse testatur: ubi exterior pars corporis friget: interior cum siti calet: ut supra posui. Sed tunc quoq; unicum in frictione præsidium est: quæ si calore in cutem euocauit: potest alicui medicinæ locum facere.

De gestatione. Caput. XIII.

g Estatio queq; longis etiam, & inclinatis morbis aptissima est: utilisq; est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent: sed adhuc exerceri per se nō possunt: & his quibus lentæ morborū reliquæ remanent: neq; aliter eliduntur. Aesclepiades etiam in recenti, uehementiq; febre, præcipuq; ardente, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum esse: sed id periculose fit: meliusq; quiete eiusmodi impetus sistitur. si quis tamen experiri uolet: sic experiatur. si lingua non erit aspera: si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor uisceribus, aut capiti, aut præcordijs suberit. et ex toto nunquā gestari corpus dolens debet: siue id in toto, siue in parte est: nisi tamen solus nervus, dolentibus, neq; unquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt et pro uiribus cuiusq; & pro opibus: ne aut imbecillum hominem nimis digerant: aut humili obsint. Gestationum lenissima est navi, uel in portu, uel in flumine. uehementior in alto mari navi, uel lectici, aut scanno: acrior uehiculo. Atq; hæc ipsa & intendi, & leniri possunt. si nihil horum est, suspendi lectus debet: & moueri. si ne id quidem est: at certe uni pedi lecti subiiciendus funiculus est: atq; ita lectus huc, & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis infirmis conueniunt. Valentiora uero his qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his qui grauium morborum initia sic sentiunt: ut adhuc febre uacent. Quod & in tabe, et in stomachi uitijs, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit: aut ubi quidā morbi, qualis comitialis, qualis insania ē sine febre, quanuis diu manent. In quibus affectibus ea quoq; genera exercitationum necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco: quo quemadmodum sani, neq; firmi homines se gererent: præcipimus.

a Abstinentiæ uero duo genera sunt: alterum ubi nihil assumit æger: alterum ubi non nisi quod oportet. Initia morborum primum famem, sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem: ut neq; aliud quam expedit: neq; eius ipsius nimis sumatur. Neq; enim conuenit iuxta mediam protinus sacietatem esse. Quod si sanis quoq; corporibus inutile est: ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore et ægro? Neq; ulla res magis adiuvat laborantem, q̃ tempestiua abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt: sibi ipsis modum uē dicant. Liberaliter agere se credunt qui cætera illorum arbitrio relinquunt: in genere cibi liberi sunt: quasi queratur qd medico liceat: non quid ægro salutare sit: cui uehemēter nocet, quotiens in eius quod assumitur uel tempore, uel modo, uel genere peccatur.

De sudore. Caput. XVI.

s Vdor etiam duobus modis elicitur: aut siccō calore, aut balneo. Siccus calor est, & harenæ calidæ, & lacōni cī, & clibanī, et quarundam naturalium sudationes. ubi ē terra profusus calidus uapor edificio includitur: sicut sup̃ baras in myrtetis habenus. Præter hæc sole quoq; et exercitatioe is mouetur. Vtiliaq; hæc genera sunt quoties humor intus nocet: usq; digerendus est. Ac neruorum quoq; quædam uitia sic optime curantur: sed cætera infirmis possunt conuenire. solet exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, uel initio morbi, uel et grauius morbis tenentur. Cauendum autem est nequid horū uel in febre, uel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. nam modo dīscussis febribus initium cibi plenioris, uiniq; firmiteris ualetdini facit: modo febrem ipsam tollit: ferēq; adhibetur, ubi summam ciuem relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. antiqui timidius eo utebātur. Asclepiades audacius. Neq; terrere autem ea res, si tempestiua est: debet. & ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est: simulatq; ea uno die non accessit: eo, qui proximus est, post tēpus accessionis, tuto lauari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic, ut tertio, quarto uē die reuertatur: quandoq; non accessit: balneum tutum est. Manentibus uero adhuc febribus, si hæc sunt lentæ, lienesq; iā diu male habent: recte mediana ista tentatur: cum eo tamen ne præcordia dura sint:

ne'ue ea tumeant: ne'ue lingua aspera sit: ne'ue aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit: ne'ue tum febris increseat. At in his quidem febribus, quae certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt: alterum ante horrorem, alterum febre finita. In his uero, qui lentis febriculis diu detinentur: cum aut ex toto recessit accessio: aut si id non solet, certe lenita est: iamque corpus tam integrum est: quam maxime esse in eo genere ualetudinis solet: imbecillus homo iturus in balneum uisitare debet: ne ante frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum uenit, paulisper resistere: expeririq; num tempora astringantur: Et an sudor aliquis oriatur. Illud si incidit, hoc non secutum est: inutile eo die balneum est: perungendus est is leniter, Et auferendus est: uitandumque omnimodo frigus: Et abstinentia utendum. At si temporibus integris primum ibi, deinde alibi sudor incipit: fouendum os aqua calida: tum in solio desidendum est: atque ibi quoque uidendum, num sub primo contactu aquae calidae summa cutis inhorrescat: quod uix tamen fieri potest, si priora recte cesserunt. certum id autem signum inutilis balnei est. Ante uero, an posteaquam in aquam calidam se demittat: aliquis perungi debeat: ex ratione ualetudinis suae cognoscat. Ferè tamen, nisi ubi nominatim, ut postea fiat, id praecipietur: moto sudore leniter corpus perungendum: deinde in aquam calidam demittendum est. atque hic quoque habenda uirium ratio est. Neque committendum ut per aestum anima deficiat: sed maturius is auferendus: curiosequ; in uestimentis inuoluendus est. ut neque ad eum frigus aspiret: Et ibi quoque antequam aliquid assumat: insudet. Fomenta quoque calida sunt milium, sal, harena, quodlibet eorum calefactum, et in linteam coniectum. Si minore uis opus est: etiam solum linteam. At si maiore: extincti titiones, inuolutique panniculi, Et sic circumdati. Quin etiam calido oleo repletur utriculi: Et in uasa fictilia: ad similitudinem, quas lenticulas uocant: aqua coniungitur: Et sal sicco linteo excipitur. demittiturque in aquam bene calidam. tum super id membrum, quod fouendum est: collocatur: iuxtaque igne ferramenta duo sunt capitula paulo latioribus: alterumque ex his demittitur in eum salem: Et aqua super leniter aspergitur. ubi frigere coepit, ad ignem refertur: Et idem in altero fit: deinde inuicem in utroque: inter quae descendit salsus, Et calidus succus: qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est digrere id quod uel praecordia onerat: uel fauces strangulat: uel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit, in ipsis morborum generibus dicitur.

Qui abi,

Qui cibi, potiones, ne, aut ualentis, aut media, aut imbecillae materiae sint. Caput. XVII.

Ubi de his dictum sit, quae detrahendo iuuant: ad ea ueniendum est, quae nos alunt: id est cibum, et potionem. haec aut non omnium tantum morborum, sed et secundum aetudinis coe praesidia sunt. Pertinetque ad rem omnium proprietates nosse. primum ut sani sciant quomodo his utantur. deinde ut exsequentibus nobis morborum curationem, liceat species rerum, quae assidue necessariae erunt: subijcere. neque necesse est subinde singulas eas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quaeque ex frumentis panificia sunt, generis ualentissimi esse. Id ualentissimum uoco: in quo plurimum alimenti est: item omne animal quadrupes domesticum: omnem grandem feram, quales sunt capreae, ceruus, aper, onager, omnem grandem auem, quales sunt anser, et pauo et grus: omnes beluae marinas, ex quibus cetos est: quaeque his pares sunt. Item mel, et caseum quo minus mirum est, opus pistorium ualentissimum esse: quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat. In media uero materia numerari ex oleribus debere ea: quorum radices uel bulbos assidue minus. Ex quadrupedibus leporem aues omnes a minimis ad phoenix. item pisces omnes, qui salem non patiuntur: solidi uel saluntur. Imbecillissimam uero materiam esse omne olus: et quicquid in cauliculo nascitur: qualis est cucurbita, et cucumis, et capparitis, omnia poma, oleas, coeleas, itemque cochilia. Sed quantum haec ita discreta sunt: tamen et quae sub eadem specie sunt: magna discrimina recipiunt: aliaque res alia, uel ualentior est, uel infirmior. Si quidem plus alimenti est in carne, quam in ullo alio. Firmitus est triticum, quam milium: id ipsum: quam hordeum: et ex tritico firmissima siligo: deinde simila: deinde cui nihil ademptum est, quod aetio papor graeci uocant: infirmior est. ex polline infirmissimus abarius panis. Ex leguminibus uero ualentior faba, uel lenticula, quam pisum. Ex oleribus ualentior rapa, napique, et omnes bulbi: in quibus cepam quoque, et allium numero: quam pastinaca, uel quae specialiter radica appellatur. Item firmitus brassica, et betula, et porrum: quam lactuca, uel cucurbita, uel asparagus. At ex fructibus succulentiorum ualentiores uuae, ficus, maces, palmulae: quam quae poma proprie nominantur. Atque ex his ipsis firmitus, quae succosa: quam quae fragilia sunt. Itemque ex his quibus, quae in media specie sunt: ualentior ea quae pedibus: quam quae uolatu magis nititur: et ex his quae uolatu fidunt: firmitus sunt quae gradiores res aues: quam quae minutae sunt, ut ficedula, et turdus. Atque et quoque,

Aurelij Cor.

d

LIBER

que in aqua degunt, leuiorem cibum præstant: quàm que natandi scientiam non habent. Inter domesticas uero quadrupedes leuissima suilla est: grauiissima bubula. Itemq; ex feris quo maius quodq; animal, eo robustior ex eo cibus est. Pisciumq; eorum, qui ex media materia sunt, quibus maxime utimur: tamen grauiissimi sunt: ex quibus salsamenta quoq; fieri possunt: qualis lacertus est. deinde qui quamuis teneriores: tamen duri sunt, ut aurati, coruus, scyrus, oculata, tum plani, post quos etiam leuiiores lupi, muli; et post hos omnes saxatiles. Neq; uero in generibus rerum tantummodo discrimen est: sed etiã in ipsi: quod et ætate fit, et membro, et solo, et caelo, et habitu. nã quædrupes animal omne si lactans est, minus alimenti præstat. Item quo tenerior pullus, cohortalis est. In piscibus quoq; media ætas, quæ nondum summam magnitudinem impleuit. Deinde ex eodem sue unguis, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hedo'ue cum pectiolis totum caput aliquanto quàm cetera membra leuiora sunt: adeo ut in media materia poni possint. Ex auibus pectora, colla, alæ'ue recte infirmis annumerantur. Quod ad solum uero pertinet: frumentum quoq; ualentius est collinum, quàm campestre. leuior piscis inter saxa editus, quàm in harena: leuior in harena, quàm in limo. Quo fit, ut ex stagno, uel lacu, uel flumine eadẽ genera grauiora sint. Leuiorq; qui in alto, quàm qui in uado uixit. Omne etiam ferum animal domesticum, leuius, et quodcunq; humido caelo, quàm quod siccum natum est. Deinde eadem omnia pingua, quàm macra: recentia, quàm salsa, noua, quàm uetusta plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iurulenta, quàm assa: magis assa, quàm elixa. Ouum durum ualentissimæ materiae est: molle, uel forbile, imbecillissimæ. Cum quæ panificia omnia firmissima sint: elota tamen quædam genera frumenti, ut alia, oriza, ptisana, uel ex hisdẽ facta forbitio, uel pulticula. Et aqua quoq; madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potionibus uero quæcunq; ex frumento facta est: itemq; lac mulsum, defrutum, passum, uinum aut dulce, aut uehemens, aut mustum, aut magnæ uetustatis ualentissimi generis est. At acetum, et id uinum: quod paucorum annorum, uel austerum, uel lene est: in media materia est. Ideoq; infirmis nunquam generis alterius dari debet. A qua omnium imbecillissima est. firmiorq; ex frumento potio est, quo firmitus fuit ipsum frumentum. firmior ex eo uino, quod bono solo, quàm quod tenui: quodq; temperato caelo, quàm quod aut nimis humido, aut nimis siccum: nimumq; aut frigido, aut calido natum est. Mulsum quo plus mellis habet: defrutum quo magis incoctum est: passum quo ex siccioris uina est: eo ualentius est. A qua leuissima pluuialis est: deinde

fontina: tum ex flumine, tum ex puteo: post hæc ex nix, aut glacie: grauior his ex lacu: grauissima ex palude. Facilis etiam et necessaria cognitio est naturam eius requirentibus. nam lenis pondere apta pariet: et ex his quæ pondere pares sunt, eo melior quæque est: quo celerius et calefit, et frigescit: quoque celerius ex ea legumina percoquantur. ferè uero sequitur ut quo ualentior quæque materia est: eo minus facile concoquatur: sed si concocta est, plus alat. Itaque utendum est materia genere pro uiribus: modusque omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus rebus infirmis opus est. mediocriter firmos media materia optime sustinet. et robustis apta, ualidissima est. Plus deinde alijs assumere ex lenioribus potest, magis in his quæ ualentissima sunt, temperare sibi debet.

Quæ natura, ac proprietas cuiusque rei sit, quæ uescimur.

Caput. XVIII.

Equæ hæc solo discrimina sunt: sed etiã aliæ res boni succi:
 n aliæ mali sunt: quas οὐχὺ λασ, uel κακοχὺ λασ græci uocant. Aliæ lenes, aliæ acres: aliæ crassiorem pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiore: aliæ idoneæ sunt stomacho: aliæ alienæ sunt. Itemque aliæ inflant: aliæ ab hoc ab sunt. aliæ calefaciunt: aliæ refrigerant: aliæ facile in stomacho accedunt: aliæ non facile intus corrumuntur. aliæ mouent aluum: aliæ supprimunt. aliæ citant urinam: aliæ tardant. Quædam somnum mouent: quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniã aliud aliter, uel corpori, uel ualitudini conuenit.

Quæ res boni succi sint. Caput. XIX.

b Oni succi sunt triticum, siligo, alia, oriza, amilũ. Itẽ et lenes sunt, et stomacho aptæ: et calefaciunt tragem, ptisanam, lac, casus mollis, omnis uenatio, omnes aues, quæ ex media materia sunt. Ex maioribus quoque hæc, quas supra nominauimus. Mediũ inter teneros, durosque pisces, ut mulus, et lupus, uerna, lactuca, urtica, malua, cucumis, cucurbita, ouũ sorbile, portulaca, cochlea, palmula. ex pomis quodcunque neque acerbum, neque acidũ est. Vinum dulce uel lene, passum, defrutum: olea quæ ex his duobus in alterutro seruata sunt: uulua, rostra, trunculi. In summa omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne iecur.

d ij

LIBER

Quæ res mali succi sint. Caput. XX.

Ali uero succi sunt milium, panicum, hordeum, legumi-
na, caro domestica permacra, omnisq; caro salsa, omne
falsamētum, garū: uetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi,
bulbi, brassica: magisq; et cyma eius, asparagus, beta, cu-
cumis, porrum, eruca, nasturcium, thymum, nepeta, satuireia, hyssopum,
ruta, anethum, feniculum, cuminum, anesim, lapatium, sinapi, et
allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunq; acidum, uel acer-
bum est: acetum, omnia acrida, acida, acerba, oleum: pisces quoq; saxa-
tiles, omnesq; qui ex tenerrimo genere sunt: aut hi qui rursus nimium
duri: uirosiq; sunt: ut ferè quos stagna, lacus, limosi uel riui ferunt:
qui uel in nimiam magnitudinem excesserunt.

Quæ res lenes: quæ uel acres sint. Caput. XXI.

Enes autem sunt sorbitiones, pulticula, lagnum, amilū,
ptisana, pinguis caro, et quæcunq; glutinosa est: Quod
ferè quidem in omni quæ domestica fit: præcipue tamen
in ungulis, trunculisq; suum: in pectiolis, capitulisq; he-
dorum, et uitulorum, et agnorum: omnibusq; cerebellis. Item si qui
proprie bulbi nominantur: lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acrida
sunt omnia nimis austera: omnia acida, omnia salsa, et mel quidem
quo melius est: eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturcium, cu-
cumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocymum, la-
tuca, maximaq; olerum pars.

Quæ res crassiorē, quæ uel tenuiorem pituitā faciunt. Caput. XXII.

Crassiorem autem pituitam faciunt omnia sorbilia, alicia, ori-
za, amilum, ptisana, lac, bulbi, omniaq; ferè glutinosa.
Extenuant eandem omnia salsa, atq; acrida, et acida.

Quæ res stomacho idoneæ sunt. Caput. XXIII.

Stomacho autem aptissima sunt quæcunq; austera sunt:
et quæ acida sunt: quæq; contrita sale modico sunt. Item
panis sine fermento, et elota alia, uel oriza, uel ptisana:
omnis auis, omnis uenatio, atq; utraq; uel assa, uel elixa.
Ex domesticis animalibus bubula. si quid ex cæteris sumitur, macrum
potius,

potius, quàm pingue. Ex sue ungulae, rostra, aures, uulua, sterilesq̃.
 Ex oleribus intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, sifer. Ex po-
 mis cerasium, morum, sorbum, pirũ fragile, quale crustuminum uel
 neauianum est. Item pira quae reponuntur taretina, atq; signina. Ma-
 lum orbiculatum, aut scusdianum, uel amerinum, uel cotoneu, uel pu-
 nacum absinthium. Vuae ex olla naria, eadem aceto intinctae, uel nigrae, quae in ar-
 bore bene permaturuerunt: uel quae in passo, defrutone seruatae sunt.
 Vinum austerum, licet iam asperum sit: item resinatum. Duri ex me-
 dia materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpurae, cochleae, cibi, poti-
 onesq; uel frigidae, uel feruentes, absinthium.

Quae res alienae stomacho sunt. Caput. XXIII.

Lienae uero stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, om-
 nia iurulenta, praedulcia, omnia pingua, sorbitio, panis,
 itemq; uel ex milio, uel ex hordeo, oleum, radices olerũ,
 et quodcunq; olus ex oleo, giro ue estur: mel, mulsum, de-
 frutum, passum, lac, omnis caseus, una recens, ficus & uiridis, & ari-
 da, legumina omnia, quaeq; inflare consueuerunt. item thymum, nepe-
 ta, satureia, hyssopum, nasturtium, lapatium, lapsanum, iuglandes. Ex
 his autem intelligi potest non quicquid boni suci est, protinus stomacho
 conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni suci esse.

Quae inflant, aut inflationem leuant. Caput. XXV.

Inflant autem omnia ferè legumina, omnia pingua, om-
 nia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atq; etiam id uinum,
 cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus alium, cepa,
 brassica, omnesq; radices excepto sifere & pastinaca:
 bulbi, ficus etiam arida, sed magis uirides: uuae recentes, nuxes omnes
 exceptis nucleis pineis: lac, omnisq; caseus, quicquid deinde subcrudũ
 aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex uenatione, aucupio, piscibus,
 pomis, oleis, conchilijs, ouis uel mollibus, uel sorbilibus, uino uetere. Eae
 nichilum uero, & anetum inflationes etiam leuant.

Quae res aut calefaciunt, aut refrigerant. Caput. XXVI.

Calefaciunt piper, sal, atro omnis iurulenta, alliu, cepa,
 ficus arida, salsamentum, uinum, & quo miracius est, eo
 Aurelij Cor. d iij

LIBER

magis refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca. Item coriandru, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasia, mala austeria, pira fragilia, caro elixa, præcipueq; acetu, siue cibis ex eo, siue potio assumitur.

Quæ res intus facile vitiantur, vel minime corrumpuntur.

Caput. XXVII.

Acile autem intus corrumpuntur panis fermentatus, & quisquis alius, quàm ex tritico est: lac, mel, ideoq; lactantia, atq; omne pistoriu opus, teneri pisces, ostrea, olera, & seus & recens, & uetus, crassa uel tenera caro, uinu dulce, mulsum, defrutum, passum, quicquid deinde uel iurulentum est, uel nimis dulce, uel nimis tenue. At minime intus vitiantur, panis sine fermento, aues, et eæ potius duriores, aurati pisces, neq; solu aurata pura, aut scærus, sed etiã lolliigo, locusta, polypus. Item bubula, omnisq; dura caro, eademq; aptior est si macra, si salsa est. omniaq; salsamenta, cochleæ, murices, purpuræ, uinum austerum, uel resinatam.

Quæ res aluum mouent. Caput. XXVIII.

T aluum mouent panis fermentatus, magisq; si cibarius, uel hordeaceus est. brassica, si subcruda est lactuca, anethum, nasturcium, ocymum, urtica, portulaca, radícula, capparitis, allium, cepa, malua, lapatium, beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, una, omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis uiridis, unæ recentes pingues, minutæ aues, cochleæ, garum, salsamenta, ostrea, pelorides, echini, musculi, & omnes ferè conchulæ, maximeq; ius earu, saxatiles, & omnes teneri pisces, sepiarum atramentum: si qua caro assumitur pinguis, eadem uel iurulenta, uel elixa: aues quæ natant, mel crudum, lac, lactantia omnia, mulsum, uinum dulce, uel salsum, aqua, tenera omnia tepida, dulcia, pingua, elixa iurulenta, salsa, diluta.

Quæ res aluum astringunt. Caput. XXIX.

Contra astringunt panis ex siligine, uel ex simila, magis si sine fermento est: magis etiam si uetus est: intenditurq; uis eius et si bis coquitur. pulticula uel ex halica, uel ex panico, uel ex milio. itemq; ex hisdem sorbitio, & magis

si hæc ante fricta sunt. lenticula, cui uel betta, uel intubus, uel ambubeia, uel plantago adiecta est, magisq; et si illa ante fricta est: per se etiam intubus uel ex plantagine, uel ambubeia fricta: minuta olera, brassica bis decocta, dura oua, magisq; si assa sunt: minuta aues, morula, palumbus, magisq; si in posca decoctus est: graues quoq; aues, quæ magis currunt, quàm uolant: lepus, caprea, iecur ex his, quæ seuius habent, maximeq; bubulum, ac seuium ipsum, caseus: qui uehementior uetustate fit, uel ea mutatione quam in caseo transmarino uidemus: aut si recens est ex melle, mulso uel decoctus. Item mel coctum, pira immatura, sorba, magisq; ea: quæ torminalia uocantur, mala cydonia, et punica, oleæ uel albæ, uel permaturæ, myrta, palmulæ purpureæ, murices, uinum resinatum uel asperum: item meracum, acetum mulsum quod inferbuit: item defrutum, passum, aqua uel tepida, uel præfrigida dura, idest ea quæ tarde putrescit, ideoq; pluuia potissimum: omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, et in eadē carne: assa potius, quàm elixa.

Quæ res urinam mouent. Caput. XXX.

Urinam autem mouent quæcunq; in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocymum, menta, hyssopum, anisum, coriandrum, nasturcium, crucca, fœniculum. Præter hæc asparagus, capparitis, nepeta, thymum, satureia, lapsanum, pastinaca, magisq; agrestis, radícula, sifer, cepa. Ex uenatione maxime lepus, uinum tenue, piper et rotundum, et longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei.

Quæ res somnum mouent, aut sensus excitant. Caput. XXXI.

Omno uero aptum est papauer, lactuca, maximeq; aestiua, cuius cauliculus iam lacte repletus est: morum, porrum. Sensus excitat nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueq; pulegium, ruta, et cepa.

Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent, aut emolliant. Caput. XXXII.

Vocare uero materiam multa admodum possunt. sed ea quæ ex peregrinis medicamentis maxime constant: alijsq; magis, quàm quibus ratione uictus suaturritur, opitulantur: in præsentia differam. Ponam ea uero quæ præpita, et his morbis de quibus protinus dicturus sum, apta: corpus erodunt;

d iij

Et sic eo quod mali est, extrahunt. Habent autē hanc facultatem se-
 mina cruce, nasturcij, radicle præcipue tamē omnium sinapi Salis
 quoq; Et fici eadem vis est. leniter uero simul Et reprimunt, Et
 molliunt lana succida uel aceto, uel uino: quo oleum adiectum est.
 contrita palmulæ: furfures in salsa aqua, uel aceto decoctæ. At si-
 mul reprimunt Et refrigerant herba muralis, parthenium uel perdi-
 cium appellant: serpillum, puleium, ocymum, herba sanguinalis, quam
 græci πολυρόριον uocant: portulaca, papaueris folia, cæpreolq; uitiū,
 coriandri folia, hyoscyamū, muscus, sifer, apiū, solanum, quā σποῦχρον
 græci uocant: brassicæ folia, intubus, plantago, fœniculi semē, contrita
 pira uel mala, præcipueq; cydonia, lenticula, aqua frigida maximq;
 pluuialis, uinum, acetum, Et ex horum aliquo magis, madens uel pa-
 nis, uel farina, uel spongia, uel cinis, uel lana succida, uel etiam linte-
 lum, creta cinolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum,
 uerbenarū contusa cum teneris caulibus folia: cuius generis sunt olea,
 cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, he-
 dera, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt coctæ mala cy-
 donia, malicoriū, aqua calida, in qua uerbenæ coctæ sunt, quas supra
 proposui: puluis uel ex fecē uini, uel ex myrti folijs, amaræ nucēs. Ca-
 lesfacit uero ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex far-
 ris, siue hordei, siue erui, uel lolij, uel milij, uel panici, uel lenticulæ, uel
 fabæ, uel lupini, uel lini, uel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaq; im-
 posita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quā ex
 aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iun-
 cta oleo, magisq; si uetus est: sal nigrum, gtt, piper, quinq; folium, fe-
 req; quæ uehementer Et reprimunt, Et refrigerant. Durant quæ ca-
 lesfaciunt, Et digerunt, Et emolliunt. Præcipueq; ad emolliendum po-
 test cataplasma ex lini, uel fœni græci semine. His autem omnibus Et
 simplicibus, Et permixtis uarie medici utuntur: ut magis quid quisq;
 persuasit sibi appareat: quā quid euidenter compererit.

De morborum generibus. Caput. I.

Rouis omnibus, quæ pertinent ad uniuersa
 genera morborum, ad singulorū curationes ue-
 niam. Hos autem in duas species græci diuise-
 runt: aliosq; ex his acutos, alios longos esse di-
 xerunt. Idq; quoniam nō semper eodem mo-
 do respondebant: eosdem aliq̃ inter acutos, aliq̃
 inter longos retulerunt. Ex quo plura eorū ge-
 nera esse manifestum est. Quidam enim breues utiq; sunt, qui cito uel
 tollunt hominem: uel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub q̃bus neq;
 sanitas in propinquo, neq; exitum est. Tertiumq; genus eorum est, qui
 modo acuti, modo longi sunt. idq; non in febribus tantummodo, in
 quibus frequentissimum est: sed in alijs quoq; fit. Atq; etiam præter
 hos quartum est, quod neq; acutum dici potest, quia non perimit: neq;
 utiq; longum, quia si occurrat, facile sanatur. Ego cum de singulis di-
 cam: qui cuiusq; generis sit indicabo. diuidam autem omnes in eos, q̃
 in totis corporibus consistere uidentur: & eos qui oriuntur in parti-
 bus. incipiam à prioribus pauca præfatus de omnibus. In nullo quidē
 morbo minus fortuna sibi uendicare: quā ars potest: ut pote cum re
 pugnante fortuna nihil medicina proficiat. magis tamen ignoscendū
 medico est parum proficienti in acutis morbis, quā in longis. Hic
 enim breue spatium est: intra quod, si quod auxilium non profuit:
 æger extinguitur. ibi & deliberationi, & mutationi remediorū tem-
 pus patet: adeo ut raro, si inter initia medicus accessit: obsequens æger
 sine illius uitio pereat. Longus tamen morbus cū penitus insedit: quod
 ad difficultatem pertinet: acuto par est. & acutus quidē quo uetustior
 est: longus autem quo recentior: eo facilius curatur. Alterū illud ignora-
 ri non oportet: quod non omnibus ægris eadem auxilia conueniunt.
 ex quo incidunt, ut alia, atq; alia summi authores quasi sola uendica-
 rint: prout cuiq; æsserant. Oportet itaq; ubi aliquid non respondit,
 non tanti putare authorē, quanti ægrū: & experiri aliud, atq; aliud:
 sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in lon-
 gis, quos tempus ut facit, sic etiam soluit: non statim condemnetur, si
 quid non statim profuit. minus uero remoueat, si quid paulum sal-
 tem iuuat: quia profectus tempore expletur.

LIBER

Quomodo morbi cognoscantur: et an increscant, an consistant, an minuantur: et qua ratione ab initio qui languere incipit, curari debeat, Caput. II.

Rotinus at inter initia scire facile est, quod acutus morbus, quis longus sit: non in his solis, in quibus semper ita se habet: sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones, et dolores graues urgent: acutus morbus est. Vbi lenti dolores, lentæ uel febres sunt: et spacia inter accessiones porriguntur: acceduntque ea signa, quæ in priore uolumine exposita sunt: longum hunc futurum esse manifestum est. Videndum est est morbus an increscat, an consistat, an minuat: quia quedam remedia increscentibus morbis, plura inclinantibus conueniunt. cæque quæ decrecentibus apta sunt, ubi acutus increscens urget: in remissionibus potius experienda sunt. Increscit autem morbus dum grauioribus dolores, accessionesque ueniunt: hæque et antequam proxime reuertitur: et postea desinunt. Atque in longis quoque morbis etiam tales notæ non habentibus, scire licet increscere: si somnus incertus est, si deterior concoctio, si fædiore deiectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus, aut calor, si idem magis palleat. ea uero quæ contraria his sunt: decedentis eius notæ sunt. Præter hæc in acutis morbis serius ager alendus est: nec nisi iam inclinatis, ut primo dempta materia, impetum frangat. in longis maturius, ut sustinere spatium aduenturi mali possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte est: magis tamen ad rem pertinet uim totius corporis molliri, quam proprie partes egre sanentur. Multum etiam interest ab initio, quis recte curatus sit, an perperam. quia curatio minus his prodest: in quibus assidue frustra fuit. si quis, temere habitus adhuc integris uiribus uisit: admota curatione momento restituitur. Sed cum ab his cæperim, quæ notis quasdam futuræ aduersæ ualitudinis exhibent: curationum quoque principium ab animaduersione eiusdem temporis faciam. Igitur si quid ex his, quæ proposita sunt incidit: omnium optima sunt quies, et abstinentia. Si quid bibendum, aqua: idque interdum uno die fieri satis est. Interdum si terrentia manent, bident, proximique abstinentia sumendus est cibus exiguus: bibenda aqua: postera die, etiam uinum. deinde inuicem alternis diebus, modo aqua, modo uinum, donec omnis causæ metus finiatur. Per hæc. n. sæpe instans grauis morbus discutitur: plurimi que falluntur, dum se primo die protinus sublaturus languorem aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut uomitu, aut sudationibus, aut uino sperant. non quo non

interdum id incidat, aut non decipiat: sed quo sepius fallat, solaq; abstinentia sine ullo periculo medeatur. cū præsertim est pro modo terro-
 ris moderari liceat, & si leuiora inditia fuerint: satis sit à uino
 tantum abstinere: quod subtractū plusquam, si cibo quid dematur: ad-
 iuuat. si paulo grauiora, satis sit non aquam tantū bibere, sed etiā
 cibo carnem subtrahere. interdū panis quoq; minus, quā pro consue-
 tudine assumere: humidoq; cibo esse contentum, et olere potissimum. sa-
 tisq; sit, tum ex toto à cibo, à uino, ab omni motu corporis abstinere: cū
 uehementer notæ terruerunt. Neq; dubium est, quin uix quisquam, qui
 non dissimulauit, sed per hæc mature morbo occurrat: egrotet.

De febrium generibus, Caput. III.

Tq; hæc quidem sanis facienda sunt tantū causam me-
 tuentibus. sequitur uero curatio febriū: quod & in toto
 corpore, et uulgare maxime morbi genus est. Ex his una
 cotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum
 etiam longiore circuitu quædā redeunt. sed id raro euenit. In prio-
 ribus & morbi sunt, & medicinae. At quartanae quidē simplici-
 ores sunt: incipiunt ferè ab horrore, deinde calor erumpit: finitaq; febre
 biduum integrum est. ita quarto die reuertitur. Tertianarū uero duo
 genera sunt: alterū eodem modo, quo quartana & incipiens, & dese-
 nens, illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat in-
 tegrum: tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem
 die reuertitur: ex octo autem, & quadraginta horis ferè, sex, & tri-
 ginta per accessionem occupat: interdum etiā uel minus, uel plus. neq;
 ex toto in remissione desistit: sed tantum lenius est. id genus pleriq; mo-
 dici n̄ moritū ov appellant. cotidianæ uero uariæ sunt, & multiplices.
 Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horro-
 re. Frigus uocō ubi extremæ partes mēbrorū inalgescunt: horrorē ubi
 totū corpus intremit. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur in-
 tegrus. aliæ sic, ut aliquantū quidem minuatur ex febre: nihilomi-
 nus tamen quædā reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat:
 ac sepe aliæ uix quicquā aut nihil remittant: sed ita ut continuent.
 Deinde aliæ feruorē ingentem habent, aliæ tollerabilem: aliæ cotidie
 pares fiunt, aliæ impares. atq; inuicem altero die leniores, altero ue-
 hementiores: aliæ tempore eodem postridie reuertuntur. aliæ uel se-
 rius, uel celerius: aliæ diem, noctemq; accessionem, & deaccessionem
 implent: aliæ minus, aliæ plus: aliæ cum decedunt sudorem mo-
 uent: aliæ non mouent. atque aliās per sudorem ad integritatem

uenitur: aliis corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam modo singula singulis diebus fiunt: modo binæ, plures'ue concurrunt. ex quo sæpe euenit ut cotidie plures accessiones, remissionesq; sint: sic tamen ut una quæq; alicui priori respondeat. Interdum uero accessiones quoq; confunduntur sic, ut neq; notari tempora earum, neq; spacia possint. Neq; uerum est quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex uomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. facilius enim semper curatio foret: si hoc uerum esset. Sed quod euidentes causæ faciunt: facere etiam abditæ possunt. neq; de re, sed de uerbo controuersiam mouent. qui cum aliter, aliterq; in eodem morbo febres accedant: non easdē inordinate redire: sed alias, aliasq; subinde oriri dicunt. quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret: etiā si uere diceretur. Tempora quoq; remissionum modo liberalia, modo uix ulla sunt.

De curationum diuersis generibus, Caput. IIIT.

T febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum uero diuersa genera sunt: prout authores aliqui habent. Aselepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut iocunde curet. id notum est. sed ferè periculosa esse nimium et festinatio, et uoluptas solet. qua uero moderatione utendū sit: ut quantum fieri potest, omnia ista cōtingant: prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandū erit. et ante omnia quæritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur: eo quod cruditas maxime horrebant, deinde eam materiam, quæ lædere uidebatur: ducendo sæpius aluum subtrahabant. Aselepiades medicamentis sustulit: aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. febre uero ipsa præcipue se ad eius remediū uti professus est. Conuellēdas enim uires ægri putauit, luce, uigilia, siti ingenti, sic, ut ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis fallūtur qui per omnia iocundam eius disciplinam esse contendunt: et is enim ulterioribus quædam diebus cubantis etiam luxuria subscripsit: primis uero tortoris uicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones, et aluum duci non nisi raro debere concedo. et id non ideo tamen agendum, ut ægri uires conuellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. minui ergo tantum materiam superantem oportet, quæ naturaliter digeritur: ubi nihil noui accedit. Itaq; abstinendus à cibo primis diebus est: in luce habendus æger, nisi infirmus interdū est. quo-

niam corpus ista quoque digerit: usque cubare quam maximo concludi debet. Quod ad sitim uero somnumque pertinet: moderandum est, ut interdum uigilet: noctu, si potest, conquiescat. ac neque potest: neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi et siatum est, et ipsi fauces tet. quauis id tempus aptum potioni non est. Commodeque Erasistratus dixit sepe inferiore parte humorem non requirente, os, et fauces requirere: neque ad rem male haberi aegrum pertinere. Ac primo quidem sic tenendus est. Optimum uero medicamentum est, opportune cibibus datus: qui quando primum dari debeat: quaeritur. Plerique ex antiquis tarde dabant: sepe quinto die, sepe sexto. et id fortasse uel in Asia, uel in Aegypto caeli ratio patitur. Asclepiades ubi aegrum tri-duo per omnia fatigarat: quarto die cibo destitabat. At Themison uis per non quando coepisset febris: sed quando desisset, aut certe leuata esset, considerabat: et ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris, statim: si accesserat, ubi ea uel desierat: uel si assidue inhaerebat: si certe se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus datus esse: potest secundo: potest tertio: potest non nisi quarto: aut quinto: potest post unam accessionem: potest post duas: potest post plures. Refert enim qualis morbus sit: quale corpus: quale caelum: quae aetas: quod tempus anni. minimeque in rebus nullum inter se differetibus quod intermit-tendum non est. perpetuum esse preceptum temporis potest. In morbo, qui plus uirium aufert: celerius cibus dandus est. itemque eo caelo, quo magis digerit. Ob quam causam in Africa nullo die aeger abstinere recte uidetur. Maturius est puero, quam iuueni: aestate, quam hyeme dari debet. Vnum illud est, quod semper ubique seruandum est: ut aegri uires subinde assidens medicus inspiciat: et quandiu supererunt, abstinentia pugnet: si imbecillitatem uereri coeperit, cibo subue-niat. Id enim eius officium est, ut aegrum neque supernacua materia one-ret: neque imbecillitatem fami prodat. Idque apud Erasistratum quoque inuenio: qui quauis parum docuit quando uenter, quando corpus ip-sum exinaniretur, dicendo tamen haec esse uisenda: et tum cibum dan-dum, cum corpori deberetur: satis ostendit dum uires superessent, dari non oportere: ne deficerent: consulendum esse. Ex his autem intelligi po-dest ab uno medico multos non posse curari: cumque, si artifex est: ido-neum esse, qui non multum ab aegro recedit, sed qui quaestui serui-unt, quoniam is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea pre-cepta: quae sedulitatem non exigunt: ut in hac ipsa re. Facile est enim dies uel accessiones numerare his quoque, qui aegrum raro uident. ille assideat necesse est: qui, quod solum opus est, uisus est: quando nimis

LIBER

imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur: eosque, tanquam tunc de ægris indicaretur, proprios nominaabant. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, quartusdecimus, vigesimus primus: ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni et vigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebant: ut dierum imparium accessiones expectarent. deinde postea cibum quasi lenioribus accessionibus instantibus darent: adeo ut Hippocrates si alio die febris desisset: recidivam timere sit solitus. Id Asclepiades iure ut manu repudiavit: neque in ullo die quæ par, imparue esset: his vel maius, vel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares fiunt: et oportunius post eorum accessiones cibus datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur: fitque grauior, qui remissior esse consueverat. atque ipse quartusdecimus par est: in quo esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum octauum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet: ipsi sibi repugnabant non octauum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendum, quasi potentiorē. Plus enim tribuebant nono, et undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione: ab undecimo non ad tertium decimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem ei, quem septimus dies liberaturus sit: quartum esse grauisimum. Ita illo quoque authore in die pari et grauior febris esse potest: et certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quengue diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit: id est quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimum septimum, in quo et ab impari ad paris rationem transit. Et ne hoc quidem propositum conseruauit, cum à septimo die undecimus non quartus sed quintus sit. adeo apparet quacunque ratione ad numerum respeximus: nihil rationis sub illo quidem authore reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres ad modum pythagorici numeri sefellerunt: cum hic quoque medicus non numerare dies debeat: sed ipsas accessiones intueri: et ex his coniectare quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet scire: num oporteat dari cum iam bene uenæ conquieuerunt: aut etiam num manentibus reliquis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offerebant. Asclepiades inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inherente. in quo unam rationem secutus est: non quo non sit interdum materius cibus dandus, si mature timetur altera accessio: sed quo scilicet quam sanissimo dari debeat. Minus enim corrumpitur quod integro corpori infertur. Neque tamen uanum est

quod Themisoni uidebatur, si duabus horis integer futurus esset aeger: satius esse tunc dare: ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset: id esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non praestet: satius esse principia cibi à decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. ita si longius tempus secundum est, quam integerrimo datus est: si breue, etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco uero integritas est, eodem est remissio: si qua maxime in febre continua potest esse. Atque hic quoque queritur utrum tot horae expectandae sint, quot febrem habuerunt: an satis sit primam partem earum praeteriri, ut aegris iocundius insidat, quibus interdum non ualet. Tutissimum est autem ante totius accessionis tempus praeterire. quamuis ubi longa febris fuit: potest indulgeri aegro maturius: dum tamen ante minime pars dimidia praetereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est: sed in omnibus ita seruandum est.

De febrium speciebus, et singularum curationibus, et primo quando cibis febricitantibus dandus sit. Caput. V.

h Aec magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desinit: eaque uel ex inguine, uel ex lassitudine, uel ex aestu, aliaue simili re fuit sic, ut interior nulla causa metum fecerit: postero die cum tempus accessionis ita transijt, ut nihil mouerit: cibis dari potest. At si ex alto calor uenit: et grauitas uel capitis, uel praecordiorum secuta est: neque apparet quid corpus confuderit, quamuis unam accessionem secuta integritas est: tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: et ubi accessionis tempus praeterijt, cibis dandus est, sed exiguis, quia quartana quoque timeri potest. Et die quarto demum: si corpus integrum est: eo cum fiducia utendum. Si uero postero, tertio uel, aut quarto die secuta febris est: scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum et certus circuitus est: et finis integer: et quia liberaliter quiescentia tempora sunt: expeditior ratio est. De quibus suo loco dicam. Nunc uero eas explicabo, quae cotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibis aegro commodissime datur: ut alter febrem minuat: alter uiribus subueniat. Sed his dari debet si quotidiana febris est, quae ex toto desinat: simul atque corpus integrum factum est: si, quamuis non accessiones, febres tamen iunguntur: et cotidie quidem incrementum: sed sine integritate tamen remittunt: cum corpus ita se habet, ut maior

LIBER

remissio non expectetur. Si altero die grauior: altero leuior accessio est post grauiorem. ferè uero grauiorem accessionem leuior nox sequitur. quo fit ut grauiorem accessionem nox quoq; tristior antecedit. At si continuatur febris: neq; leuior unquam fit: Et dari cibum necesse est: quando dari debeat, magna quidem dissensio est. Quidam, quia ferè remissius matutinum tempus agris est: tunc putant dandū. quod si respondet, non quia mane est: sed quia remissior est aeger: dari dabet. Si uero ne tunc quidem ulla requies agris est: hoc ipso peius id tempus est: quod cum sua natura melius esse debeat: morbi initio non est. simulq; insequitur tempus meridianū: à quo cum omnis aeger ferè peior fiat: timeri potest ne ille magis etiam quàm ex consuetudine urgeatur. Igitur alij uespere tali agro cibum dant. sed cum eo tempore ferè pessimi sint, qui agrotant: uerendum est, ne si quid tunc mouerimus: fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem decurro: idest finito iam grauissimo tempore, eodemq; longissime distante: secuturis uero ante lucanis horis, quibus omnes ferè maxime dormiunt: deinde matutino tempore, quod natura sua leuissimum est. Si uero febres uagæ sunt: quia uerendum est: ne cibum statim subsequantur: quandoq; quis ex accessione leuatus est: hunc debet assidere. At si plures accessiones eodem die ueniunt: considerare oportet, pares ne per omnia sint: quod uix fieri potest: an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem cibus dari debet: quæ non inter meridiem, et uesperum desinit. Si impares sunt: considerandum est quo distent. Nam si altera grauior, altera leuior est: post grauiorem dari debet. si altera longior, altera breuior: post longiorem. si altera grauior, altera longior est: considerandum est utra magis affligat: illa uero, an hæc tempore: et post eam dandus est. Sed planè plurimum interest: quantæ: qualesq; inter eas remissiones sint. Nā si post alteram febrem motio manet: post alteram integrum corpus est: integro corpore cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet: sed alterum tamen longius tempus remissionis est: id potius eligendum est: adeo ut ubi accessiones continuantur, protinus inclinata priore dādus cibus sit. Et enim perpetuū est, ad quod omne cōsiliū dirigi potest: cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere: et hoc saluo dare quàm integerrimo corpori: quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed cū sit aptissimū tertio quoq; die cibum dare: tamē si corpus infirmum est, cotidie dandus est: multoq; magis si continentes febres sine remissione sunt: quanto magis corpus affligunt: aut si duæ, plures uel accessiones eodē die ueniunt. Quæ res efficit, ut et à primo die protinus

die protinus cibus dari cotidie debeat. Si protinus uenæ conderunt: & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde uis corpori deest. Illud tamen in his seruandū est: ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum uero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur: scire licet optimum cibo tempus esse febre finita. deinde cum decessio eius consistit. tertium si necesse est, quandoque decedit, cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistere iam incremento febris aliquid offerre: quàm incrementum. Satius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque hercule satis est ipsas tantum febres medicum intueri: sed etiam totius corporis habitum: & ad eum dirigere curationem, seu super sunt uires, seu desunt: seu quidā mali affectus interueniunt. Cum uero semper ægros securos agere conueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcipue ubi cibum sumpserunt. Itaque si qua sunt quæ exasperatura eorum animos sunt: optimum est eadem ægrotantium noticiæ subtrahere. si id fieri non potest: sustinere tamen post cibum usque somni tempus, & cum experrecti sunt, tunc exponere.

Quando potiones febricitantibus dari expediat. Caput. VI.

Ed de cibo facilior quidem cum ægris ratio est: quorum
 Sæpe stomachus hunc respuit: et si mens concupiscit. De
 potione uero ingens pugna est: eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit: & tum maxime aqua
 exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est ubi febris con-
 quiuerit, protinus sitim quoque quieturam: longiorcmque accessione
 fore, si quod ei datum fuerit alimentum. ita celerius eum desinere
 sitire qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani simē,
 quàm sitim sustinent: tanto magis ægris in potione, quàm in cibo in-
 dulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito
 sic uenæ conderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo uero, cæte-
 risque etiam quibus cibus non dabitur: tamen si magna sitis urgebit,
 potio dari potest. Ac ne illud quidē ab Heraclide Tarentino dictum
 ratione caret: ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet: expedire
 quoque per modicas potiones misceri nouam materiam corruptæ. illud
 uidendum est, ut qualia tempora cibo leguntur: talia potioni quoque, ubi
 sine illo datur, delignantur: aut cum ægrum dormire cupimus. quod
 ferè sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus

Aurelij Cor.

e

LIBER

nimius humor alienus sit: tum præcipue esse foemina, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cū tempora cibo, potioniq; febris et remissio- nis ratio det: non est expeditissimū scire, quādo æger febricitet: quan- do melior sit: quando deficiat: sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei: quia sæpe istæ lenio- res, celeriores uel sunt et ætate, et sexu, et corporū natura. Et ple- runq; satis sano corpore si stomachus infirmus est: nonnunquam et incipiente febre subeunt, et quiescunt: ut imbecillus is uideri possit, cui facile laturo grauis instat accessio. Contra sæpe eas concitat, et re- soluit sol, balneum, et exercitatio, et metus, et ira, et quilibet alius animi affectus: adeo ut cum primum medicus uenit, sollicitudo ægri dubitantis quomodo ille se habere uideatur: eas moueat. ob quam cau- sam periti medica est, non protinus ut uenit apprehendere manu bra- chium. sed primum residere hilari uultu: percontariq; quemadmo- dum se habeat: et si quis eius metus est, eum probabili sermone leui- re. tum deinde eius corpori manum admouere. quas uenas autem cōspectus medici mouet: quā facile mille res turbant. Altera res est, cui credimus: calor æque fallax. nā hic quoq; excitatur aestu, labore, somno, metu, sollicitudine. igitur intueri quidē omnia etiam ista oportet. sed his non omnia credere: ac protinus quidem scire non febrici- tare eum, cuius uenæ naturaliter ordinatæ sunt: teporq; talis est, qua- lis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore, motuq; febrem se se concipere: sed ita si summa quoq; arida inæqualiter cutis est: si calor et in fronte est: et ex imis præcordijs oritur. si spiritus ex naribus cum feruore prorumpit: si color aut rubore, aut pallore nouo muta- tus est: si oculi graues, et aut persici, aut subhumidi sunt: si sudor cū fit, inæqualis est: si uenæ non æquis internallis mouentur. Ob quam causam, medicus neq; in tenebris, neq; à capite ægri debet residere: sed illustri loco aduersus eum, ut omneis notus ex uultu quoq; cubantis perspiciat. Vbi uero febris fuit, atq; decreuit: expectari oportet num tempora, partes uel corporis aliæ paulum madescant: quæ sudorē uen- turum esse testentur. ac si qua nota est, tunc demum dare potui cali- dam aquam: cuius salubris effectus est, si sudorē per omnia membra diffundit. Huius autem rei causa continere æger sub ueste satis multa manus debet: eademq; crura, pedesq; contegere: qua male pleriq; ægros in ipso impetu febris, pessimeq; ubi ardens ea est, male habent. si sudare corpus coepit, linteam tepescere oportet: paulatimq; singu- la membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est: aut si is non ue- nit: ubi quāmaxime potuit: idoneus esse cibo æger uidetur: sub ueste leniter ungendus est: tum detergendus: deinde ei cibus dandus. Cibus

autem febricitantius humidus est aptissimus, aut humori certe q̄ proximus: utiq; ex materia quā leuissima, maximēq; sorbitio. eaq; si magnæ febres fuerunt, quā tenuissima esse debet. Mel quoq; despinatum huic recte adiçatur: quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, supernacū est: sicut ipsa quoq; sorbitio. Dari uero in uicem eius potest, uel intrita ex aqua calida, uel alia elota. Si firmus est stomachus, & compressa aluus: ex aqua mulsā si uel ille languet, uel hæc profluit, ex poscat. Et primo quidē cibo id satis est. secūdo uero aliquid adiçci potest: ex eodem tamen genere materie, uel olus, uel conchilium, uel pomum. Et dum febres quidē increscunt, hic solus idoneus cibus est. Vbi uero aut desinunt, aut leuantur: semper quidē incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adiçciendū uero aliquid ex media, ratione habita subinde & uirium hominis, & morbi. Ponendi uero agro uarij cibi sicut Asclepiades præcepit: tum demum sunt, ubi fistidionurgetur: neq; satis uires sufficiunt, ut paulum ex singulis degustando famē uitet. At si neq; uis, neq; cupiditas deest, nulla uarietate sollicitandus æger est: ne plus assumat, quā concoquat. Neq; uerum est, quod ab eo dicitur: facilius concoqui cibos uarios. eduntur enim facilius: ad concoctionem aut materie genus, & modus pertinent. Neq; inter magnos dolores, ut neq; increscente morbo tutū est, ægrū cibo impleri: sed ubi inclinata iam in melius ualetudo est. sunt aliæ quoq; obseruationes in febris necessariæ. atq; id quoq; uidendū est, quod quidam solum præcipiunt: an astrictum corpus sit: an profluet. quorum alterum strangulat quod continet: alterum digerit. nam si astrictum est, ducenda aluus est: mouenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse uehementibus gestationibus, corpus in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, uigiliam prodest. Vtile est etiam ducere in balneum: prius demittere in solium: tum ungere: iterum ad solium redire: multa q; aqua fouere inguina: interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere: uti cibo rarius, & serius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximēq; oleribus, qualia sunt, lapatium, urtica, malua, uel iure etiam concharum, musculorum uel, aut locustarum: neq; danda caro nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis & ante cibum, & post hunc: & cum hoc ultra quā sitis cogit. Poterit q; à balneo & pinguius, aut dulcius dari uinum. poterit semel, aut bis interponi græcum salsum. Contra uero si corpus profluet, sudor coerendus: quies adhibenda erit tenebris: somno q; quandoq; uolet, utendum. non nisi leui gestatione corpus agitandum: & pro genere mali subueniendum. Nam si uenter fluit: aut si stomachus non continet, ubi febris

LIBER

decreuit, liberaliter oportet aquam tepidā potui dare, & uomere co-
gere: nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet: aut uetus morbus
est. Si uero sudor exercet, duranda cutis est uel nitro, uel sale: quæ cū
oleo miscentur. At si leuius id uitium est, oleo corpus unguendum est. si
uehementius, rosa, uel melino, uel myrteo: cui uinum austerum sit adie-
ctum. Quisquis autem fluore æger est: cum uenit in balneum, prius
ungendus: deinde in solium demittendus est. si in cute uitium est: fri-
gida quoq; quā calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum uentum
est: dari debet is ualens, frigidus, siccus simplex, qui quam minime
corrumpi possit: panis tostus, caro assa, uinum asperum, uel certe subau-
sterum: si uenter profluit, calidum: si sudores nocent, uomitusq; sunt,
frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant. Caput. VII.

Considerat etiam propriam animaduersionem in febribus
d pestilentia casus. In hac minime utile est, aut fame, aut me-
dicamentis uti: aut ducere aluum. Si uires sinunt, sangui-
nem mittere optimum est: præcipueq; si cum dolore fe-
bris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut lenata
est: uomitu pectus purgare. sed in hoc maturius, quā in alijs mor-
bis ducere in balneum opus est: uinum calidum, & meracius dare,
& omnia glutinosa inter quæ quoq; carnem generis eiusdem. Nam
quo celerius eiusmodi tempestates corripunt: eo maturius auxilia, etiā
cum quadam temeritate rapienda sunt. Quod si puer est, qui labo-
rat: neq; tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit: siti ei utendum
est: ducenda aluus, uel aqua, uel ptisanæ cremore: tum demum is leui-
bus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri ut uiri curari debent.
Ergo, ut in alio quoq; genere morborum parcius in his agendum est.
Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare
uigilia, fame uel, aut nimia siti, conuenit. Vomitus post febrem elicien-
dus est: deinde dandus cibus ex lenissimis: tum is dormiat: postero
quoq; die si febris manet, abstineatur. Tertio ad similem cibum re-
deat. Dandaq; opera est quantum fieri potest, ut inter oportunam ab-
stinentiam cibosq; oportunos, omisiss cæteris, nutriatur. Si uero ardens
febris extorret: nulla medicamenti danda potio est: sed in ipsis acce-
sionibus oleo, & aqua refrigerandus est: quæ miscenda manu sunt, do-
nec albescant: & conclauī tenendus, quo multum, & purum aërem
trahere possit: neq; multis uestimentis strangulandus, sed admodum le-
uibus tantum uelandus est. Possunt etiam super stomachum imponi
folia uitis

folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. alendus maturius est: id est à die tertio, & ante cibū. isdē perungendus. Si pituita in stomacho coit: inclinata iam accessione uomere cogendus est: & tunc dandum frigidum olus: aut pomum ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus, protinus uel prisa-næ, uel alicæ, uel orizæ cremor dandus est: cū quo recens adeps cocta sit. Cum uero in summo incremento morbus est: utiq; non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat et ultra satietatem: & cū iam uenter, & præcordia ultra modū repleta, satisq; refrigerata sunt: uomere debet. Quidā ne uomitū quidem exigunt: sed ipsa aqua frigida, tantū ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Vbi utrumlibet factum est: multa ueste operiendus est: & collocandus ut dormiat. Ferēq; post longam sitim, & uigiliā, post multam satietatem, post infractum calorē, plenus somnus uenit, per quem ingens sudor effunditur: idq; præsentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus præter ardorem nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibēs uel in thorace, uel in pulmone, uel in faucibus, non ulcus, non deiectio, non profluvium alui fuit. Si quis autem in eiusmodi febre leuiter tussit, is neq; uehementi siti constictatur: neq; bibere aquam frigidam debet: sed eo modo curandus est quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semitertianæ febris quæ hemitritæos dicitur. Caput. VIII.

T ubi id genus tertianæ est, quod ἡμιτρίτων media appellant: magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunq; frequentiores accessiones, decessionesq; ut aliud morbi genus uideri possit: porrigitq; febris inter horas uiginti quatuor et triginta sex, ut quod idem est: non idem esse uideatur. Et magnopere necessarium est, neq; dari cibum, nisi in ea remissione, quæ uera est: & ubi ea uenit, protinus dari: plurimiq; sub alterius erroris curantis errore subito moriuntur. ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet: tum dari cibum, qui neq; incitet febrem: & tamen longum eius spatium sustineat.

Curatio lentarum febrium. Caput. IX.

Nonnunquam etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent: ac neq; cibo, neq; ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbū mutet. Fortasse enim curationi

Aurelij Cor.

c iij

oportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius per tractandum est. quoniam interdum sic euenit, ut horror oriatur: et fiat initium quoddam noui motus: ex quo cum magis corpus incaluit: sequatur et remissio. In his frictio quoque ex oleo, et sale salubris uidetur. at si diu frigus est et torpor, et iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres, aut quatuor cyathos: uel cum cibo uinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris, et maior ortus calor, simul et priora mala tollit: et spem remissionis in ea curatione ostendit. Neque hercule ista curatio noua est: qua nunc quidam traditos sibi ægros, qui sub cautiore medicis trahebantur: interdum contrarijs remedijs sanant. si quidem apud antiquos quoque ante Erophilum, et Erasistratum, maximeque post Hippocratem fuit Petro quidam qui febricitantem hominem uti acciperat, multis uestimentis operiebat: ut simul calorem ingentem, sitimque excitaret. Deinde ubi paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se ægrum iudicabat. si non mouerat, plus etiam aquæ frigidae ingererebat: et tum nomere coquebat. Si alterutro modo febre liberauerat: protinus suillam assam, et uinum homini dabat. Si non liberauerat: decoquebat aquam sale adiecto, eamque bibere coquebat, ut mouendo uentrem purgaret: et intra hæc omnis eius medicina erat. eaque non minus grata fuit his: quos Hippocratis successores non refecerant: quam nunc est his, quos Erophi, uel Erasistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina: quia plures, si protinus a principijs excepit: interemit. Sed cum eadem omnibus conuenire non possint: ferè quos ratio non restituit: temeritas adiunat. Ideoque eiusmodi medicina melius alienos ægros, quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoque hominis et nouare interdum: et augere morbum: et febres accendere: quæ curatione, ubi id quod est, non recipit: potest recipere id, quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, et præcordiorum inflammationem, et ariditatem, et scabritiem lingue. Caput. X.

Considerandum etiam est. febres ne solæ sint: an alia his quoque mala accedant. id est num caput doleat: num lingua aspera: num præcordia intumescant. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, et in id ingerere: deinde habere duo pittacia, quæ latitudinem frontis, longitudinemque æquet. Ex his inuicem alterum in aceto et rosa habere, alterum in fronte: aut intinctam hisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit, pura

rosa utendum est. Si rosa ipsa laedit, oleo acerbo, si ista parum inuuant: teri potest uel iris arida, uel nuxes amarae, uel qualibet herba ex refrigerantibus. Quorum quidlibet ex aceto impositum dolore minuit: sed magis aliud in alio. Iunat et panis cum papauere iniectus, uel cum rosa, cerussa, spuma uel argenti. Olfacere quoque uel serpillum, uel anethum non alienum est. At si in praecordis inflammatio, et dolor est: primo super imponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint: plus eorum materiae concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit: tunc demum ad calida, et humida ueniendum est: ut ea quae remanserint, discutiant. Notae uero inflammationis sunt quatuor: rubor, et tumor cum calore, et dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febre nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est: nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantum praecordiorum dolor est: protinus calidis, et sicis fomentis uti licet. Si uero lingua siccata est, et scabra: detergenda primum penicillo est ex aqua calida. deinde ungenda mixtis inter se rosa, et melle. Mel purgat: rosa reprimat: simulque siccare non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo detergata est: ungi rosa debet: cui cera sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem praecedit. Caput. XI.

Olet et ante febres esse frigus, idque uel molestissimum morbi genus est. Vbi id expectatur, omni potione prohibendus aeger est. haec enim paulo ante data multum mali adiungit. Item maturius ueste multa tegendus est. admonenda partibus his, pro quibus metumimus, siccata et calida fomenta, sic, ne statim uehementissimi calores incipiant: sed paulatim accrescant. Perfricanda quoque eae partes manibus unctis ex uetere oleo sunt: eique adiungendum aliquid ex calefacientibus. Contentique medici quidam una frictione et ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissionibus nonnulli tres, aut quatuor sorbitionis cyathos etiam nam ultra manente febre dant. deinde ea bene finita reficiunt stomachum cibo frigido, et leni. Ego tum hoc puto tentandum, cum paruum cibum semel et post febrem datus prodest. sed curiose perspicendum est, ne tempus remissionis decipiat. Saepenum in hoc quoque genere ualetudinis iam minui febris uidetur: et rursus intenditur. itaque ei remissioni credendum est: quae etiam immoratur: et iactationem, faectoremque quendam oris, quem oes graeci uocant, minuit. Illud satis conuenit, si cotidie pares accessiones sunt: cotidie paruum cibum dandum. si impares, post grauiorem cibum: post leniorem, aquam mulsam.

ORROR autem eas ferè febres antecedit: quæ certū habent
 h circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoq; tutissima sunt,
 maximeq; curationes admittunt. Nam ubi incerta tem-
 pora sunt: neq; alui ductio, neq; balneum, neq; uinum, neq;
 medicamentum aliud recte datur. incertū est enim quando febris uen-
 tura sit: ita fieri potest, ut si subito uenerit, summa in eo perniciēs
 sit: quod auxiliū causa sit inuentū. Nihilq; aliud fieri pōt, quā ut pri-
 mis diebus bene abstineatur æger. deinde sub decessu febris eius, quæ
 grauissima est: cibūumat. at ubi certus circuitus est: facilius oīa illa
 sentantur: quia facilius proponere nobis et accessiōnū, & decessiōnū ui-
 ces possumus. In his autem cum ueterauerunt: utilis famis non est. Pri-
 mus tantummodo diebus ea pugnandum est: deinde diuidenda cura-
 tio est: & ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum
 aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit: dare ei oportet potui tepi-
 dam aquam subsalsam, & uomere eum cogere. nam ferè talis horror
 ab his oritur, quæ biliōsa in stomacho resederunt: idem faciendū est,
 si proximo quoq; circuitu æque cessit: sæpe enim sic discutitur. iamq;
 quod genus febris sit, scire licet. itaq; sub expectatione proxime ac-
 cessiōis, quæ instare tertia potest: deducendus in balneum est: dādāq;
 opera est, ut per tempus horrois in solio sit. si ibi quoq; senserit: ni-
 hilominus idem sub expectatione accessiōis quartæ faciat. si quidem
 eo quoq; modo sæpe id discutitur. si nec balneū quidem profuit: ante
 accessiōem allium edat: aut bibat calidā aquam cum pipere: si qui-
 dem ea quoq; assumpta calorem mouent, qui horrorem nō admittit.
 Deinde eo modo quo in frigore præceptū est: anteq̃ inhorrescere pos-
 sit, opiatur. Fomentisq; protinus ualidioribus totum corpus circunda-
 re conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis, & titionibus. Si nihilo-
 minus horror pertruxerit, multo oleo calefacto inter ipsa uestimenta
 perfundatur: cui æque ex calefacientibus aliquid sit adiectum. adhi-
 beaturq; frictio quantum is sustinere poterit, maximeq; in manibus,
 & pedibus: & spiritum ipse contineat. neq; desistendum est etiam si
 horror est. Sæpe enim pertinacia iuuantis malum corporis uincit. Si
 quid euomuit, danda aqua tepida: iterumq; uomere cogendus est: uten-
 dumq; eisdē est, donec horror finiatur. Sed præter hæc, ducenda aliū
 est, si tardius horror quiescit: si quidem id quoq; exonerato corpori
 prodest. Vltima quoq; post hæc auxilia sunt gestatio, & frictio. Cibus
 autem in eiusmodi morbis maxime dandus est: qui mollem aluiū præ-
 stet. Caro glutinosa, uinum cum dabitur, austerum.

Curatio

Curatio cotidiane febris. Caput. XIII.

Hæc ad omnes circuitus februm pertinent. discernendæ tñ singulæ sunt: sicut ratione habent dissimilem. si cotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet: tum cibis altero quoque die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum, et uinum, magisque si horrore sublato hæc superest.

Curatio tertianæ febris. Caput. XIII.

I tertiana uero, quæ ex toto intermittit, aut quartana est: medijs diebus et ambulationibus uti oportet, alijsque exercitationibus, et unctionibus. quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus in hoc genere morborum multo ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat: deinde uinum dabat. quod quauis pleraque eius uiri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præerijt. Est enim anceps ipse, si tertiana febris est: tertio die post accessionem dicit aluum duci oportere. quinto post horrorem uomitum elicere. deinde post febrem, sicuti illi mos erat, adhuc calidis dare cibum, et uinum. sexto die in lectulo detineri. sic enim fore ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse uerisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur tria remedia, uomitus, alui ductionis, uini potus per triduum: id est die tertio, et quinto, et septimo tentare. nec uinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus non est: inciditque in uetustatem, quo die febris expectabitur: in lectulo se contineat: post febrem perfricetur: tum cibo assumpto bibat aquam. postero die, quo cibo nactus, et ab exercitatione, unctioneque aqua tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si uero imbecillitas urgebit: et post febrem uinum, et medio die paulum cibi debebit assumere.

Curatio quartanæ febris. Caput. XV.

Adem in quartana facienda sunt. sed cum hæc tarde ad modum finiatur, nisi primis diebus discussa est: diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaque desijt: eodem die, et postero, tertioque continere se debet: et aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere: biduo proximo quantum fieri potest hanc quidem. si quarto die cum horrore febris reuertitur, uomere

LIBER

sicut ante præceptum est: deinde post febrem modicum cibum sumere, vini quadrantem. Postero, tertioq; die abstinere: aqua tantummodo calida, si sitiet, assumpta: septimo die balneo frigus præuenire: abstinere, continere se debet: & aqua tantummodo calida si sitiet: ac tum ita nono die balneo frigus præuenire: si febris redierit, ducere aluum: ubi ex eo corpus conquieuerit, in unctione uehementer perfricari: eodem modo sumere cibum & uinum: biduo proximo se abstinere frictione seruata. decimo die rursus balneum experiri: & si postea febris accessit, æque perfricari. uinum copiosius bibere. ac si proximum est, quies tot dierum, ut abstinentia cum cæteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si uero nihilominus remanet: aliud ex toto sequendum est curationis genus: idq; agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet: qui primis diebus ducenda aluum: deinde abstinendum usq; in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit: tamen etiam febre liberatus, uix refectio ualebit. adeo si febris sæpius accesserit: concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit: balneum neq; ante febrem, neq; post eam tentandum erit: nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per eadem quæ supra præscripta sunt expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi: & uehementer perfricari: cibum & ualidum, & fortiter assumere. uino uti quantum libebit. postero die cum satis quieuerit, ambulare, exerceri, ungi, perfricari fortiter: cibum accipere sine uino: tertio die abstinere. quo die uero febrem expectabit: ante surgere, & exerceri, dareq; operam non oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. sic. n. sepe illa discutitur. At si in opere occupauit: tum demum se recipere. In eiusmodi ualitudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, uinum. Si uenter astrictus est, soluendus est. sed hæc facile ualidiores faciunt. si imbecillitas occupauit: pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet: adhibenda tamen frictio est. si hæc quoq; uehemens onerat: inter quietem, & unctionem, & cibum sistendum est: dandaq; opera est, ne qua cruditas in cotidianam id malum uertat. Nam quartana ne minem ingulat. sed si ex ea facta cotidiana est: in malis aeger est. Quod tamen nisi culpa uel ægri, uel curantis nunquam fit.

Curatio duarum quartanarum. Caput. XVI.

¶ Si due quartanæ sunt: neq; hæ, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est: aut si id difficile est, leniter ambulare: considerare diligenter inno-

litis pedibus, & capite. Quoties febris accessit, & desit, cibum modicum sumere, & in reliquo tempore nisi imbecillitas urget: abstinere. Aut si duæ febres penè iunguntur, post utrâq; cibum sumere. deinde uacuo tempore & moveri aliquid, & post unctionem cibo uti. Cum uero uetus quartana raro, nisi uere soluat: utiq; eo tempore attendendum est ne quid fiat, quod ualitudinem impediât. Prodestq; in uetere quartana mutare subinde uictus genus: à uino ad aquam: ab aqua ad uinum: à lenibus cibis ad acres: ab acris ad lenes transire: esse radicem: deinde uomere: iure uel pulli gallinaei uentrem resoluerè: oleum ad frictione: adijcere: calefacientia ante accessionem sorbere, uel aceti cyathos duos, uel unum sinapis cum tribus græci uini salis, uel mixta paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, laser, myrram. per hæc enim similiaq; corpus agendum est, ut moueatur ex eo statu quo detinetur. si febris quiescit, diu meminisse eius dici cõuenit: eoq; uitare frigus, calorem, cruditatē, lassitudinē. Facile enim reuertitur: nisi à sano quoq; aliquandiu timeatur.

Curatio cotidiane febris, quæ ex quartana facta sit. Caput. XVII.

T si ex quartana cotidiana facta est: cum id uicio inciderit, per biduum abstinere oportet. frictione uti: aquam tantummodo uesperis potui dare. tertio die sæpe fit ne febris accedat. sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus. at si manet: per biduum abstinentia, quanta maxime imperari corpori potest: frictione cotidie utendum est.

De tribus insanie generibus: & primo de eius curatione, quæ à græcis phrenitis dicitur. Caput. XVIII.

T februm quidem ratio exposita est. supersunt uero alij corporis affectus: qui huic superueniunt. ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt: protinus iungam. Incipiam ab insania: primamq; huius ipsius partē agrediar: quæ et acuta, et in febre est: græci *opewitw* appellant. illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione ægros desipere: et loqui aliena. Quod nõ quidē leue est: neq; incidere potest, nisi in febre uehementi: non tamen æque pestiferum est. Nam plerunq; breue esse consuevit: leuatoq; accessionis impetu protinus mens redit. Neq; id generis morbi remedium aliud desiderat: quàm quod in curanda febre præceptum est. Phrenitis uero tum demum est: cum continua demētia esse incipit: aut cum æger quauis adhuc sapiat: tamen quasdā na-

LIBER

nas imagines accipit. perfecta est ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt: si quidem ex phreniticis alij hilares, alij tristes sunt: alij facilius continentur, et intra uerba desipiunt. alij consurgunt, & uiolenter quædam manu faciunt. atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu peccant: alij etiam artes adhibent: summamq; spem sanitatis in captandis maiorum operum occasionibus præbent: sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos qui intra uerba desipiunt, aut leuiter etiam manu peccant: onerare asperioribus coercionibus supernacuum est. Eos uero qui uiolentius se gerunt, uincire: o uenit: ne uel alteri, uel sibi noceant. Neq; credendum est si uinctus aliquis dum leuari uinculis cupit: sanum iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur: quoniam is dolus insaniens est. Ferè uero antiqui tales ægros in tenebris habebant: eo quod eis contrarium esse exterreri: & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades tanquam tenebris ipsis terrentibus in lumine habendos esse dixit: neutrum tamen perpetuum est: alium enim lux, alium tenebræ magis turbant. reperiunturq; in quibus nullum discrimen deprehendi uel hoc, uel illo modo possit. Optimum itaq; est utrunq; experiri: & habere eum, qui tenebras horret, in lucem: eum q; lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, æger si uires habet, loco lucido: si non habet, obscuro continendus est. Remedia uero adhibere ubi maxime furor urget, supernacuum est. simul enim febris quoq; increscit. itaq; tunc nihil nisi continendus æger est. Vbi uero res patitur, festinanter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit his sanguinem mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quod neq; insania esset, nisi febre intentâ: neq; sanguis nisi in remissione eius recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quasiuit, cum & intentio febris somnum impediat: & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaq; hoc quoq; auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo recte fiunt aliâs omittenda. & continuata quoq; febris habet tempora: quibus & si non remittit, non tamen crescit. Estq; hoc ut non optimum, sic tamen secundum remedium tempus. Quod si uires ægri patiuntur, sanguis quoq; mitti debet. Nec minus deliberari potest an alius ducenda sit. tum interposito die conuenit caput ad cutem tondere: deinde aqua fouere. in aqua uerbena aliquæ decoctæ sint, uel ex reprimuntibus: aut prius fouere: deinde tondere: & iterum fouere: ac nouissime rosa caput, naresq; implere: offerre etiam naribus rutam ex aceto contritam: mouere sternutamenta medicamentis in id efficiatibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus uires non desunt. Si uero imbecillitas est,

rosa tantum caput adiecto serpillo, similiq; aliquo madefaciendū est. Vtiles etiam in quibuscunq; viribus herbae duae sunt, solanum, & muralis: simul ex utraq; succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit, frictione utendum est. partius tamen in his qui nimis hilares, quam in his qui nimis tristes sunt. Aduersus omnium aut sic insaniendum animos, gerere se pro cuiusq; natura necessarium est. Quorundam enim uani metus leuandi sunt: sicut in homine praediuite fame timente incidit: cui subinde falsae hereditates nunciabatur. Quorundam aut dacia coercenda est: sicut in his fit, in quibus continēdis plagae quoq; adhibentur. Quorundam etiā intempestuus risus & obiurgatione, & minis prohibendus est. Quorundam discutiendae tristes cogitationes: ad quod symphoniae, & cymbala, strepitusq; proficiunt. saepius tamen assentiendum, quam repugnandū est. paulatimq; & non euidenter ab his, quae stulte dicuntur, ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiā elicienda ipsius intentio, ut fit in hominibus studiosis literarum quibus liber legitur: aut recte si delectantur: aut perperam, si id ipsum eos offendit. emendando enim conuertere animum incipiunt. Quin etiam recitare si qua meminerunt cogendi sunt. Ad cibum quoq; quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt. Omnibus uero sic affectis somnus & difficilis, & praecipue necessarius est. sub hoc enim pleriq; sanescunt. Prodest ad id, atq; etiam ad mentem ipsam componendam crocinum uinguentum cum irino in caput datum. si nihilominus uigilant hi, quidam somnum moluntur potui dando aquam, in qua papauer, aut uoscuquos decocta sit: alij mandragorae mala puluino subijciunt: alij uel amomum, uel sicamini lachrymam fronti inducunt. hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum graeci morū σινάμυον appellant: mori nulla lacrima est. sic uero significatur lachryma arboris in Aegypto nascētis: quā ibi μωπόσυον appellāt. plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Asclepiades ea supernacua esse dixit, quoniā in Lethargum saepe cōpellerent. Praecipit aut ut primo die a cibo, potione, somno abstinere: uespere ei daretur potui aqua: tunc frictio admoneretur lenis, ita ut ne manum quidem qui fricaret, uehementer imprimeret. postero deinde die hisde omnibus factis, uespere ei daretur sorbitio, et aqua: rursusq; frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut illo confitente nimis frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem modo ratione, quae hic quoq; necessaria est: ne quem obdormire uolumus:

LIBER

excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnum sila-
nus iuxta cadens: uel gestatio post cibum & noctu, maximeq; suspen-
si lecti motus. Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est:
neque mens constat: neque somnus accedit: occipitio inciso cucurbitu-
lam admo-
uere. quæ quia leuat morbum, potest etiam somnum fa-
cere. Moderatio autem in cibo quoq; adhibenda est. Nam neq; imple-
nus aeger est, ne insaniat. neq; ieiunio utiq; uexandus est, ne imbecilli-
tate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeq;
sorbitione, potione aquæ mulsæ: cuius ternos cyathos bis hyeme: quater
æstate dedisse satis est. Alterum genus insanie est: quod spatium lon-
gus recipit: quia ferè sine febre incipit: leues deinde febriculas exci-
tat: & consistit in tristitia, quam uidetur bilis atra contrahere. in hac
utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est absti-
nentia: secunda per album ueratrum, uomitumq; purgatio. post utrū-
libet adhibenda bis die frictio est. si magis ualet, frequens etiā exer-
citatio. In ieiunio uomitus: cibus sine uino dandus ex media materia
est. Quam quotiens posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari
posse: dum ne ea sola quis utatur: ualentissima tantummodo esse remo-
uenda. præter hæc seruanda aliud est quàm tenerrima. remouendi
terrores, & potius bona spes afferenda. quærenda delectatio ex fabu-
lis, ludisq; quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua
sunt ipsius opera: & ante oculos eius ponenda. Leuiter obiurganda
uana tristitia. subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ solici-
tant: cur non potius letitia, q̃ solitudinis causa sit. si febris quoq; accessit,
sicut aliæ febres curanda est. Tertium insanie genus est ex his lon-
gissimum, adeo ut uitam ipsam non impediat: quod robusti corporis
esse consuevit. huius autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam ima-
ginibus, non mente falluntur: qualem insanientem Aiacem, uel Ore-
stem poetarum fabulæ ferunt. quidam animo desipiunt. si imagines
fallunt: ante omnia uidendum est, tristes, an hilares sint. In tristitia ni-
grum ueratrum deiectionis causa: in hilaritate album ad uomitum
excitandum dari debet. idq; si in potione non accipit: pani adijci-
endum est, quo facilius fallat. nam si bene se purgauerit: ex magna par-
te morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum ueratrum parum pro-
fecerit: interposito tempore iterum dari debet. Neq; ignorare oportet, le-
uiorem esse morbum cum risu, quàm serio insanientium. Illud quoq;
perpetuum est in omnibus morbis: ubi ab inferiore parte purgandus
aliquis est, uentrem eius ante soluendum esse: ubi à superiore, compri-
mendum. Si uero consilium insanientem fallit: tormentis quibusdam
optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, uin-
cu-

lis, plagis coercendus est. Cogendus est et attendere, et ediscere aliquid, et meminisse. sic enim fiet ut paulatim metu cogatur considerare quid faciat. Subito etiam terreri, et expauescere in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animum uehementè perturbat. Potest enim quedam fieri mutatio: cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Interest etiam si ipse sine causa subinde rideat: an tristis, demissusq; sit. nam demens hilaritas terroribus his, de quibus supra dixi: melius curatur. si nimia tristitia est: prodest lenis, sed multa bis die frictio. Itè per caput aqua frigida infusa: demissumq; corpus in aqua, et oleum. Illa communia sunt, insanientes uehementè exerceri debere: multa frictione uti: neq; pinguem carnè, neq; uinum assumere: abis uti post purgationem ex leui materia quàm leuissimis. non oportere esse uel solos, uel inter ignotos, uel inter eos quos aut contemnunt: aut negligunt. mutare debere regiones: et si mens redit, annua peregrinatione esse iactandos. Raro, sed aliquando tamen ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium specie, similiq; uictus genere curandum est: præterquàm quod in hoc insanie genere solo recte uinum datur.

Cardiaci morbi curatio. Caput. XIX.

h
Vic morbo præcipue contrarium est id genus, quod *ναρμανδρ* à grecis nominatur: quis sæpe ad eum phrenitici transeunt. si quidem mens in illis labat: in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas corporis: quod stomacho languente immo dia sudore digeritur. Licetq; protinus scire id esse, ubi uenarum exigui, imbecilliq; pulsus sunt. Sudor autem supra consuetudinem et modo, et tempore ex toto thorace, et ceruicibus, atq; etiam capite prorupit: pedibus tantummodo et cruribus siccioribus, atq; frigentibus. At ubi id morbi genus est: curatio prima est, supra præcordia imponere quæ reprimant cataplasmata. secunda, sudorè prohibere. id præstat acerbum oleum, uel rosa, uel melinum, aut myrteum. quorum aliquo corpus leuiter perungendum: ceratumq; ex aliquo horum tum imponendum est. si sudor uincat, delinendus homo est uel gypso, uel argenti spuma, uel cimolia creta: uel etiam subinde horum puluere respergendus. Idem præstat puluis ex contritis aridi myrti, uel rubi folijs: aut ex austeri, et boni uini arida fece. Pluraq; similia sunt: quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex uia puluis iniectus. Sup hæc uero quo minus corpus insudet: leui ueste debet esse cōtectus, loco nō calido, fenestris patentibus

LIBER

sic, ut per status quoque aliquis accedat. Tertium auxilium est imbecillitati iacentis uino, ciboque succurrere. Cibus non multus quidem, sed saepe tamen nocte, ac die dandus est, ut nutriat: neque oneret. is esse debet ex infirmissima materia: et stomacho aptus. nisi autem necesse est, ad uinum festinare non oportet. si uerendum est ne deficiat, tum et in trita ex hoc, et hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue miraculum. Egelidum subinde et liberaliter dandum est adiecta polenta: si modo is aeger parum cibi assumit. idque uinum esse debet neque nullarum uirium, neque ingentium: recteque tota die, ac nocte uel treis heminas aeger bibet. si uastius corpus est: plus etiam. si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida conuenit: et tum dare. Quod si stomachus resolutus parum continet, et ante cibum, et post eum: sponte uomere oportet: rursumque post uomitum cibum sumere. si ne id quidem manserit, sorbere uini cyathum: interpositaque hora sumere alterum. si id quoque stomachus reddiderit: totum corpus bulbis contritis super illinendum est. qui ubi inaruerunt, efficiunt, ut uinum in stomacho contineatur: ex quo toti corpori calor, uenisque uis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum ptisanæ, uel alicæ cremorem ex inferioribus partibus iniicere, si quidem id quoque uires tuetur. Neque alienum est naribus quoque estuantis admonere quod reficiat: id est rosam, et uinum. Et si qua in extremis partibus frigent: unctis, et calidis manibus fovere. per quæ si consequi potuimus, ut et sudoris impetus minuat: et uita prorogetur: incipit iam tempus ipsum esse præsidio. Vbi in tuto esse uidetur: uerendum est tamen ne ad eandem imbecillitatem cito recidat. Itaque uino tantum remoto, cotidie ualidiorum cibum debet assumere: donec satis uirium corpori redeat.

De lethargo, et eius curatione. Caput. XX.

Alter quoque morbus est aliter phrenitico contrarius. In illo
a difficilis somnus, prompta ad omnem audaciam mens est.
At in hoc marcor et inexpugnabilis penè dormiendi
necessitas, auctorum graeci nominant. atque id quoque genus
acutum est: et nisi succurritur, celeriter ingulat. Hos agros quidam sub-
inde excitare nituntur admotis his, quæ per sternutamenta euocantur:
et his, quæ odore foedo mouent, qualis est pax cruda, lana succida,
piper, ueratrum, castoreum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam gal-
banum incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. si id non est, quodli-
bet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odorem foedum mouent. Thar-
ria quoque uero quidam accessione esse id malum dixit: leuarique cum ea de-
cessit. Itaque

cessit. Itaq; eos qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest aut in decessione expergiscatur æger: an cum febris non leuetur: aut leuata quoq; ea somnus urgeat. Nam si expergiscatur, adhibere ei ut sopito superuacuum est. neq; enim uigilando melior fit: sed per se, si melior est: uigilat. Si uero continens ei somnus est: utiq; excitandus est. sed his temporibus quibus febris leuissima est, ut et exarnat aliqd, & summat. Excitat aut ualidissime repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaq; perunctum oleo multo corpus tribus, aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur, si æqualis ægro spiritus erit: si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt: ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc ratio est. Medendi autem causa caput radendum: deinde postea fouendum est aqua: in qua laurus, aut ruta decocta sit. Altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri bacca, aut hederæ cum rosa, et aceto. Præcipueq; proficit, & ad excitandum hominem naribus admotum, & ad morbum ipsum depellendum capiti, fronti uel impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeq; oportune cibis datus: id est in remissione quanta maxima inueniri poterit: aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat: sic ut si cotidie grauis accessio est: hæc cotidie detur. Si alternis, post grauiorem, sorbitio: post leuiorem, mulsæ aqua. Vinum quoq; cum tempestiuo cibo datum, non mediocriter adiuuat. quod si post longas febres eiusmodi torpor corpori accessit: cætera eadem seruanda sunt. Ante accessionem aut tribus, quatuor uel horis castoreum, si uenter astrictus est: mixtum cum samonea: si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si præcordia mollia sunt, cibis utendum est plenioribus. Si dura, in hisdem sorbitionibus subsistendum: imponendūq; est præcordijs, quod sinul et reprimat, et emolliat.

De aqua inter cutem, hoc est hydropico morbo. Caput. XXI.

Ed hic quidem acutus est morbus. Longus uero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet: nisi primis diebus discussus est: ὅπου τὰ γὰρ ἑλὶν ὀνομαζομένη. Atq; eius tres species sunt. Nam modo uentre uehementer intento creber intus ex motu spiritus sonus est. modo corpus inæquale est: tumoribus aliter, aliterq; per totum id orientibus. modo intus in unum aqua contrahitur: & moto corpore ita mouetur, ut impetus eius conspicia possit. Primum τιμπαίνουσαν, secundum ἀνωορλεματίαν, uel ὑπὸ σάρακα, tertium ἀσπίνουσαν ἑλὶν ὀνομαζομένη. Communis in omnium est humo-
 Aurelij Cor. f

LIBER

ris nimia abundantia: ob quam ne ulcera quidē in his aegris facile sa-
 nescent. Sæpe uero hoc malū per se incipit. Sæpe alteri uetusto mor-
 bo, maximeq; quartana superuenit. Facilius in seruis, quā in li-
 beris tollitur. quia cum desideret famem, sitim, mille alia tedia, lon-
 gamq; patientiam: promptius his succurritur, qui facile coguntur: quā
 quibus inutilis libertas est. sed ne hi quidem, qui sub alio sunt: si ex
 toto sibi temperare non possunt: ad salutem perducuntur. Ideoq; non
 ignobilis medicus Chryssippi discipulus apud Antigonum regem ami-
 cum quendam eius notæ intemperantiæ mediocriter eo morbo impli-
 citum, negauit posse sanari. Cumq; alter medicus epirotes Philippus se
 sanaturum polliceretur: respondit illum ad morbum ægri respicere: se
 ad animum. neq; eum res fecellit. Ille. n. cum summa diligentia non
 medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur: tamen malagmata
 sua deuorando, bibendoq; suam urinam, in exitium se præcipitauit.
 Inter initia tamen non difficillima curatio est: si imperata sunt corpo-
 ri quies, sitis, inedia. At si malum inueterauerit: non sine magna mo-
 lesta discutitur. Metrodorum tamen Epicuri discipulum referunt: cum
 hoc morbo tentaretur, neq; æquo animo ferret necessariam sitim: ubi
 diu abstinerat: bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur
 qui quid receptum est: multum tedio demit. si à stomacho retentum
 est, morbum auget. Ideoq; in quolibet tentandum nō est. sed si febris
 quoq; est: hæc in primis submouenda est per eas rationes: per quas
 huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est: tum demū ad
 ea ueniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. atq; hic quæq; quæ-
 cunq; species est, si nondum nimis occupauit: hisdem auxilijs opus est.
 multum ambulandum. currendum aliquid est. superiores maxime
 partes sic perficiendæ, ut spiritum ipse contineat. euocandus est su-
 dor non exercitatione tantummodo, sed etiam in harena calida, uel laco-
 nico, uel clibano, similibusq; alijs: maximeq; utiles naturales, et siccæ
 sudationes sunt: quales super baias habemus in myrtetis. balneū, atq;
 omnis humor alienus est. Ieiuno recte catapotia dantur facta ex ab-
 sinthij duabus, myrrhe uel tertia parte. Cibus esse debet ex media qui-
 dem materia: sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est,
 quā ut uitam sustineat. optimaq; est, quæ urinā mouet. sed id ipsum
 tamen molliri cibo, quā medicamento melius est. Si tamen res coget ut
 ex his aliquid detur: præstanter id decoquendū, eaq; aqua potui dan-
 da. videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum, crocum, cin-
 namum, amomum, cassia, myrra, balsamum, galbanum, ladanum, oe-
 nante, panace, cardamomum, hebenus, cupressi semen, uua timinia, quā
 σαρδίον ἀρπύριον. græci nominat: abrotanum, rosæ folia, acorum, ama-

re nuces, tragoriganum, storax, costum, iunci quadrati & rotundi semen: illud $\nu\upsilon\pi\upsilon\rho\upsilon\nu$, $\chi\omicron\iota\tau\omicron\nu$ hoc graeci vocant. Quae quotiens posuero, non quae hic nascuntur, sed quae inter aromata afferuntur, significabo. Primo tamen quae leuissima ex his sunt: id est rosae folia, vel nar di spica tentanda sunt. Vinum quoque utile est, & austerum: sed quàm tenuissimum. Commodum est etiam lino cotidie ventrem nutrire: & quae comprehendit aluum, notam imponere. postero die videre si plenius corpus sit: an extenuetur. Id enim quod tenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est mictiri & potionem eius, et urinam. Nam si plus humoris excernitur, quàm assumitur: ita demum secundae valetudinis spes est. Asclepiades in eo qui ex quartana in hydropa deciderat: se abstinentia bidui & frictione usum. tertio die iam et febre, & aqua liberato cibum, & vinum dedisse, memorie praedit. Hactenus communiter de omni specie dici potest. Si uehementius malum est, diducenda ratio curandi est. Ergo si inflammatio, et ex ea dolor creber est: utilis quotidianus aut alterno quoque die post cibum, uomitus est. Fomentis siccis, calidisque utendum est. si per haec dolor non finitur, necessariae sunt sine ferro cucurbitulae. Si ne per has quidem tormentum tollitur: incidenda cutis est: & tum his utendum. Vltimum auxilium est: si cucurbitulae nihil profuerunt: per aluum infundere copiose aquam calidam, eamque recipere. Quin etiam cotidie ter, quaterue opus est uti frictione uehementi cum oleo, & quibusdam calefacientibus. sed in hac frictione a ventre abstinendum est. Imponendum uero in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat: ferramentisque cadentibus pluribus locis uenter exulcerandus est: & seruanda ulcera diutius. Utiliter etiam scylla cocta delinitur cutis: sed diu post has inflammationes abstinendum est ab omnibus instantibus. At si id uitium est, cui $\alpha\nu\kappa\omicron\pi\lambda\epsilon\zeta\mu\alpha\tau\iota\alpha$ nomen est: eas partes quae tumunt, subijcere soli oportet: sed non nimium, ne febricula inadat: si is uehementior est, caput uelandum est: utendumque frictione madefactis tantum manibus aqua: cui sal, & nitrum, & olei paulum sit adiectum sic, ut aut pueriles, aut muliebres manus adhibeantur: quo molior earum tactus sit. Idque si uires patiuntur, ante meridiem tota hora: post meridiem semi hora fieri oportet. Utilia etiam sunt cataplasmata quae reprimunt: maximaque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super tulum quattuor fere digitis ex parte interiore: quae per aliquot dies frequens humor feratur: atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumque multa gestatione corpus est: atque ubi induratae uulneribus cicatrices sunt, adiucendum & exercitationibus est, & cibus, donec corpus ad primum habitum reuertatur. Cibus ualens esse debet, & glutinosus, maximaque

LIBER

caro. Vinum, si per stomachum licet: dulcius. sed ita ut inuicē biduo, triduo uel modo aqua, modo id bibatur. Prodest et lactucae marinae quae grandis iuxta mare nascitur, semen cum aqua potui datum. Si ualens est qui id accipit: ei scylla cocta sicut supra dixi, delinatur. Anthoresque multi sunt: inflatis uescis pulsandos tumores esse. Si uero id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur: ambulare, sed magis modice oportet. malagma quod digerat impositum habere: idque ipsum super imposito triplici panno fascia, non nimium tamen uehementer astringere. quod a Tharria profectum, seruatum esse à pluribus uideo. Si iecur aut lienem affectum esse manifestum est: ficum pinguem contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia uenter non siccatur: sed humor nihilominus abundat: celeriore uia succurrere, ut is per uentrē ipsum emittatur. Neque ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandi uiam. Morbum enim hunc iocineris putauit. Ideoque ita illum esse sanandum: frustra quoque aquam emitti: quae uitiato illo subinde nascatur. Sed primum non huius uisceris unius hoc uitium est. Nam splene affecto, et in totius corporis malo habitu fit: deinde ut inde coeperit: tamen aqua nisi emittitur, quae contra naturam ibi subsistit: et iocineri, et ceteris interioribus partibus nocet. conuenitque corpus nihilominus esse curandum. neque enim sanat emissus humor: sed medicinae locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne illud quidem in controuersiam uenit: quin non omnes in hoc morbo sic curari possint: sed iuuenes robusti, qui uel ex toto carent febre: uel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est, qui uel ex atra bile huc deciderunt: quique malum corporis habitum habent: idonei huic curationi non sunt. Cibus autē quo die primum humor emissus est, superuacuuus est: nisi si uires defuerint. Insequentibus diebus et his uinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet, paulatimque euocandus aeger est ad exercitationes, frictiones, solem, sudationes, navigationes, et idoneos cibos: donec ex toto conualescat. Balneum rarum res amat: frequentiore in ieiunio uomitum. Si aestas est, in mare natare commodum est. ubi conualuit aliquis, diu tamen alienus ei ueneris usus est.

De tabe, et eius speciebus, et curationibus. Caput. XXII.

Idius saepe et periculosius tabes eos male habet, quos in nascit. Atque huius quoque plures species sunt. Vna est qua corpus non alitur: et naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis uero in eorum locum subeuntibus, summa

summa macies oritur: & nisi occurratur, tollit. ἀνοσιαν hanc græci vocant. Ea duabus ferè de causis incidere consuevit. aut enim nimio timore aliquis minus, aut auiditate nimia plusquam debet: assumit. ita uel quod deest, infirmat: uel quod superat, corrumpitur. Altera species est, quam græci καχεξία appellat: ubi malus corporis habitus est. ideoq; omnia alimenta corrumpuntur. quod ferè fit, cum longo morbo uitata corpora, etiam si illo uacant: refectionem tamen nõ accipiunt: aut cum malis medicamentis corpus affectum est, aut cum diu necessaria defuerunt, aut cum inusitatos & inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquidue simile incidit. Huic præter tabem illud quoq; nõnunq; accidere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulcera, summa cutis exasperetur: uel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, longeq; periculossima species, quam græci φθίσις nominauerunt. Oritur ferè à capite: inde in pulmonem destillat: huic exulceratio accedit. ex hac febricula leuis fit: quæ etiam cum quieuit, tamen & repetit. Frequens tussis est: pus excreatur: interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est: mali odoris est. Itaq; qui de morbo dubitant, hac nota utuntur. Cum hæc genera tabis sint, animaduertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. deinde si tantummodo non ali corpus apparet: causam eius attendere: & si cibi mirus aliquis quàm debet, assumit: adijcere, sed paulatim: ne si corpus insuetum subita multitudinis onerauerit: concoctionem impediat. Si uero plus iusto quis assumere solitus est: abstinere uno die, deinde ab exiguo cibo incipere: cotidie adijcere donec ad iustum modum perueniat. Præter hæc conuenit ambulare locis quàm minime frigidis sole uitato: p manus quoq; exerceri. Si infirmior est, gestari, ungi, perfricari si potest maxime per se ipsum sæpius eodem die, & ante cibum, & post eum sic, ut interdum oleo quædam adijciantur calefacta, donec insudet. Prodestq; ieiunio prehendere per multas partes cutem: & attrahere ut relaxetur: aut imposita resina, & abducta subinde idem facere. Vtile est etiam interdum balneum: sed post cibum exiguum. Atq; in ipso solio recte cibi aliquid assumitur: aut si sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi uero esse debent ex his, qui facile concoquuntur: qui maxime alunt. Ergo uini quoq; sed austeri necessarius usus est. mouenda urina. at si malus corporis habitus est, primum abstinendum est: deinde aluus ducenda. tum paulatim cibi dandi adiectis exercitationibus, unctionibus, frictionibus. Vtilius his frequens balneum est: sed ieiunis etiam usq; sudorem. Cibis uero opus est copiosis, varijs, boni succi: quiq; etiam minus facile corrumpantur: uino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mitten-

Aurelij Cor.

f. iij

dus est, sed paulatim cotidieq; pluribus diebus cū eo, ut cætera quoq;
 eodem modo seruetur. Quod si mali plus est, et uera p̄s̄is est: in=
 ter initia protinus occurrere necessarium est. neq; enim facile is mor=
 bus cum inueterauerit, euincitur. Opus est si uires patiuntur longa na=
 uigatione, cæli mutatione sic, ut densius quàm id est, ex quo discedit
 æger: petatur. Ideoq; aptissime Alexandriam ex Italia iitur. Ferèq; id
 posse inter principia corpus pati debet: cum hic morbus ætate firmis=
 sima maxime oriatur: id est ab anno duodecimo, ad annum quintū,
 et trigessimū. Si id imbecillitas non sinit, naue tñ non longe gestari
 comodissimum est. Si nauigationē aliqua res prohibet: lectica uel alio
 modo corpus dimouendum est. Tum a negocijs abstinendum est: omni=
 busq; rebus, quæ sollicitare animum possunt. somno indulgendum: ca=
 uendæ defillationes, ne si quid cura letarit: exasperetur. Et ob id ui=
 tanda cruditas: simulq; sol, et frigus. Os obtegendum: fauces uelandæ:
 tussicula suis remedijs finienda. et quandiu quidem febricula incur=
 sat, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuis cibis meden=
 dum. Eoq; tempore bibenda aqua. Lac quoq;, quod in capitis dolori=
 bus, et in acutis febribus, et per eas facta nimia sitis, siue præcor=
 dia timent, siue biliosa urina est, siue sanguis fluxit, pro ueneno est.
 in phthisi tamen sicut in omnibus longis, difficilibusq; febriculis recte
 dari potest. Quod si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit:
 decurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq; ambulationes:
 item lenes frictiones. Balneum alienū est. Cibus esse debet primo acer,
 ut alliu, porrum, idq; ipsum ex aceto. uel ex eodē intubus, ocyum, la=
 ctuca. Deīn lenis ut sorbitio ex p̄s̄ana, uel ex alia, uel ex amylo la=
 cte adiecto. Idem oriza quoq;, et si nihil aliud est: far præstat. Tū in=
 uicem modo his cibis, modo illis utendum est. adiiciendaq; quædam ex
 media materia, præcipueq; uel ex apruna, cerebellū, uel pisciculus, et
 his similia. Farina ē cum seuo ouillo, caprino uel mixta, deīde inco=
 cta pro medicamēto est. uinum assumi debet lene, austerum. Hactenus
 non magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est, ac neq; febricu=
 la, neq; tussis quiescit: tenuariq; corpus apparet: ualidioribus auxilijs
 opus est. Exulcerandus est ferro candenti uno loco sub mento, altero in
 gutture: duobus ad mamam utranq; item sub imis ossibus scapula=
 rum, quas ὠμοπλάται græci uocant: sic ne sanescere ultra sinamus, nisi
 tussi finita: cui per se quoq; medendum esse manifestū est. Tunc ter,
 quaterq; die uehementer extremæ partes perfricandæ. thorax leui=
 manu pertractandus. post cibum intermittenda hora: et perfricanda:
 crura, brachiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est æger in so=
 lium: in quo sit aqua calida, et oleum. cæteris diebus bibenda aqua:

rum & uinum: si tussis non est, potui frigidum dandum: si aestas est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissionibus cotidie dari: frictiones, gestationesq; similiter adhiberi. eadem acria quarto, aut quinto die sumere: interdum herbam sanguinalem ex aceto, uel plantaginem esse. Medicamentum etiam est uel plantaginis succus per se, uel marrubium ex melle concoctum, ita ut illius cyathus sorbillo sumatur: huius cochleare plenum paulatim delingatur: uel inter se mixta, & incocta resinae terebinthinae pars dimidia: butyri, et mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt uictus, uehiculum, & nauis, & sorbitio. Alius cita utiq; uitanda est. Vomitus in hoc morbo si frequens est, pernitiosus est, maximèq; sanguinis. Qui meliusculus esse coepit, addicere debet exercitationes, frictiones, cibos: deinde ipse se suppresso spiritu perfricare: diu abstinere à uino, balneo, uenere.

De comitialis morbi curationibus. Caput. XXIII.

Inter notissimos morbos est et is, qui comitialis, uel maior nominatur. Homo subito concidit: ex ore spumæ mouentur: deinde interposito tempore ad se redit: & per se ipsum consurgit. Id genus sæpius uiros quàm feminas occupat. ac solet quidem et longum esse, usq; ad mortis diem: & uitæ non periculosum: interdum tamen cum recens est hominem consumit: & sæpe cum si remedia non sustulerunt, in pueris ueneris, in puelis menstruum initium tollit. modo cum distentione membrorum, aut nervorum prolabitur aliquis: modo sine illa quidem. Hos quoq; hisdem quibus lethargicos excitare conantur, quod admodum supernacuum est: & quia ne lethargicus quidem ipsi sanatur: & quia cum possit ille nunquàm expergisci, acq; ita fame interire: hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utiq; sanguis mitti debet: si accessit, non utiq; mittendus est, nisi alia quoq; hortantur. necessarium autem est ducere aluum: uel nigro ueratro purgare: uel uirungi facere si uires patiuntur. tunc caput tondere: oleoq; aceto pun gere: cibum post diem tertium simul cum transit hora, qua concidit, dare. Neq; sorbitiones autem his, aliq; molles, & faciles cibi, neq; caro, minimeq; suilla conuenit: sed mediæ materiæ. Nam et uiribus opus est: & cruditates cauendæ sunt, cum quibus fugere oportet solem: balneum, ignem, omniaq; calefactionia. item frigus, uinum, uenerem, loci præcipitis conspectum, omniumq; terrentium, uomitum, lassitudinem, solitudines, negocia omnia. Vbi tertio die alius datus est, intermittere quartum, & inuicem alterum quenq; eadem hora cibi seruata: donec quatuordecim dies transeant. quos ubi morbus exarsit: acuti uinum

LIBER

deposuit. at si manet, curandus iam ut longus est. Quod si non quo die primum id incidit, medicus accessit: sed is qui cadere consuevit, ei traditus est: protinus eo genere uictus dabitur: qui supra comprehensus est: expectandus est dies, quo prolabatur: utendumq; tum uel sanguinis missione, uel ductione alui, uel nigro ueratro: sicut præceptum est. In sequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui: uitatis omnibus quæ cauenda dixi: nutriendus. Si per hæc morbus finitus non fuerit: confugendum erit ad album ueratrum: ac ter quoq; aut quater eo utendum: non ita multis interpositis diebus, sic tamen ne iterum unquam sumat, nisi conciderit. Medijs autem diebus uires eius erunt nutriendæ, quibusdā præter ea quæ scripta sunt, adiectis. Vbi mane experfectus est, corpus eius leuiter ex oleo uetere, cū capite, excepto uentre, permulceatur. tum ambulatione quā maxime longa, & recta utatur. post ambulationem loco tepido uehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida persundatur. paulum cibi assumat: conqueascat: rursum ante noctem ambulatione utatur: iterum uehementer perfricetur sic, ut neq; uenter, neq; caput contingatur: post hæc coenet: interpositisq; tribus, aut quattuor diebus, uno aut altero acria assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radat: unguatur oleo uetere, adiecto aceto, & nitro: persundatur aqua salsa: bibat ieiunus ex aqua castorei: nulla aqua nisi decocta potionis causa utatur. Quidam ingulati gladiatori calido sanguine epota, tali morbo se se liberarunt: apud quos miserū auxilium, tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicū uero pertinet, ultimū est iuxta talū ex utroq; crure paulum sanguinis mittere: occipitium incidere: & cucurbitulas admonere ferro candente: in occipite quoq; & infra, qua summa uertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea pernitiosus humor euadat. quibus si finitum malum non fuerit, propè est, ut perpetuum sit. Ad leuandum id tantummodo utendum erit exercitatione, multa frictione, cibisq; his, qui supra comprehensi sunt. præcipueq; uitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

De regij morbi curatione. Caput. XXIIII.

Equè notus est morbus, quem interdum arquatū, interdum regium nominant: quem Hippocrates ait: si post septimum diem febricitante agro superuenit, tutum esse mollibus tantūmodo præcordijs substantibus. Diocles ex toto si post febrem oritur, et prodesse. si post hunc febris, occidere. Col-
lor autem

lor autem cum morbum detegit maxime oculorum: in quibus quod album esse debet, fit luteum. Soletq; accedere et sitis, et dolor capitis, et frequens singultus, et præcordiorum dextra parte durities: et ubi corporis uehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumq; resolutio. atq; ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalescit. Primo die abstinere ægrum oportet: secundo ducere aluum: tum si febris est, eam uictus genere discutere. si non est, scamoneam potui dare: uel cum aqua betam albam contritam, uel cum aqua mulsâ nuces amaras, absinthium, anesum sic, ut pars huius in anima sit. Asclepiades aquam quoq; salsam, et quidem per biduum purgationis causa bibere cogebat ijs, quæ urinam mouent: reiectis. Qui dam superioribus omissis, per hæc et per eos cibos, qui extenuant: idem se consequi dicunt. Ego ubiq; si satis uirum est, ualidiora: si parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo: primo modice cibum oportet assumere ex media materia: et uinum bibere græcum salsum, ut resolutio uentris maneat. tum altero triduo ualidiores cibos, et carnis quoq; aliquid esse. intra aquâ manere. deinde ad superius genus uictus reuerti cum eo, ut magis satietur omissis græco uino bibere integrum austerum: atq; ita per hæc uariare, ut interdum acres quoq; cibos interponat: interdum ad salsum uinum redeat. Per omne uero tempus utendum est exercitatione, frictione: si hyems est, balneo: si æstas, frigidis natationibus: lecto et, et conclauis cultiore. clauso loci uti ludis, lascinia: per quæ mens exhilaretur. ob quæ regius morbus dictus uidetur. Malagma quoq; quod digerat, super præcordia datum, prodest: uel arida ibi ficus imposita, si iecur, aut lienis affectus est.

De elephantia curatione. Caput. XXV.

Quotus autem penè in italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ἐλεφαντία græci uocant: isq; longus annumeretur. Totum corpus afficitur, ita ut ossa quoq; uitiari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosq; tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisq; quasi squamis quibusdam exasperatur: corpus emacrescit: os suræ: pedes intumescent. Vbi uetus morbus est, digiti in manibus, pedibusq; sub tumore conduntur: febricula oritur, quæ facile tot malis obrutum hominem consumit. protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet: aut nigro ueratro uenter solui: adhibenda tamen quanta sustineri potest, inedia est. paulum deinde uires reficiendæ: et

LIBER

ducenda alius. post hæc, ubi corpus lenatum est, utendum est exercitatione, præcipueq; cursu. sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus euocandus. frictio adhibenda: moderadumq; inter hæc, ut vires conferuentur: balneum rarum esse debet. Cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine instantibus. Vinum, præterquam primis diebus, recte datur. Corpus contrita planta go, & illita tueri optime videtur.

De attonitis, & eorum curatione. Caput. XXVI.

a Ttonitos quoq; raro videmus: quorum & corpus, & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis: interdum morbo: ἀποπληξίᾱ hūc græci appellant. Huius sanguis mittendus est. ueratro quoq; albo, uel alui ductione utendum. Tum adhibendæ frictions: & ex media materia minime pingues cibi. quidam et acres: & a uino abstinendum.

De resolutione nervorum: quæ apoplexia, uel paralysis dicitur. Caput. XXVII.

a T resolutione nervorum frequens ubiq; morbus est. Sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres authores illud ἀποπληξίᾱ, hoc παραλύσιν nominauerunt. Nunc utrunq; paralyse appellari uideo. Solent autem qui per omnia membra uehementer resoluti sunt, celeriter rapi. ac si correcti non sunt, diutius quidem uiuunt: sed raro tamē ad sanitatem perueniunt: & plerunq; miserum spiritum trahunt, memoria quoq; amissa. In partibus uero nunquam acutus, sæpe longus, ferè sanabilis morbus est. Si omnia membra uehementer resoluta sunt, sanguinis detractio uel occidit, uel liberat. Aliud curationis genus uix unquam sanitatem restituit: sæpe mortem. tantum differt uitam: interim infestat. Post sanguinis missionem si non redit & motus, & mens: nihil spei superest. Si redijt: sanitas quoq; prospicitur. At ubi pars resoluta est, prouidet malo corporis, uel sanguis missus, uel alius ducta. Cætera eadem in utroq; casu facienda sunt. si quidem uitare præcipue conuenit frigus: paulatimq; ad exercitationes reuertendum est sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum imbecillitas prohibet: uel gestetur, uel motu lecti concutatur: tum id membrum quod deficiet si potest, per se, si minus, per alium moneatur: & ui quadam ad consuetudinem suam redeat. Prodest et torpentibus mēbris summam

cutem exasperasse, uel urticis casam, uel imposito sinapi sic, ut ubi rubere coeperit corpus: hæc remoueantur. Scylla quoq; contrita, bulbiq; contriti cum thure recte imponuntur. Neq; alienum est resina autem tertio quoq; die diutius uellere: pluribus et locis aliquando sine ferro cucurbitulas admonere. Vnctioni uero aptissimum est uetus oleum, uel nitrum aceto, et oleo mixtum. Quin etiam fovere aqua calida marina: uel si ea non est, tamen salsa, magnopere necessarium est. At si quo loco uel naturales, uel etiam manu factæ tales natationes sunt, ijs potissimum utendum est: præcipueq; in his agitata membra, quæ maxime deficiunt. Si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeq; ex uenatione. potio sine uino aqua calida. Si tamen uetus morbus est, interponi quarto, uel quinto die purgationis causa uinum græcum falsum prodest. Post coenam utilis uomitus est. Interdum uero etiam nervorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet uomere: non medicamentis urinam mouere: non sine exercitatione sudores, ut quidam præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. in lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est. deinde reposito spiritu ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ. balneo raro utendum: nisi admodum subinde peregrinationibus cælum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est: deinde inuoluenda, et subiicienda pruna lenis, et sulphur. atq; ita id suffumigandum: idq; aliquandiu faciendum. Sed ieiunio cum bene iam concoxerit, cucurbitulae quoq; sæpe dolenti parti ad mouendæ sunt: pulsandusq; leniter inflatis uescis bubulis is locus est. Vtile est et seum miscere cum uosnuæ, et urticae contritis siminibus sic, ut omnium par modus sit: idq; imponere: fovere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Vtriculi quoq; recte imponuntur aqua calida repleti: aut bitumen cum ordeacea farina mixtum: atq; in ipso potissimum dolore utendum gestatione uehementi est. quod in alijs doloribus pessimum est. Tremor aut nervorum æque uomitu, medicamentisq; urinam mouentibus impeditur. Inimici etiam habet balnea, assasq; sudationes. bibenda aqua est. acris ambulatione utendum. item unctionibus, frictionibusq; maxime per seipsum. pila, similibusq; superiores partes dimouendæ. cibo quolibet utendum, dum modo concoctioni utiq; studeatur. secundum cibum curis abstinendum. rarissima uenere utendum est. si quando quis in eâ prolapsus est: tum oleo leniter, diuq; in lectulo perfricari manibus puerilibus, potius quam uirilibus debet. suppurationes autem quæ in aliqua interiori parte oriuntur, ubi notæ fuerint: primum id agere oportet p ea cataplasmata, quæ reprimunt: ne coitus inutilis materiæ fiat. deinde si hæc uicta sunt, p ea malagmata quæ digerunt: diffi-

LIBER. III.

pentur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut euocetur: deinde ut mature scat: omnis tunc uomica finis est, ut rumpatur. Inditumq; est, pus uel aluo, uel ore redditum. sed nihil facere oportet quo minus quicquid est puris, excedat. Vitandum maxime sorbitionibus est: et aqua calida: Vbi pus ferri desit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen ualidiores, et frigidos cibos, frigidamq; aquam sic, ut ab egelidis tamen initium fiat. primoq; cum melle quaedam edenda, ut nuclei pinei, uel graecae nuges, uel auellanae. Postea submouendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, sucus assumptus uel porri, uel marrubij: et omni cibo porrum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus quae non afficiuntur, frictionibus: item ambulationibus lenibus. Vitandumq; erit, ne uel luctando, uel currendo, uel alia ratione sanescientia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoq; omnimodo cauendus sanguinis uomitus est.

De humani corporis interioribus sedibus. Caput. I.

h

Actenus reperiuntur ea genera morborū: quæ in totis corporibus ita sunt, ut ijs certæ sedes assignari non possint. Nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi, curationesq; in noticiam venient: si prius eorum sedes breuiter ostendero.

Caput igitur, eaq; quæ in ore sunt, non lingua tantummodo, palatoq; terminantur: sed etiam quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra, sinistraq; circa guttur venæ grandes, quæ *οπαρτιδες* nominantur: itemq; arteriæ, quas *παρτιδες* vocant: sursum procedentes ultra aures feruntur. atq; in ipsis cervicibus glandulæ posita sunt: quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt. alterum asperam arteriam nominant: alterum stomachum. arteria exterior ad pulmonem: stomachus interior ad ventriculum fertur: illa spiritum, hic cibum recipit: quibus cum diuersæ viæ sint: quæ cœunt exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est. quæ cū spiramus, attollitur: cum cibum, potionemq; assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria dura, et cartilaginosa in gutture assurgit: cæteris partibus residet. Constat ex arcibus quibusdam compositis ad imaginem earū uertebraarum, quæ in spina sunt: ita tñ, ut ex parte exteriori aspera, ex interiori stomachi modo leuis sit. eaq; descendens ad præcordia, cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoq; spiritus *απax*, et à tergo spinæ ipsi iunctus in duas fibras ungulæ bubulæ modo diuiditur. huic cor annexū est natura musculosum, in pectore sub sinistro mēbra situm: duosq; quasi uentriolos habet. at sub corde, atq; pulmone transuersum, ex ualida membrana septum est: quod à præcordijs utrum diducit æque neruosum. Multis etiam uenis per id discurrentibus à superiore parte non solum intestina, sed iecur quoq; lienemq; discernit. Hæc uiscera proxima: sed infra tamē posita dextra, sinistraq; sunt. Iecur à dextra parte sub præcordijs ab ipso septo ortum intrinsecus cauum: extrinsecus gibbum: quod prominens leuiter uentriculo insidet: et in quattuor fiores diuiditur. Ex inferiore uero parte ei fel inheret. at lienis sinistra non eidē septo, sed intestino innexus est: natura mollis, et rarus longitudo, crassitudoq; modica: isq; paulum à costarum regione in utrum excedens, ex maxima parte sub his conditur. atq; hæc quidem

LIBER

iuncta sunt. Renes uero diuersi, qui lumbis sub imis costis inhaerent à parte earum resimi, ab altera rotundi: qui & uenosi sunt: & uentriculos habent: & tunicis super continguntur: ac uiscerum quidem haec sedes sunt. Stomachus uero qui intestinorum principium est, nervosus à septimae spinæ uertebra incipit: ac circa præcordia cum uentriculo committitur. Venter autem qui receptaculum cibi est: constat ex duobus tergoribus. isq; inter lienem, & iecur positus est: utroq; ex his paulum super eum ingrediente. Suntq; etiam membranae tenues, per quas inter se omnia ista connectuntur: iungunturq; ei septo, quod transversum esse supra posui. Inde ima uentriculi pars paulum in dexteriores partes conuersa, in summum intestinum coartatur. Hanc iuncturam πύλου πορ greci uocant: quoniam portæ modo in inferiores partes ea quæ excreturi sumus, emitit. ab ea ieiunum intestinum incipit non ita implicitum, cui tale uocabulum est: quia nunquam quod accipit, continet: sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenue intestinum est in sinus uehementer implicitum. Orbes uero eius per membranas singuli cum inferioribus connectuntur, qui in dexteriores partes conuersi, & e regione dexteroris coxæ finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transversum committitur: quod à dextra parte incipiens, in sinisteriorem peruium, & longum est: in dexteriores non est. Ideoq; cæcum nominatur. At id quod peruium est, late fusum, atq; sinuatum: minusq; quam superiora intestina nervosum: ab utraq; parte huc, atq; illuc uolutum: magis tamen sinisteriores, inferioresq; partes tenens: contingit iecur, atq; uenter. Deinde cum quibusdam membranis à sinistro rene uenientibus iungitur: atq; hinc dextra recurvatum in imo dirigitur, qua excernit. ideoq; id ibi rectum intestinum nominatur. Contigit uero uniuersa hæc omentum ex interiore parte læue, & strictum: ex superiore mollius. Cui adeps quoq; innascitur: quæ sensu sicut cerebrum quoq; & medulla caret. At à renibus singulae uenæ calore albæ ad uescicam feruntur: ούρη πύρος greci uocant: quod per eas inde descendente urinam in uescicam distillare concipiunt. Vescica autem in ipso sinu neruosa, & duplex ceruicæ plena, atq; carnosâ iungitur per uenas cum intestino, eoque offe, quod pubi subest. Ipsa soluta, atque liberior est: aliter in uiris, atq; in foeminis posita. Nam in uiris iuxta rectum intestinum est, potius in sinistra partem inclinata. In foeminis super genitale earum posita est: superq; elapsa ab ipsa uulua susinetur. Tum in masculis iter urinae spaciosius, & compressius à ceruicæ huius descendit ad colen. In foeminis breuius, & plenius super uulua ceruicam

se ostendit. Vulua autem in uirginibus quidem admodum exigua est. In mulieribus uero nisi ubi grauidæ sunt, non multo maior: quam ut manus comprehendatur. Ea recta continuatq; ceruicæ, quæ analem uocant: contra mediam alium orsa: inde paulum ad dexteriores coxam conuertitur: deinde super rectum intestinum progressa, ilijs foeminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas, et pubem imouentem posita sunt: à quibus ac pube abdomen sursum uersus ad præcordia peruenit: ab exteriori parte euidenti cute, ab interiori leni membrana inclusum: quæ omento iungitur: peritæos autem à grecis nominatur.

De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: et primo de eius dolore: deinde de morbo qui circa faciem nascitur: tum de lingue resolutione: postremo de destillatione, ac grauedine. Caput. II.

Is ueluti in conspectum quendam quatenus scire curanti necessarium est adductis, remedia singularum laborantium partium exequar, orsus à capite. sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, et si quis similis est: alijs erit explicandus. In capite autem interdum acutus, et pestifer morbus est: quem *νεφελία* greci uocant. Cuius notæ sunt horror calidus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, uomitus: sic ut uox supprimatur, uel sanguis ex naribus cursus: sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maxime circa tempora, uel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas: sed neq; grauis, neq; periculosa per hominis ætatem est. Interdum grauior dolor, sed breuis, neq; tamen mortiferus: qui uel uino, uel cruditate uel frigore, uel igne, aut sole contrahitur. Hijs omnes dolores modo in febre, modo sine hac sunt: modo in toto capite, modo in parte interdum, sic ut oris quoq; proximam partem excrucient. Præter hæc et unum inuenitur genus, quod potest longum esse. ubi humor cutem inflat, eaq; intumescit, et prementi digito cedit, uel opone paxor greci appellant. Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est: quæ sit ratione curandum, dixi: cum persequer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ uero auxilia sunt capitis, ubi cum febre dolor est: eo loco explicatum est, quo februm curatio exposita est. Nunc de cæteris dicendum: ex quibus id quod acutum est, et id quod supra consuetudinem intenditur: idq; quod ex subita causa, et si non pestiferum, tamen uehemens est: primâ curationem

LIBER

habet, qua sanguis mittatur. sed id, nisi intolerabilis est dolor, super uacuum est. satiusque est abstinere à cibo: si fieri potest, etiam à potione: si non potest, aquam bibere. si postero die dolor remanet, alium ducere: sternutamenta euocare: nihil assumere, nisi aquam. sæpe enim dies unus, aut alter totum dolorem hac ratione discitit. utique si ex uino, uel cruditate origo est. si uero in his auxilij parum est: tondere oportet ad cutem. deinde considerandum est: quæ causa dolorem excitarit. si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit: spongam concinam imponere, subinde in aqua frigida expressam: ungere rosa, et aceto, uel potius his tinctam lanam succidam imponere: aliaque refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit: caput oportet perfundere aqua calida marina, uel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit: tum caput uehementer perfricare: deinde calido oleo implere: ueste uelare. quidam et id deuincunt. Alij cervicalibus uestimentisque onerant: et sic leniantur. alios calida cataplasmata adiuvant. Ergo et ubi causa incognita est, uidere oportet refrigerantia magis, an caleficientia leniant: et his uti, quæ experimentum approbarit. At si parum causa discernitur: perfundere caput primum aqua calida, sicut supra præceptum est: uel salsa, uel ex lauro decocta. tum frigida posca. Illa in omni uetusto capitis dolore communia sunt: sternutamenta excitare, inferiores partes uehementer perfricare: gargarizare his, quæ salinam mouent: cucurbitulas temporibus et capitis admoovere: sanguinem ex naribus detrahere: resina subinde tempora peruellere: et imposito sinapi exulcerare ea, quæ male habent, ante linteolo subiecto, ne uehementer arrodant: candentibus feramentis ubi dolor est, ulcera excitare: cibum per modicum cum aqua sumere. ubi lenatus est dolor, in balneum ire: ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si discussis ex toto dolor est, etiam ad uinum reuerti: sed postea semper antequam quicquam aliud, aquam bibere. dissimile est id genus quod humorem in caput contrahit. In hoc tondere ad cutem necessarium est. deinde imponere sinapi, sic ut exulceret. si id parum profuit: scalpello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur: insudet: uehementer perfricetur: abis, potionibusque utatur, urinam præcipue mouentibus.

De morbo, qui circa faciem nascitur: quem greci cynicum spasmodum nominant.

Ira faciem uero morbus innascitur: quem greci νυκινδον σπασμὸν nominant. Is cum acuta febre oritur. Os cum motu

motu quodam peruertitur. ideoq; nihil aliud est, quàm distentio oris. Accedit crebra coloris in facie, totoq; corpore mutatio. somnus in promptu est. in hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est: ducere alium. si ne sic quidem discussum est: albo ueratro uomitum mouere. præter hæc necessarium est uitare solem, lassitudinē, uinum. sed si discussum his non est: utendum est cursu, frictione in eo quod læsum est leni, & multa in reliquis partibus breuiore, sed uehementi. prodest etiam mouere sternutamenta: caput radere: idq; perfundere aqua calida uel marina, uel certe salsa sic, ut ei quoq; sulphur adijciatur. post perfusionem iterum perfricari: sinapi manducare: eodemq; tempore affectis oris partibus ceratum: integris idem sinapi, donec arrodant, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

De resolutione lingue.

T si lingua resoluta est: quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit sic, ut sermo hominis non explicatur: oportet gargarizare ex aqua: in qua uel thymum, uel hyssopū, uel nepeta decocta sit: aquam bibere: caput, et os, & ea quæ submento sunt, & ceruicem uehementer perfricare: laesæ linguam ipsam: linere: manducare quæ sunt acerrima, idest sinapi, allium, cepam: magna ui luctari, ut uerba exprimantur: exerceri re tanto spiritu: caput sæpe aqua frigida perfundere: nonnunquam multam esse radiculam: deinde uomere.

De destillatione, ac grauedine.

Estillat autem humor ex capite interdum in nares: quod leue est. interdum in fauces: quod peius est. interdum et in pulmonem: quod pessimum est. Si in nares destillat: tenuis per has pituita profuit: capui leniter dolet: grauitas eius sentitur: frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces: has exasperat: tussiculam mouet. si in pulmonem: præter sternutamenta, & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, æstus, biliosa urina. Aliud autem quamuis non multum distans malum grauedo est. Hæc nares claudit: uocem obtundit: tussim siatim mouet: sub eadem salsa est salina: sonant aures: uenæ mouentur in capite: turbida urina est. Hæc omnia non uolens Hippocrates nominat. Nunc uideo apud grecos in grauedine hoc nomen seruari: destillationem uatasseros appellari. Hæc autem & breuius, & si neglecta sunt, longius esse consue-

Aurelij Cor.

g

LIBER

vunt. Nihil pestiferum est: nisi quod pulmonem exulcerauit. Vbi ali-
quid eiusmodi sensimus: protinus abstinere à sole, balneo, uino, uenere
debemus. Inter quæ unctione, & assueto cibo nihilominus uti licet. am-
bulatione tantum acris: sed tecta utendum est: & post eam caput, atq;
os supra quinquages perfricandum. Raroq; fit, ut si biduo, uel certe
triduo nobis temperauimus: id uitium non leuetur. Quo leuato, si in
destillatione crassa facta pituita est: uel in grauedine nares magis
patent: balneo utendum est: multaq; aqua prius calida, post egelida fo-
uendum os, caputq; deinde cum cibo pleniore uinum bibendum. At si
æque tenuis die quarto pituita est: uel nares æque clausæ uidentur:
assumendum est uinum amineu austerum: deinde rursus biduo aqua:
post quæ ad balneum, & ad consuetudinem reuertendum est. Neq;
tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt: expedit tan-
quam egros agere: sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt: præ-
terquam si diutius aliquem, & uehementius ista sollicitare consuerunt.
Huic enim quædam curiosior observatio necessaria est. Igitur huic si
in nares, uel in fauces destillauit: præterea quæ supra retuli: protinus
primis diebus multum ambulandum est: perfricandæ uehementer in-
feriores partes: leuior frictio adhibenda thoraci erit: leuior capiti. de-
menda assueto cibo pars dimidia: sumenda oua, amyllum: similiaq;
quæ pituitam faciunt crassiores. Siti quanta maxime sustineri potest,
pugnandum est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoq; usus
est: adijciendus est cibo pisciculus, aut caro: sic tamen ne protinus in-
stus modus cibi sumatur. uino meraco copiosius utendum est. At si in
pulmonem quoq; destillat: multoq; magis & ambulatione, & frictio-
ne opus est. eademq; adhibita ratione in cibis, si non satis illi profi-
ciunt: acrioribus utendum est. magis somno indulgendum: abstinen-
dumq; à negocijs omnibus. aliquando sed serius & balneum tentan-
dum. In grauedine autem primo die quiescere: neq; esse: neq; bibere:
caput uelare: fauces lana circumdare. postero die surgere. diu abstinere
à potione, aut si res coegerit: non ultra heminam aquæ assumere. Ter-
tio die panis non tam multum ex parte interiore cum pisciculo, uel
leni carne sumere: aqua bibere. Si quis sibi temperare non potuerit,
quo minus pleniore uictu utatur: uomere. Vbi in balneum uentum
est, multa aqua calida caput, & os fouere usq; ad sudorem. tum ad ui-
num redire. post quæ uix fieri potest, ut idem incommodum maneat:
sed si manserit, utendum erit cibis frigidis, aridis, leuibus, humore q̃
minimo: seruatis frictionibus, exercitationibusq; quæ in omni tali ge-
nere ualitudinis necessaria sunt.

Capite transitus ad cernicem est: quæ grauius admodum morbis obnoxia est. neq; tamen aliis importunior, acutiorq; morbus est: quam is qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis: modo mentu pectori annexit: modo rectam, et immobilem cernicem intendit. Priore græci ὀρθὸς ὄτορον, insequentem ἑμποσὸς ὄτορον, ultimū τέτατον appellant. quamvis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utantur. Ea sepe intra quartū diem tollunt. si hunc euaserunt: sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur: idq; conuenit. Sed Asclepiades utiq; mittendum sanguinem credidit. Quod quidam uitandum esse dixerunt: eo quod maxime tum corpus calore egeret: isq; esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neq; enim natura sanguinis est, ut utiq; caleat: sed ex his, quæ in homine sunt: hic calerrime uel calefacit: uel refrigescit. Mitti uero nec ne debeat, ex his intelligi potest: quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Vtiq; autem recte datur castoreum: & cum hoc piper, uel laser. Deinde opus est fomento humido, & calido. Itaq; pleriq; aqua calida multa cernices subinde perfundunt. id in præsentia lenat. sed cportuniores nervos frigori reddit. quod utiq; uitandum est. Vtilius igitur est cerato liquido primum cernicem perungere: deinde admoenere uestias, bubulas, uel utriculos oleo calido repletos, uel ex farina calidum cataplasma, uel piper rotundum cum fico contusum. Vtilissimum tamen est humido sale fouere. quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, admoenere ad ignem: uel si æstus est, in sole ægrum oportet, maximeq; oleo uetere: si id nō est, syriaco: si ne id quidem est, adipe quā uetustissima cernicem, & scapulas, & spinam perfricare. Frictio cum omnibus in homine uertebis utilis sit: cum is præcipue quæ in collo sunt. Ergo die, nocteq; interpositis tamen quibusdam temporibus hoc remedio utendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefactis. cauendum uero præcipue frigus. Idcoq; in eo conclauis, quo cubabit æger: ignis continuus esse debet: maximeq; tempore ante lucano: quo præcipue frigus intenditur. Neq; inutile erit caput attorsum habere: idq; irino, uel cyprino calido madefacere: & super imposito pilleo uelare. nonnunquam ē in calidum oleū totum descendere: uel in aquam calidam: in qua forum græcum decoctum sit: & adiecta olei pars tertia. Alius quoq; ducta sepe superiores partes resoluit. Si uero etiam uehementius dolor creuit: admoendæ cernicis uis curbitulae sunt sic, ut cutis incidatur: eadem aut frammentis, aut

LIBER

sinapi adurenda. Vbi leuatus est dolor, moueriq; cernix cepit, scire licet cedere remedijs morbum. Sed diu uitandus abus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum: itemq; ouis sorbilibus: aut à pullis mollibus ius aliquod assumendum. id si bene proæsserit: iamq; ex toto recte se habere cernices uidebuntur: incipiendum erit à pulcritudine, uel intrita bene madida. Celerius tamen etià panis mandendus, quam uinum gustandum. si quidem huius usus præcipue periculosus: ideoq; in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus: Et primum de angina, deinde de difficultate spirandi: ultimo de tussi. Caput. IIII.

T hoc autem morbi genus circæ totam tervicem, sic alteru
æque pestiferum, acutumq; in faucibus esse consuevit: no-
siri anginam uocant. apud græcos nomen prout species
est. Interdū enim neq; rubor, neq; tumor ullus apparet:
sed corpus aridum est: uix spiritus trahitur: membra soluuntur. id ου-
ράχιν uocant. Interdum lingua, faucesq; cum rubore intumescunt: uox
nihil significat. oculi uertuntur. facies pallet. singultusq; ē: id ουράχιν
uocatur. Illa communia sunt, æger non cibum deuorare: nō potionem
potest: spiritus eius includitur. Lenius est ubi tumor tantummodo
rubor est: cetera non sequuntur. id παραουράχιν appellant. Quic-
quid est, si uires patiuntur, sanguis mittendus est. si non abundat: se-
cundum est ducere aluum. Cucurbitula quoq; recte sub mento, et cir-
ca fauces admonetur: ut id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fo-
mentis humidis. nam sicā spiritum elidunt. Ergo admonere spon-
gas oportet: quæ melius in calidum oleum: quàm in calidam aquam
subinde demittuntur. Efficacissimusq; est hic quoq; salis calidi succus.
Tum commodum est: hyssopum, uel nepeta, uel thymum, uel absinthiū,
uel etiam furfures, aut ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere:
eāq; gargarizare. post hæc palatum ungere uel felle taurino, uel eo
medicamento, quod ex moris est. polline etiam piperis id recte resper-
gitur. si per hæc parum proficitur, ultimum est incidere satis altis
plagis sub ipsis maxillis supra collum, et in pallato citra unam uel
eas uenas, quæ sub lingua sunt: ut per ea uulnera morbus erumpat.
quibus si non fuerit. æger adiutus: scire licet malo uictum esse. si
uero his morbus leuatus est: iamq; fauces, et cibum, et spiritum ca-
piunt: facilis ad bonā salutē recursus est. Atq; interdum natura
quoq; adiunat: si ex angustiore sede uitium transit in latiorē. Itaq;
rubore, et tumore in præcordijs orto, scire licet fauces liberari.

Quicquid



Quicquid autem eas leuabit, incipiendum est ab humidis, maximeq; aqua mulsā decocta: deinde assumendi molles, et nō acres cibi sunt: donec fauces ad pristinū habitum reuertantur. Vulgo audio si quis pulum hirundinis ederit: angina toto anno non periclitari. seruatumq; eum ex sale cum is morbus urget: comburi, carbonemq; eius contritū in aquam mulsam: quæ potui datur: infricari, et prodesse. Id cum idoneos auctores ex populo habeat: neq; habere quicquam periculi possit, quanuis in monumentis medicorum non legerim: tamen inserendum huic operi meo credidi.

De difficultate spirandi.

St etiā circa fauces malum, quod apud græcos aliud, atq; aliud nomen habet: prout se intendit. Omne in difficultate spirandi cōsistit. Sed hæc dum modica est, neq; ex toto strangulat: *ὀρθόσπνοια* appellatur. Cum uehementior est, ut spirare æger sine sono, et anelatione non possit, *ὀρθόσπνοια*. Cū accessit id quoq; ne nisi recta cervice spiritus trahatur, *ὀρθόσπνοια*. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi. Duo in se quæntia acuta esse consuerunt. His communia sunt, quod propter angustias, per quas spiritus euadit: sibilum elidit: dolor in pectore, præcordijsq; est: interdum etiam scapulis: isq; modo decidit: modo reuertitur. ad hæc tussicula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet: in sanguinis detractiōe. Neq; id satis est: sed lacte quoq; ueter soluendus est. Liquanda aluus: interdum etiā ducenda. quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem et in lecto sublime habendum est. thorax fomentis, cataplasmatissq; calidis, aut siccis, aut etiam humidis ad inuandus est: et postea uel malagma super imponendū: uel certe ceratum ex cyprino, uel irino unguento. Sumenda deinde ieiuno potui mulsā aqua: cum qua uel hyssopus cocta, uel contrita capparidis radix sit. Datur et utiliter aut nitrum, aut nasturciū, frictum alliu, deinde contritū, et cum melle mixtum: simulq; coquatur mel, galbanū, resina terebinthina: et ubi coierunt ex his quod fabæ magnitudinē habet, cotidie sub lingua liquatur. aut sulphuris ignem nō experti, pondo et quadrans abrotani pondo in uini cyatho teruntur: idq; tepidum sorbetur. Est et non uana opinio uulpinū iecur, ubi sicum et aridum factum est: contundi oportere: polentamq; ex eo potioni aspergi: uel eiusdem pulmonē quā recentissimum assum, sed sine ferro coctum, edendū esse. Præter hæc sorbitionibus, et lenibus cibis utendū est. interdum uirgo tenui austero: nonnunquā uomitu. Profunt et quæcunq;

Aurelij Cor.

g iij

LIBER

urinae augent. sed nihil magis quam ambulatio lenta penè usq; ad lassitudinem, frictio multa praeipue inferiorum partium uel in sole, uel ad ignem, & per se ipsum, & per alios usq; ad sudorem. In interiore uero faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac pleriq; extrinsecus cataplasmatibus calidis, fomentisq; humidis utuntur. Volunt etiam uaporem calidum ore recipi: per quæ molliores alij pariter eas fieri dicunt: oportunioresq; uitio iam hærenti. Sed si bene scuitari morbus potest: tuta illa præsidia. si metus eius est, superuacua sunt. Vtiq; autem perficere fauces periculosum est. exulcerat enim. neq; utilia sunt quæ urinae mouendæ sunt apta: quia possunt, dum transeunt, ibi quoq; pituitam extenuare: quam suppressi melius est. Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoq; secuti sumus: author bonus, acetum ait quàm acerrimum esse sorbendum. Hoc enim sine ulla noxa comprimit ulcera. sed id suppressere sanguinem potest: ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei licium est: quod idem quoq; æque probat, uel porri, uel marrubij succus, uel nucis græcæ cum trachanto contrita, & cum passo mixta, uel lini semen contritum, & cum dulci uino mixtum. exercitatio quoq; ambulandi, currendiq; necessaria est. Frictio à pectore uehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi uero esse debent neq; nimium acres, neq; asperi: mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis quoq; caro, præcipueq; porrum, et quicquid cum hoc mixtum est. Potions quàm minimum esse conuenit. A qua dari potest, uel pura, uel in qua malum cydoneum, palmulæ uel decoctæ sunt. Gargarizationes quoq; lenes. sin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neq; acutum est: & potest esse non longum. curationem tamen maturam, ne uehementer, & diu lædat: desiderat.

De tussi.

Vssis uero ferè propter faucium exulcerationem molestus est: quæ multis modis contrahitur. Itaq; illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoq; male habere: & uix cum uetus facta est, eliditur. ac modo arida est: modo pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoq; die bibere. spiritum retento currere: sed minime in puluere, ac lectione uti uehementi. quæ primo impeditur à tussi, post eam uincit. tum ambulare: deinde per manus quoq; exerceri: & pectus diu perficere. Post hæc quàm pinguius sicus uncias tres supra primas incochas esse. Præter hæc si humida est, profunde frictiones ualidæ cum quibusdam calefacientibus sic, ut caput quoq; sicutum uehementer perficitur. Item cu-

arbitraria pectori admotæ. sinapi ex parte exteriori faucibus impositum: donec leuiter exulceret. potio ex menta, nucibusq; græcis, & amylo: primoq; assumptus panis aridus: deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum ea uehementissime urget: adiunat uini austeri cyathus assumptus: dum ne amplius id interposito tempore aliquo, quam ter, aut quater fiat. Item laseris quàm optimi paulum deuorare opus est: porri, uel marrubij succum assumere: scyllâ delingere: acetum ex ea uel certe acre sorbere: aut cum spica allij contriti duos uini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi est peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, natationes. Cibus interdum mollis, ut malua, ut urtica: interdum acer, ut lac cum allio coctum. sorbitiones quibus laser sit adiectum: aut in quibus porrum incoctum tabuerit: onum sorbile sulphure adiecto: potui primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus hæc, alijs uinû. Magis terri potest aliquis cum sanguine expuir. sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit enim modo ex ginguis, modo ex ore. & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere sine ganguarum ullo uitio: ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atq; interdum sanguis profuit: interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is à summis faucibus fertur: modo exulcerata ea pte, modo nõ exulcerata: sed aut ore uenæ alicuius ad aperto, aut tuberculis quibusdam natis ex his sanguine erumpente. quod ubi incidit, neq; lædit potio aut cibus: neq; quicquam aut ex ulcere excreatur. aliquando gutture, & arterijs exulceratis, frequens tussis sanguinem quoq; extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex iocanere feratur. sæpe foeminae quibus sanguis per menstrua non respondet: hunc expuunt: authoresq; medici fuerunt, uel exesa parte aliqua sanguinem exire: uel rupta, uel ore alicuius uene patefacto. Primâ διαίτην, secundam ἰσχυρὰν, tertiam ἀσθενήσαντιν appellant. ultima minime nocet. prima grauissime. Ac sæpe quidem euenit, uti sanguinem pus sequatur. interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad ualitudinē profuit. Sed si secuta ulcera sunt: si pus, si tussis est, pro ut sedes ipsa est: ita uaria, et periculosa genera morborum sunt. Si uero sanguis tantum fluit: ex peditius, & remedium, & finis est. Neq; ignorari oportet eis, quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæ uel, aut post cursum uehementem, uel ambulationem: dum felix absit: nõ esse inutile sanguinis mediocri profluvium. idq; per urinam redditum ipsam quoq; lassitudinem solucere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decedit. si tamen in eius urina nihil nonabit. Neq;

uomitum huius afferre periculum etiā cum repetit, si ante confir-
 re & implere corpus licuit: & ex toto nullū nocere: qui in corpore
 robusto neq; nimius est: neq; tussim, aut calorem mouet. Hæc pertinent
 ad uniuersum. Nunc ad ea loca, quæ proposui, ueniam. Si ex gingiuis
 exit, portulacam manducasse satis est. si ex ore, continuasse eo merum
 uinum. si parum id proficit, acetum. si inter hæc quoq; grauiter erum-
 pit, quia consumere hominem potest: commodissimum est: impetum eius
 admota occipitio cucurbitula sic, ut cutis quoq; incidatur: auertere. Si
 id mulieri cui menstrua non feruntur, euenit: eandem cucurbitulam
 incisis inguinibus eius admonere. At si ex faucibus, interioribus ue-
 partibus processit, & metus maior est: et cura maior adhibenda. san-
 guis mittendus est: & si nihilominus ex ore processit, iterum, tertioq;
 & cotidie paulum aliquid: protinus autem debet sorbere uel acetum,
 uel etiam cum thure plantaginis, aut porri succum. imponendaq; ex-
 trinsecus supra id quod dolet, lana succida ex aceto est: & id spongia
 subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoq; et femora,
 brachiaq; pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo nō prodesse,
 ut etiam inimicum esset: proposuit. Sed id sæpe commode respondere
 experimenta testantur. Neq; tamen pluribus locis deligari necesse est.
 sed sat est infra inguina, & super talos, summosq; humeros, etiam
 brachia. Tum si febris urget, danda est sorbitio et potui aqua: in qua
 aliquid ex his, quæ aluum astringunt: decoctum sit. at si abest febris,
 uel elota alia, uel panis ex aqua frigida, & mole quoq; ouum dari
 potest potui: uel idem quod supra scriptum est: uel uinum dulce, uel
 aqua frigida: sed sic bibendum erit, ut sciamus huic morbo sitim pro-
 desse. præter hæc necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput hu-
 ius quoq; cubātis sublime esse debet: recteq; tondetur. Facies sæpe aqua
 frigida fouenda est. At inimica sunt uinum, balneum, uenus. in cibo
 oleum, acrida omnia. item calida fomenta. conclaue calidum, & inclu-
 sum. multa uestimenta corpori iniecta. etiam fricationes ubi bene etiā
 sanguis conquieuit. Tum uero incipiendum est à brachijs, cruribusq;
 à thorace abstinendum. In hoc casu per hyemem locis maritimis, per
 æstatem mediterraneis opus est.

De stomachi morbis, & curationibus. Caput. V.

f Aucibus subest stomachus: in quo plura longa uitia inci-
 dere consueverunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio
 hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit. Inter-
 dum pituita, interdum bilis oritur. frequentissimumq;
 est eius

est eius malum quo resoluitur: neque ulla re magis aut afficitur: aut corpus afficit. Vt diuersa autem uitia eius, sic etiam remedia sunt. Vbi exæstuat, aceto cum rosa extrinsecus subinde fouendus est. imponendusque puluis cum oleo, et ea cataplasmata, quæ simul et reprimunt: et molliunt. Potui, nisi quid obstat: gelida aqua præstanda. Si inflatio est, prosunt admotæ cucurbitulæ: neque incidere autem necesse est. prosunt siacæ, et calida fomenta, sed non uehementissima. Interponenda abstinentia est. Vtilis in ieiunio potio est absinthij, aut hyssopi, aut rutæ. Exercitatio primo lenis, deinde maior adhibenda est: maximeque quæ superiores partes moueat. quod genus in omnibus stomachi uitij aptissimum est. Post exercitationem opus est unctione, frictione: balneo quoque nonnunquam, sed rarius: interdum alui ductione. Cibis deinde calidis, neque inflatibus. eodemque modo calidis potionibus: primo aquæ: post ubi resedit inflatio: uini austeri. illud quoque in omnibus stomachi uitij præcipiendum est, ut quo modo se quisque æger refecerit: eo ut sanus utatur. Nam redit huic imbecillitas sua: nisi hisdem defendatur bona ualeitudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est: quæ ferè tumor, et dolor sequitur: prima sunt quies, et abstinentia. lana sulphurata circumdata: in ieiunio absinthium. si ardor stomachum urget, aceto cum rosa subinde fouendus est: deinde cibis quidem utendus est modicis. Imponenda uero extrinsecus quæ simul et reprimunt: et molliunt. deinde his detractis utendum calidis ex farina cataplasmatibus: quæ reliquas digerant. Interdum aluius ducenda. Adhibenda exercitatio, et cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues, et glutinosi cibi, sed citra sacietatem. Omnia acria, atque acida remouenda. Vino, si febris non est, dulci: aut si id inflat, certe leni utendum, sed neque præfrigido, neque nimis calido. si uero pituita stomachus impletur: necessarius modo in ieiunio, modo post cibum uomitus est. Vtilis exercitatio, gestatio, nauigatio, frictio. Nihil edendum, bibendumque: nisi calidum: uitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consuerunt. Molestus est: si stomachus bile uitiosus est. Solent autem hi qui sic tentantur: interpositis quibusdam diebus hanc, et quidem quod pessimum est, atram mouere. His recte aluius ducitur. potiones absinthio dantur. necessaria gestatio nauigatio est, si fieri potest ex nausea uomitus. uitanda cruditas. sumendi cibi faciles, et stomacho non alieni. uinum austerum. Vulgatissimum uero, pessimumque stomachi uitium est resolutio: id est cum cibi non tenax est: soletque desinere ali corpus: ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones exercitatio=

LIBER

ionesq; superioris partis necessariae. Itē unctiones, frictionesq; his per-
fundi frigida, atq; in eadem nature: canalibus eiusdem subijcere etiam
stomachū ipsum, et magis etiam à scapulis, id quod contra stomachū
est. Consistere in frigidis, medijs capitisq; fontibus quales cutiliarū, sym-
bruiarumq; sunt: salutare est. Cibi quoq; assumendi sunt frigidi: qui
potius difficulter coquantur: quàm facile uariantur. Ergo pleriq; qui
nihil aliud concoquere possunt: bubulam coquunt. Ex quo colligi po-
test, neq; auem, neq; uenationem, neq; piscem dari debere: nisi generis
durioris. Potui quidem aptissimum est uinum frigidum, uel certe bene
calidum meracum: potissimum rhetoricum, uel allobrogicum: aliud ue-
quod et austerum, et resina conditum est. si id non est: quàm asper-
rimum, maximūq; signinum. Si cibus non continetur, danda aqua: et
eliciendus plenior uomitus est: iterumq; dandus cibus, et tum admo-
uendae duobus intra stomachum digitis cucurbitulae: ibiq; duabus, aut
tribus horis continendae sunt. Si simul et uomitus, et dolor est, im-
ponenda supra stomachum est lana succida, uel sponsa ex aceto, uel
cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda uero non diu, sed uehemen-
ter brachia, et crura: et calefacienda. Si plus doloris est, infra prae-
cordia quatuor digitis cucurbitula utendum est: protinus dandus pa-
nis ex posca frigida. Si non continuit: post uomitum lene aliquid ex
his, quae non aliena stomacho sint. Si ne id quidem tenuit: singuli cya-
thi uini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens
etiam medicamentum est radiculae suauis, ualencius acidi punici mali
compari modo succi, qui ex dulci punico malo est: adiecto etiam intu-
bi succo, et menta: sed huius minima parte: quibus tantundem quan-
tum in his omnibus est aquae frigidae, quàm optime miscetur. Id enim
plus quàm uinum ad comprimendum stomachum potest. Supprimen-
dus autem uomitus est, qui per se uenit sic, si nausea est. Sed si coacuit
intus, cibus aut computruit: quorum utrumlibet ructus ostendit: eijcē-
dus est: protinusq; cibus assumptis hisdem, quos proxime posui: stoma-
chus restituendus. Vbi sublatas est praesens metus, ad ea redeundum
est: quae supra praecepta sunt.

De laterum doloribus. Caput. VI.

Stomachus lateribus angitur: atq; in his quoq; uehemen-
tes dolores esse consueverunt. et initium uel ex frigore, uel
ex ictu, uel ex nimio cursu, uel ex morbo est. Sed interdū
ne malum intra dolorem est: isq; modo tarde, modo cele-
riter soluitur. interdum ad perniciem quoq; procedit. oriturq; acu-

tus morbus, qui *anapitinos* à grecis nominatur. Huic dolori lateris
 febris, & tussis accedit. & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus
 est: pituita si grauis sanguis. Interdum etiam siata tussis est: quæ nihil
 emollitur. idq; primo uitio grauius: secundo tolerabilius est. Remediũ
 uero est magni, & recentis doloris sanguis missus. At siue lenior, siue
 uetustior casus est: uel superuacuum, uel serum id auxilium est. con=
 fugendũq; ad cucurbitulas est, ante summa cute inisa. Recte et sina=
 pi ex aceto super pectus imponitur: donec ulcera, pustulasq; excitet:
 & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc circun=
 dare primum oportet latus absolanæ sulphuratæ. deinde cum pau=
 lum inflammatio se remittit: siatis, & calidis fomentis uti. Ab his trã=
 situs ad malagmata est. Si uetustior dolor remanet: nouissime resina
 imposita discutitur. Utendum cibis, potionibusq; calidis. uitandum fri=
 gus. Inter hæc tamen non alienum & extremas partes oleo, & sul=
 phure perficere. Si leuata tussis est: leni lectione uti. iamq; & acres
 cibos, & uinum meracius assumere. quæ à medicis præcipiuntur: ut
 tamen sine his rusticos nostros epotæ ex aqua herba trixago satis ad=
 iuuat. Hæc in omni lateris dolore communia sunt. plus negocij est, si
 acutus quoq; morbus is factus est. In hoc præter ea quæ supra posita
 sunt, hæc animaduertenda sunt, ut cibus sit quàm maxime tenuis, &
 lenis, præcipueq; sorbitio: eaq; ex ptisana potissimum, aut ius in quo
 porrus cum pullo gallinæ coctus sit. Idq; non nisi tertio quoq; die
 detur: si tamen per uires licebit. potui uero aqua mulsa, in qua hyssopum,
 aut ruta decocta sit. quæ quibus temporibus danda sint: ex ra=
 tione uel adiectæ, uel leuatiæ febris apparebit sic, ut in remissione
 quàm maxima dent: cum eo tamen, ut sciamus non esse eius generis
 tussi aridas fauces committendas. sæpe enim ubi nihil est quod excrea=
 tur: continetur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam prius
 id genus esse tussis: quod nihil, quàm quod pituitam moueret. Sed hic
 uinum sorbere, ut supra præcepimus: morbus ipse non patitur. inui=
 cem eius cremor ptisanæ sumendus est. Ut his autem in ipso morbi fer=
 uore sustinendus aeger est: sic ubi paulum is se remittit: alimenta plenio=
 ra, & uini quoq; aliquid dari potest. dum nihil detur, quod aut refri=
 geret corpus, aut fauces asperet. Si in refectione quoq; manserit tussis,
 intermittere oportebit uno die: posteroq; cum cibo uini paulo plus assu=
 mere. atq; in incipiente quoq; tussi tum non erit alienum, ut supra quoq;
 posuitur est: uini cyathos sorbere. Sed in hoc genere ualitudinis dul=
 ce, uel certe lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico uictus
 corpus firmandum est.

De uiscerum morbis: Et primo de pulmone, deinde de iocinere, tum de liene, postremo de renibus. Caput. VII.

Compagne uero corporis ad uiscera transeundū est: Et
 a in primis ad pulmonem ueniendum: ex quo uehemens
 Et acutus morbus oritur, quem περιπνευμονιὸν græci
 uocant. eius hæc conditio est. Pulmo totus afficitur. hunc
 eius casum subsequitur tussis: bilem, uel pus trahens: præcordiorū, to-
 tiusq; pectoris grauitas: spiritus difficultas, magnæ febres, continua ui-
 gilia, cibi fistidium, tabes. Id genus morbi plus periculi, quàm doloris
 habet. Oportet si satis ualidæ uires sunt, sanguinem mittere: si mino-
 res, cucurbitulas sine ferro præcordijs admoouere. Tum si satis ualet,
 gestando ægrum digerere: si parum, intra domum tamen dimouere.
 Potionem autem hyssopi dare, cui ficus arida sit incotta: aut aquam
 mulsam, in qua uel hyssopum, uel ruta deacta sit. Frictione uti diu-
 tissime in scapulis: proxime ab his in brachijs, Et pedibus, Et cruri-
 bus, leuiter contra pulmonem. idq; bis cotidie facere. Quod ad cibum
 uero pertinet: huic nec salsis opus est, neq; acris, neq; amaris, neq;
 alium astringentibus: sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus dan-
 da est sorbitio ptisanæ, uel alicæ, uel orizæ: cum qua recens adeps co-
 cta sit. Cū hac sorbile ouum, nuclei pinei ex melle. panis, uel elota ali-
 cæ ex aqua mulsa. potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mul-
 sa egelida, aut si æstas est, etiam frigida: nisi quid obstat. hæc autem
 altero quoq; die incrementa morbo dare satis est. Vbi incremento
 constitit quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est: præter-
 quam aqua egelida. Si uires desunt, adiuuandæ sunt aqua mulsa.
 profuntq; aduersus dolores imposita calida fomenta, uel ea quæ si-
 mul Et reprimunt, Et emolliunt. Prodest impositus super pectus sal
 bene contritus, cum cerato mixtus, quia leuiter cutem erodit: eoq; im-
 petum materiæ, quo pulmo uexatur: euocat. Vtile etiam aliquod ma-
 lagma est ex his, quæ materiam trahunt. Neq; alienum est dum pre-
 mit morbus, clausis fenestris ægrum continere. Vbi paulum leuatus
 est, ter, aut quater die fenestris aliquanto apertis paruum aërem re-
 cipere. Deinde in refectioe pluribus diebus à uino al sinere. gestatio-
 ne, frictione uti. sorbitionibus, Et prioribus cibis adijcere ex oleribus
 porrum, ex carne ungulas, Et summa trunculorum, atq; pisciculos
 sic, ut diu nihil molle, Et lene sumatur.

Alietius quoque visceris morbus id est iocineris æque modo longus, modo acutus esse consuevit: ἢ τῶν τῶν γὰρ ἡ γὰρ ἡ γὰρ. Dextra parte sub præcordijs uehemens dolor est. idemque ad latus dextrum, & ad iugulum, humerumque partis eiusdem peruenit. nonnunquam manus quoque dextra torquetur. horror calidus est. Vbi male est, bilis euomitur. interdum singulas propè strangulat. & hæc quidem acuti morbi sunt. Longioris uero ubi suppuratio in iocinere est: dolorque modo finitur: modo intenditur: dextra parte præcordia dura sunt: & tument. post cibum maior difficultas est. accedit maxillarum quedam resolutio. ubi inueterauit malum, uenter et crura, pedesque intumescunt: pectus, atque humeri, circaque iugulum utrumque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est. tum uenter soluedus est: si non potest aliter, per nigrum ueratrum imponenda extrinsecus cataplasinata, primum quæ reprimant: deinde calida, quæ deducant. quibus recte iris, uel absinthium adijciunt: post hæc malagma. Dandæ uero sorbitiones sunt: omnesque cibi, & calidi, & qui non multum alant: & ferè qui pulmonis quoque dolori conueniunt: præterque eos, qui urinam mouent: potionesque ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thymum, satyria, hyssopum, nepeta, amyllum, sisannum, lauri baccæ, pini flos, herba sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, columbae iecur recens, & crudum. Ex quibus quedam per se esse, quedam adijcere uel sorbitioni, uel potioni licet: sic tamen ut parce assumentur. Neque alienum est absinthium contritum ex melle, et pipere: eiusque catapotium cotidie deuorare. abstinendum utique est ab omnibus frigidis: neque enim res ulla magis iecur lædit. Frictionibus utendum in extremis partibus. uitandus omnis labor: omnis uehementior motus. ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, ictus, cursus inimici sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est, calida: si æstas, tepida. Item liberalis unctio: & in balneo sudor. Si uero iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppuracionibus. Quidam etiam contra id scalpello aperiunt: ipsam uomicam adurunt.

De lienis morbo, & curatione. Caput. IX.

Alien is ubi affectus est, intumescit: simulque cum eo pars sinistra, eaque dura est: & prementi renititur: uenter intentus est: aliquis etiam cruribus tumor est. Vlcera aut omnino nõ

sanesunt: aut certe cicatricem uix recipiunt. In intentā ambulatione, cursuq; dolor, et quaedam difficultas est. hoc uitium quies auget. Itaq; exercitatione, et labore opus est: habita tamen ratione ne febre mixta si numum processerit, excitetur. Vnctiones, frictionesq; et sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt. item lac, et caseus. Acida autem maxime conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, et magis etiam quod scylla conditum est: expedit. Edenda sunt salsamenta, uel olea ex muria dura: tincta in aceto lactucae, intubiq; et betae ex eodem. ex sinapi asparagus, armoracia, pashnata, ungula, rostra, aues macrae, eiusdem generis uenatio. Potui uero ieiuno dari debet ab sinthium incoctum. at post cibum aqua a ferrario fabro: in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Haec enim uel praecipue lienem cohercet: quod animaduersum est in his animalibus: quae apud hos fibros educata, exiguos lienes habent. potest etiam dari uinum tenue, austerrum: omniaq; in abis, et potionibus, quae urinae mouenda sunt: praecipueq; ad id ualet uel trifolij seminem, uel cuminum, uel apium, uel serpillum, uel citrus, uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hyssopum, uel satureia. haec enim inde commodissime uidentur humorem deducere. Lienis quoq; bubulus utiliter esui datur: praecipueq; eruca, et nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoq; extrinsecus sunt quae leuent. Fit ex unguento, et palmulis, quod μωροσάλας uel graeci uocant. Fit ex lini, et nasturtij semine, quo uinum, et oleum adiungitur. fit ex cupresso uiride, et arida ficu. fit ex sinapi, cui seui hircini a renibus quarta pars ponderis adiungitur: teriturq; in sale, et protinus imponitur. Multisq; modis huic rei capparum aptum est. Nam et ipsum cum cibo assumere, et muriam eius cum aceto sorbere, commodum est. Quin et extrinsecus radicem contritam, uel corticem eius cum suffuribus, aut ipsum capparum cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoq; huic rei aptantur.

De renum morbis, et curationibus. Caput. X.

RENES ubi affecti sunt: diu male habent. Peius est si frequens biliosus uomitus accedit. Oportet conuiescere: cubare molliter: soluere aluum. si aliter non respondet, etiam ducere. Saepes desiderare in aqua calida: neq; aluum, neq; potionem frigidam assumere. abstinere ab omni uis salis, acerbis, acidis pomis: bibere liberaliter: adijcere modo cibo, modo potioni piper, porrum, ferula, album papauer: quae maxime inde urinam mouere consueverunt. Auxilio quoq; his exulceratis sunt, si adhuc ulcera purgenda

caner si bentes aqua
a qua labor fenam
ignis ferri utingat
habent lieno parum

sunt: cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex pinis siluestri duodecim, anisi quod tribus digitis sumi possit: croci paulū, cōtrita et in duas mulsas potiones diuisa. Si uero dolor tantū leuādus est: eiusdē cucumeris semina triginta, ydē nuclei uiginti, nūces græce quiq; croci paululū, contrita, et cū lacte potui data. At sup̄ quoq; recte quædā malagmata iniiciuntur: maximeq; ea quæ humori extrahendo sunt.

De intestinorum morbis, & primo de cholera. Caput. XI.

Visceribus ad intestina ueniēdum est: quæ sunt et acutis,
 a & longis morbis obnoxia. Primo æque faciēda mentio est cholerae: quia cōe id stomachi, atq; intestinorum uitiū uideri potest. Nam simul & deiectio, & uomitus est: præterq; hæc inflatio est: intestina torquentur: bilis supra, infraq; erumpit: primum aquæ similis: deinde ut in ea recens atro lota esse uideatur: interdum alba: non uinquam nigra, uel uaria. Ergo eo nomine morbi hunc *Χόλερα* græci nominarunt. præter ea uero, quæ supra cōprehensa sunt: sepe et crura, manusq; contrahuntur: urget sitis: anima deficit: quibus concurrentibus non mirū est, si subito quis moritur: neq; tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo ubi ista coeperunt: aquæ tepidæ quā plurimum bibere oportet: et uomere. Vix unquam sine uomitu sequitur, sed et si non incidit: misuisse tamē nouam materiā corruptæ prodest: parsq; sanitatis est uomitum esse suppressum. si id incidit: protinus ab omni potione abstinendum est. Si uero tormina sunt: oportet frigidis, & humidis fomentis stomachum fouere: uel si uenter dolet: hisdem egelidis sic, ut uenter ipse mediocriter calentibus inuētur. Quod si uehementer et uomitus, & deiectio, et sitis uexant: & adhuc subcruda sunt, quæ uomuntur: nondū uino maturum tempus est. Aqua, neq; ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. admoendumq; naribus est puleiū ex aceto: uel polenta uino aspersa: uel menta secundū naturam est. At cū discussa cruditas est: tum magis uerendū est, ne anima deficit. Ergo tum confugēdum est ad uinū. id esse oportet tenuē, odoratū, cū aqua frigida mixtum: uel polenta adiecta, uel melle quoq; assumere expedit: quotiensq; aliquid aut stomachus, aut uenter effudit: totiens p̄ hæc uires restituere. Erasistratus primo tribus uini guttis, aut quibus aspergendam potionem esse dixit: deinde paulatim merū adiiciendū. Is si et ab initio uinū dedit: et merū cruditatis secutus est: non sine causa fecit. Si uehementē infirmitatē adiuari posse tribus guttis putauit: errauit. At si inanis est homo: et crura eius contrahuntur: interponēda potio absintq; est.

LIBER.

Si extremæ partes corporis frigent, unguendæ sunt calido oleo: cui ceræ paulum sit adiectum: calidisq; fomentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra uentriculum ipsum cucurbitula admonenda est: aut sinapi super imponendum. Vbi is constitit, dormire oportet. postero die utiq; à potione abstinere. die tertio in balneum ire. paulatim se cibo reficere: somno: quisquis facile acquiescit. itemq; lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est. tum cibus, uinoq; utendum est. sed hic quidem morbus & acutus est: & inter intestina, stomachumq; uersatur sic, ut cuius potissimum partis sit: non facile dici possit.

De cæliaco uentriculi morbo. Caput. XII.

i N ipso uero uentriculi porta consistit is, qui & longus esse consuevit: uoiaiauds à græcis nominatur. Sub hoc uenter indurescit: dolorq; eius est. Aluus nihil reddit: ac ne spiritum quidem transmittit. extremæ partes frigescent. difficulter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toto uentri imponere, ut dolorem leniant. post cibum uomere: atq; ita uentrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro uentri, et coxis admoouere. Ventrem ipsum liquare dato lacte, & uino salso, frigido. Si tempus anni patitur, etiam uiridibus ficis: sic tamen ne quis aut cibus, aut humor uniuersus detur: sed paulatim. Ergo per interualla temporis sat est cyathos binos, ternos uel sumere: et cibum pro portione huius. commodèq; facit cyathos lactis, cyathus aquæ mixtus, et sic datus. Cibiq; instantes, & acres uiliores sunt: adeo ut lacti quoq; recte contritum allium adiciatur. Procedente uero tempore opus est gestari: maximèq; nauigare: perficari ter, aut quater die sic, ut nitrum oleo misceatur: perfundi aqua calida post cibum: deinde sinapi imponere per omnia membra excepto capite, donec arrodatur: & rubeat: maximèq; si corpus durum, & uirile est. paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ uentrem compriment. Assa cæro danda, ualens, & quæ non facile corrumpatur. potui uero pluuiæ aqua decocta: sed quæ per binos, ternos uel cyathos bibatur. Si uetus uitium est, oportet laser quàm optimum ad piperis magnitudinem deuorare. altero quoq; die uinum, uel aquam bibere: interdum interposito cibo singulos uini cyathos sorbere: ex inferiori parte infundere pluuialem egelidam aquam: maximèq; si dolor in uenis partibus remanet.

De tenuioris

i Nter ipsa uero intestina consistunt duo morbi: quorum al-
ter in tenuiore, alter in pleniore intestino est. Prior acutus
est. insequens esse locus potest. Diocles Carystus tenuioris
intestini morbum $\chi\omicron\rho\sigma\alpha\tau\omicron\rho$, plenioris $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\nu$ nominauit.

A plerisque uideo nunc illū priorem $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\nu$, hūc $\kappa\omega\lambda\iota\kappa\omicron\nu$ nominari. Sed
prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem mouet.
Fit ex alterutro loco inflammatio: nec aluus, nec spiritus infra transmi-
titur. si superior pars affecta est, aluus: si inferior stercus per os red-
ditur. si utrunlibet uetus est, adiungitur periculo uomitus biliosus mali o-
dis, aut uariis, aut niger. Remedium est sanguinem mittere: uel cucur-
bitulas pluribus locis admoovere, non ubique cute incisa. Id enim duobus,
aut tribus locis satis est. Ex ceteris spiritum euocare abunde est. Tum
animaduertere oportet, quo loco malum sit. solet enim contra id tu-
mere. Et si supra umbilicum est, alui ductio utilis non est. Si infra est:
aluus, ducere, ut Erasistrato placuit: optimum est. Et sepe id auxi-
lij satis est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore cum oleo, et
melle sic, ut præter ea nihil adijciatur. Si nihil timet, duas manus im-
ponere oportet supra summum uentrem: paulatimque deducere. Inue-
nietur enim mali locus, qui necesse est, renitatur: et ex eodem delibe-
rari poterit ducenda nec ne aluus sit. Illa communia sunt, calida cat-
aplasmata admoovere: eaque imponere à mammis usque ad inguina et
spinam: ac sepe mutare: brachia, cruraque perficere: demittere totum
hominem in calido oleo. Si dolor non quiescit, etiam in aluum ex par-
te inferiore tres, aut quattuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc
consecuti sumus ut iam ex inferiore parte spiritus transmittatur: offer-
re potui mulsum tepidum non multum. nam ante magna cura uitan-
dum est, ne quid bibat. si id commode assu: adijcere sorbitionem. Vbi
dolor, et febricula quierunt: tum demum uti cibo pleniore: sed neque
instante, neque duro, neque ualido: ne intestina adhuc imbecilla ledan-
tur. potui uero nihil præterquam puram aquam. nam siue quid ui-
olentum, siue acidum est: id huic morbo alienum est. Ac postea quoque
uitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, ceterosque corpo-
ris motus. Nam facile id malum redire consuevit: et siue cum fri-
gus subit: siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, re-
uertitur.

Aurelij Cor.

h

S autem morbus, qui in intestino plenior est: in ea maxi-
 me parte est: quam certam esse proposui. Vehemens infla-
 tio, uehementes dolores dextra magis parte, intestinum
 quod uerti uidetur, propè spiritum elidit. In plerisq; post
 frigora, cruditatesq; oritur: deinde quiescit: & per ætatem sæpe repe-
 tens sic cruciat, ut uitæ spacio nihil demat. Vbi is dolor cœpit, admo-
 uere siat, & calida fomenta oportet: sed primo lenta, deinde uali-
 diora: simulq; frictiones. ad extremas partes id est crura, brachiaq;
 materiam reuocare. Si discussum non est: qua dolet cucurbitulas sine
 ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum,
 quod *κωλινδν* nominatur. id se repperisse Cassius gloriabatur. Ma-
 gis prodest potui datum. sed impositum quoq; extrinsecus digerendo
 spiritum, dolorē leuat. nisi finito uero tormento, recte neq; abus, neq; po-
 tio assumitur. Quo uictu sit utendum qui hoc genere tentantur: iam
 mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod *κωλινδν* nominatur: ex
 his constat. Costi, anesi, castorei singulorū Pondo denariorū triū. petro-
 selini. P. denariorum. III. piperis longi, et rotundi singulorū. P. .II.
 papaueris lachrymæ, iunci rotundi, myrræ, nardi singularū. P. VI.
 quæ melle excipiuntur. id autem & deuorari potest: & ex aqua ca-
 lida sumi.

De torminibus, id est dysenteria. Caput. XV.

*P*roxima his inter intestinorū mala, tormina esse consue-
 uerunt: *δυσεντερία* græce uocatur. intus intestina exul-
 cerantur. ex his cruor manat. Isq; modo cum stercore
 aliquo semper liquido, modo cum quibusdā quasi nuc-
 cosis excernitur. interdum simul quædam carnosæ descendunt. Fre-
 quens deijcendi cupiditas, dolorq; in ano est. Cum eodem dolore exi-
 gnum aliquid emittitur. atq; eo quoq; tormentum intenditur. idq; post
 tempus aliquod leuatur. exiguaq; requies est. somnus interpellatur. fe-
 bricula oritur. longaq; tempore id malū cum inueterauerit, aut tollit
 hominem: aut etiam si finitur, excruciat. Oportet in primis conque-
 scere. si quidem omnis agitatio exulcerat. deinde ieiunū sorbere uini
 cyathum: cui contrita radix quinq; folij sit adiecta. imponere cati-
 plasmatæ super uentrem, quæ reprimunt. quod in superioribus uen-
 tris morbis non expedit. quotiensq; desidit, subluere aqua calida: in
 qua decoctæ uerbene sint. portulacæ uel coctam, uel ex dura muria
 edisse. cibos, potionesq; eas, quæ astringūt alui. Si uenustior morbus est,

ex inferioribus ptibus tepidū infundere uel ptisanæ cremorē, uel lac,
uel adipem liquatam, uel medullā cernuinā, uel oleum, uel cum rosa
buthirum, uel cum eadē album crudum ex ouis, uel aquam: in qua
lini semen decoctum sit: uel si somnus non accedit, uitellos cum aqua,
in qua rosæ floris folia cocta sint. Leuant enim dolorē hæc, & mitio-
ra ulcera efficiunt: maximēq; utilia sunt, si cibi quoq; secutiū fustidiū
est. Themijon muria dura quā asperrima sic utendū mōrie prodi-
dit. Cibi uero esse debent, qui leniter uentrem destringant: & ea quæ
urinam mouent. si ea consecuta sunt, in aliā partem humorē auerten-
do prosunt. si non sunt cōsecuta, noxam augent. itaq; nisi in quibus
prompte id facere consuerunt, non sunt adhibenda. Potui, si febricula
est: aqua pura calida, uel ea, quæ ipsa quoq; astringit: dari debet. si
non est: uinum lene austerū. si pluribus diebus nihil remedia alia in-
uerunt, uetusq; iam uitium est: aquæ bene frigide potio assumptæ
ulcera astringit: & initium secundæ ualeitudinis facit. sed ubi uenter
suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est. Solet
autem interdum etiam putris sanies, pessimiq; odoris descendere. solet
purus sanguis profluere. si superius uitium est, aluus aqua mulsā duci
debet: tunc deinde eadem infundi, quæ supra cōprehensa sunt. Va-
lensq; est etiam aduersus ulcera intestinorum minij gleba, cum salis
hemina contrita. si minus, mixta his aqua in aluum datur. Ac si san-
guis profluit, cibi, potionesq; esse debent, quæ astringant.

De leuitate intestinorum. Caput. XVI.

X torminibus interdum intestinorū leuitas oritur: quæ conti-
nere nihil possunt: & quicquid assumptum est, imperfectū
protinus reddunt. id interdum ægros trahit: interdum præ-
cipitat. In hoc utiq; adhibere oportet comprimētia: quo facilius tenen-
di aliquid intestinis uis sit. Ergo et super pectus ponetur sinapi: exul-
ceratq; cute malagma, quod humorē euocat: & ex uerbenis decoctis
aqua desidat: & cibos, potionesq; assumat, quæ aluum astringunt: &
frigidis utetur perfusionibus. Oportet tamen prospicere ne simul his
omnibus admotis, uitium contrariū per immodicās inflationes oria-
tur. Iaculatim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus cottidie adie-
ctis. Et cum in omni fluore uentris, tum in hoc præcipue necessariū
est: non quoties libet desidere, sed quotiens necesse est: ut hæc ipsa mora
in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoq;
quod æque ad omnes similes affectus ptinet, in hoc maxime seruandū
est, ut cum pleraq; utilia insuauia sint, qualis est plantago, et rubi,

Aurelij Cor.

h ij

LIBER

et quicquid mali corio mixtum est: ea potissimum ex his dentur, quæ maxime æger uolet. Deinde si omnia ista fastidiet ad exatandam cibi cupiditatem, interponatur aliquid minus utile: sed magis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoque morbo necessariae sunt: & cum his sol, ignis, balneum, uomitus ut Hippocrati uisum est: etiam albo ueratro, si cætera parum proficiunt: euocatus.

De lumbricis aluum occupantibus. Caput. XVII.

Nonnunquam autem lumbrici quoque occupant aluum: hique modo ex inferioribus partibus: modo sæpius ore redduntur. Atque interdum latos eos, qui peiores sunt: interdum teretes uidemus. si lati sunt, aqua potui dari debet: in qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit: aut cui adiectum sit contritum uel hyssopum, uel piperis acetabulum, uel scamoneæ paulum. uel etiam pridie cum multum allium ediderit: uomat. Posteroque die mali punici tenues radicales colligat, quantum manu comprehendet: easque contusas, in aquæ tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adiciat nitri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potiones sumat: aut aquæ, uel muriæ duræ sic adiectæ. tum desidet subiecta calida aqua in pelue. si uero teretes sunt, qui pueros maxime exercent: & eadem dari possunt, & quedam leniora, ut contritum semen urticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, uel menta cum eadem, uel absinthium decoctum, uel hyssopum ex aqua mulsæ, uel nasturcij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, & allium prodest: uel in aluum oleum subter dedisse.

De tenasmo intestinorum morbo. Caput. XVIII.

Est autem aliud lenius omnibus proximis, de quibus super dictum est: quod τειρομορ greci uocant. id neque acutis, neque longis morbis annumerari debet: cum & facile tollatur: neque unquam per se iugulet. in hoc æque, atque in torminibus frequens, desidendi cupiditas est: æque dolor ubi aliquid excernitur. descendunt autem pituitæ, mucosque similia: interdum etiam leniter subruentia. sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque recte coacta. desiderare oportet in aqua calida: sæpiusque ipsum manu nutrire: cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, acacia ex aceto liquata, emplastrum id, quod τετραρχαμαχοι greci uocant: rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & ita appositum: eademque ex inferiore

ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, eadem uerbe-
na decoctæ, ut inferiores partes foueantur: alternis uero diebus aqua,
alternis leue, & austerum uinum bibendum est. Potio esse debet ege-
lida, & frigida. proprior ratio uictus talis, qualem in tormina su-
pra præcepimus.

De uentris fluxu, & curatione. Caput. XIX.

Euior etiam dum recens deiectio est, ubi & liquida aluus,
& sæpius, quàm ex consuetudine fertur. atq; interdum tole-
rabilis dolor est: interdum grauissimus: idq; peius est. sed uno
die fluere aluum sæpe pro ualitudine est, atq; etiam pluribus: dum fe-
bris absit, & intra septimum diem id conquiescat. purgatur enim cor-
pus: & quod intus læsum erat, utiliter effunditur. uerum spatium
periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas excitat: uiresq;
consumit. primo die quiescere satis est: neq; impetum uentris prohibe-
re: si per se desit, balneo uti: paulum cibi capere. si mansit, abstinere
non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die, si nihilominus li-
quida aluus est, æque conquiescere: paulum astringentis cibi sumere:
tertio die in balneum ire: uehementer omnia præter uentrem perfric-
tare: ad ignem lumbos, scapulasq; admouere: cibi uti, sed uentrem
contrahentibus: uino non multum meraco. Si postero quoq; die fluat,
plus edisse: sed uomere etiam ex toto, donec conquiescat. Cõtra sitim,
fame, uomitu niti. uix enim fieri potest ut post hanc animaduersionẽ
aluus nõ contrahatur. Alia uia est, ubi uelis suppressere: cenare: de-
inde uomere: postero die in lecto conquiescere. uespere ungi sed leni-
ter. deinde panis circa selibrã ex uino amineo uero sumere. tum assũ
aliquid, maximeq; auem, & postea uinum idẽ bibere aqua pluuiali
mixtum: idq; usq; quintum diẽ facere: iterumq; uomere. Frigidam au-
tem assidue potione esse debere contra priores auctores Asclepiades
affirmavit, & quidem q̃ frigidissimam. Ego experimentis queng; in
se credere debere existimo calida potius, an frigida utatur. Interdum
autem euenit, ut id pluribus diebus neglectũ, curari difficilius possit.
à uomitu oportet incipere: deinde postero die uespere tepido oleo un-
gi. cibũ modicum assumere: uinum meracum quàm asperum: im-
positã super uentrem habere cum cærato rutam. In hoc aut affectu
corporis neq; ambulatione, neq; frictione opus est. uehiculo sedisse, uel
magis et equo prodest. neq; enim ulla res magis intestina cõfirmat.
Si uero etiam medicamentis utendum est: apertissimum est id quod ex
pomis fit. Vindemiæ tẽpore in grande uas coniungenda sunt pira, atq;

Aurelij Cor.

h iij

LIBER

malis siluestribus. si ea non sunt, pira tarentina uiridia, uel signina, mala scandiana uel amerina, myrapia: hisq; adijcienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punia, sorba: & quibus magis utimur etiam terminalia sic, ut haec tertiam ollae partem teneant. tum deinde ea musto implenda est: coquendumq; id donec omnia quae indita sunt, liquata in unitatem quadam coeant. Id gustui non insuauis est: & quadoq; opus est, assumptum leniter sine ulla stomachi noxa uentre tenet. duo, aut tria cochlearia uno die sumpsisse satis est. Alterum ualentius genus est, myrti bacas legere: ex his uinum exprimere: id decoquere ut decima pars remaneat: eiusq; cyathum sorbere. tertium quod quadoq; fieri potest, malum punicum excoquere: exemptisq; omnibus seminibus, membranas quae inter ea fuerunt iterum coniungere. tum infundere cruda oua, rudiculaq; miscere: deinde malum ipsum super prunam imponere. quod dum humor intus est, non adurit. Vbi sic cum esse coepit, remouere oportet: extractumq; cochleari, quod intus est, edisse. aliquibus adiectis maius momentum habet. Itaq; etiam in piperatum coniungitur: misceturq; cum sale, & pipere. est quid ex his edendum. est pulicula etiam, cum qua paulum est fauo uetere coctum sit, & lenticula cum malicorio cocta, rubiq; acumina in aqua decocta, & ex oleo, atq; aceto assumpta, efficacia sunt. atq; ea aqua, in qua uel palmulae, uel malum cotoneum, uel arida sorba, uel rubi decocti sunt, potata. quod genus significo, quotiens potionem dandam esse dico: quae astringit. Tritici quoq; hemina in uino amineo austero decoquitur: idq; triticum ieiunio, ac sitienti datur. superq; id, uinum id sorbetur. quod iure ualentissimis medicamentis annumerari potest. atq; etiam potui datur uinum signinum, uel resinatum austerum, uel quodlibet austerum. Cotunditurq; cum corticibus, seminibusq; suis punicum malum, uinoq; tali miscetur. idq; uel merum sorbet aliquis, uel bibit mixtum. sed medicamentis uti nisi in uehementibus malis superuacuum est.

De uuluae morbo, & curationibus. Caput. XX.

X uulua quoq; foeminis uehemens malum nascitur: proximq; ab stomacho uel afficitur haec: uel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat: ut tanquam comitiali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo quod neq; oculi uertuntur: nec spiritus prostruant: nec nervi distenduntur. sopor tantum est. idq; quibusdam foeminis crebro reuertens perpetuum est. ubi incidit, si satis uirium est: sanguis missus adiuuat. si parum est, cucurbitulae tamen defigendae sunt in inguinibus. si diutius aut iacet, aut alioqui iacere consuevit: admonere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, uel

aliud ex his, quæ foedioris esse odoris retuli: quod mulierem excitet. Idemq; aquæ frigida perfusio efficit. adiunatq; ruta contrita cū melle, uel ex cyprino ceratum, uel quodlibet callidum, & humidum cataplasma naturalibus pubetens impositum. Inter hæc est perfricare coxas, & poplites oportet. deinde ubi ad se redit, circūadendum uini est in totum annum: et si casus idē non reuertitur. Frictione quotidie utendū totius quidem corporis: præcipue uero uentris, & poplitum. cibus ex media materia dandus. sinapi super inuē uentrem tertio quoq; aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire cōmode uidetur solanum in lac demissum: deinde cōeritum, & cera alba, atq; medulla cernina cum irino, aut senum taurinum, uel caprinum cum rosa mixtum. dandum potui etiam uel castoreum est, uel gē, uel anetum. Si parum pura est, purgatur iunco quadrato: si uero uulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet: & recēs suilla adeps, & ex ouis albū miscetur, idq; apponatur: uel album ex ouo cum rosa mixtum, adiecto: quo facilius consistat, contrita rosæ puluere. dolens uero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulae cute incisa inguinibus uel etiam sub mammis admotæ: si maligna purgatio est, subiicienda sunt, ^{*}coeuntia. Id faciunt etiam albæ oliuæ, & nigrum papauer cum melle assumptū, & gummi cū erito semine apij liquatum, & cum cyatho passi datum. Præter hæc in omnibus uesciæ doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt: idest spica nardi, croco, annamomo, cassia, similibusq; Idemq; et decocta lentiscus præstat. si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiā sanguinis detractio apta est: aut certe coxis admotæ cucurbitulae cute incisa. At cum urina super potionum modū etiam sine dolore profluēs, maciem, & periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione, & frictione, maximèq; in sole, uel ad ignem. Balneum rarum esse debet: neq; longa in eo mora cibus comprimens. Vinum austerrum meracum, per æstatem frigidum, per hyemem egelidum, sed tantum quantum minimum sit. Infima, alius quoq; uel duenda, uel lacte purganda est. Si crassa urina est, uehementior esse debet & exercitatio, & frictio: longior in balneo mora: abis opus est teneris: uinum idē. In utroq; morbo uitanda oīa sunt, quæ urinam mouere consueuerūt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus. Caput. XXI

St etiā circa naturalia uitia, nimia profusio seminis. quod sine uenere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spatio tabe hominē consumat. In hoc affectu salutares sunt

h iij

LIBER

uehemētes frīctiones, perfrīctiones, natationesq; quā in frigidissimā neq; cibi, nec potio nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet cruditates: omnia instantia. nihil ex his assumere, quæ contrahere semen uidentur: qualia sunt, filigo, similia, oua, alia, amyllum, omnis caro glutinosa. piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neq; alienum est fouere inferiores partes, aqua decocta ex uerbenis comprimentibus. ex hisdem aliqua cataplasmata imo uentri, inguinibusq; circumdare: præcipueq; ex aceto rutam nitare: & ne supinus obdormiat.

De coxarum morbis, & curationibus. Caput. XXII.

Vp̄erest ut ad extremas partes corporis ueniam: quæ articulis inter se conferuntur. initium à coxis faciam. Harū īgenus dolor esse consueuit. isq; hominū sepe debilitat: & quosdā non dimittit. eoq; id genus difficillime curatur: quod fere post longos morbos uis pestifera huc se inclināt. quæ ut illas partes liberat: sic hanc ipsam quoq; affectam præhendit. Fouendum primum aqua calida est: deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse uidetur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mixtus capparis cortex concisus, uel lolij farina ex uino diluto cocta, & mixta cum acida fece: quæq; refrigescunt, imponere noctu malagmata commodius est. Inula quoq; radix contusa, & ex uino austero postea cocta, & late super coxam imposita, inter ualentissima auxilia est: si ista non soluerunt, sale calido, & humido utendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admouendæ sunt cucurbitule: mouenda urina. Alius si compressa est, duenda. Vltimum est, & in ueteribus quoq; morbis efficacissimum, tribus, aut quatuor locis super coxam cutem candentibus, feranentis exulcerare. Sed frīctione quoq; utendum est, maxime in sole, & eodem die sæpius: quo facilius ea quæ œuendo nocuerunt, dirigantur. Eaq; si nulla exulceratio est, etiā ipsis coxis, sicut & cæteris partibus adhibenda est. Cum uero sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut materia inutilis euocetur: illud perpetuum est, non ut primū fieri potest, huius generis ulcera sanare: sed ea trahere, donec id uitiū, cui per hæc opitulantur, conquiescat.

De genarum doloribus, & cura. Caput. XXIII.

Coxis proxima genera sunt: in quibus ipsis nonnunquā dolor esse consueuit. In hisdem autem cataplasmatibus, cucurbitulisq; præsidium est: sicut etiam cum in humeris, alijsue cõ-

missurijs dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui genua dolent: inimicissimum omnium est. Omnes autem eiusmodi dolores ibi inueterauerunt: nix citra unctionem finiuntur.

De articuloꝝ doloribus in manibus, pedibusq; Cap. XXIIII.

IN manibus, pedibusq; articuloꝝ uitia frequentiora, longioraq; sunt. quæ in podagris, chiragris uel esse consuerunt. Ea raro uel castratos, uel pueros ante foeminae coitum, uel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt: tentant. ubi sentiri ceperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factum saepe annuam: nonnunquam perpetuam ualeitudinem tota præstat. Quidam etiam cum asinino lotio epoto se eluissent: in perpetuum hoc malum euaserunt. Quidam cum toto anno a uino, mulso, uenere, sibi temperassent: securitatem totius uitæ consecuti sunt. Idq; utiq; post primum dolorem seruandū est: etiam si quieuit. Quod si iam consuetudo eius facta est: potest quidem aliquis esse securior his temporibus: quibus dolor se remisit. Maiorem uero curam adhibere debent hi, quibus id reuertitur. quod ferè uere, autumnō uel fieri solet. Cum uero dolor urget, manu gestari debet: deinde ferri. in ambulatione leui se mouere. Et si podagra est, interpositis temporibus exiguis, inuicem modo sedere: modo ingredi. tum antequam cibum capiat, sine balneo loco calido leuiter perfricari: sudare: perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinā mouentibus: quotiensq; plenior est, euomere. Vbi dolor uehemens urget: interest sine tumore is sit: an tumor cum calore, an tumor iam etiam obcaluerit. Nam si tumor nullus est: calidis fomentis opus est. Aquam marinam, uel muriam duram feruescere oportet: deinde in peluem conijcere: Et cum iam homo pati potest, pedes demittere: superq; palam dare: Et uestimento tegere: paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadē aqua leuiter infundere, ne calor intus destituat: ac deinde noctu cataplasmata caleficientia imponere, maximeq; ibi scā radicem ex uino coctam. Sin uero tumor, calorq; est, utiliora sunt refrigeratia: recteq; in aqua quā frigidiſſima articuli continentur. sed neq; quotidie, neq; diu fit: ne nerui lædantur. imponendum uero est cataplasma, quod refrigeret. Neq; tamen in hoc cotidie permanendum: sed ad ea transferendum quæ sic reprimunt, ut emolliant. Si maior est dolor, papaue-
ris cortices in uino coquendi: miscendiq; cum cerato sunt: quod ex rosa factum sit. Vel ceræ, Et adipis suille tantundem unā liquandum, deinde his uinum miscendum: atq; ubi quod ex eo impositum est, in

LIBER

luit, detrahendū, & subinde imponendum aliud est. Si uero tumores etiam obcūlerunt, & dolent, leuat spongia: quæ imposita subinde ex oleo, uel aceto, uel aqua frigida exprimitur: aut pari portione inter se mixta, pix, cera, alumen. sunt etiā plura idonea manibus, pedibusq; malagmatū. Quod si nihil superimponi patitur, id quod sine tumore est, fouere oportet spongia: quæ in aquam calidam demittatur: in qua, uel papaueris corticis, uel cucumeris siluestris radix decocta sit. tum inducere articulis crocū cum succo papaueris, & ouillo lacte. at si tumor est, foueri qdē debet aqua egelida: in qua lentiscus, alia uerberina ex reprimentibus decocta sit. induci uero nudicamentum ex nucibus amaris, cum aceto tritis: aut ex cerusa, cui contrita herba maralis succus sit adiectus. Lapis etiam, qui carnem exedit: quē οαπό-παρον græci uocant: excisus sic ut pedes capiat: demissos eos, cum dolēt, retentosq; ibi lenare consuevit. ex quo in Asia lapidi asio gratia est. Vbi dolor, & inflammatio se remiserunt, quod intra dies quadraginta fit: nisi uitium hominis accessit: modicis exercitationibus, abstinentia, unctionibus lenibus utendum est sic, ut etiam acopo, uel liquido cerato cyprino articuli perfrientur. Equitare podagricis quoq; alienum est. Quibus uero articularum dolor certis temporibus reuertitur: hos ante, & curioso uictu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit: & crebriore uomitu, & si quis ex corpore metus est, uel alui ductione uti: uel lacte purgari. quod Erasistratus in podagricis expulit: ne in inferiores partes factus cursus pedes replet: cum euident sit omni purgatione, non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocunq; autem morbo quis inualescit, si tarde confirmatur: uigilare prima luce debet. nihilominus in lecto conuiescere. circa tertiam horam leuiter unctis manibus corpus permulcere. deinde delectationis causa quantum iuuat, ambulare circumdāsa omni negciosa cogitatione, uel actione. tum gestari diu. multa frictione uti. loca, celum, abos sepe mutare. Vbi triduo, quadri- duo uel unum bibit: uno, aut etiam altero die interponere aquam. per hæc enim fiet, ne in uitia tabē inferenti incidat: & ut mature uires suas recipiat. Cum ex toto uero conualuerit, periculose uitæ genus subito mutabit: & inordinate aget. Paulatim ergo debebit, ommissis his legibus eō transire: ut arbitrio suo uiuat.

Ixi de his malis corporis, quibus uictus ratio maxime subuenit. Nunc trāseundum est ad eā medicīnæ partem: quæ magis medicamentis pugnat. His multum antiqui auctores tribuerunt: & Erasistratus, & hi, qui se ἐμπειροὺς nominauerunt: præcipue tamen Erophilus, dedistiq; ab illo uiri adeo, ut nullum morbi genus

sine his curarent. Multaq; etiam de facultatibus medicamentorum memorie prodiderunt. qualia sunt, uel Zenonis, uel Andriæ, uel Apollonijs. qui Mys cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit: & cum omni ferè medicamentis stomachū ledant, maliq; succi sint: ad ipsius uictus rationem potius omnem artem suam transtulit. Verū ut illud in plerisq; morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt: quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quod omnes medicīnæ partes ita innexæ sunt, ut ex toto separari non possint: sed ab eo nomen trahant, a quo plurimū petunt. Ergo ut illa, quæ uictus curat, aliquando medicamentum adhibet: & illa, quæ præcipue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem uictus debet: quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant: ac sepe simplicia opitulentur, sepe mixta: non alienum uidetur ante proponere & nomina, & uires, & mixturas eorum: quo minor ipsius curationis ex sequentibus mora sit.

De simplicibus facultatibus quarūcūq; rerum, ex quibus medicamēta fiunt: & primo de his, quæ sanguinem supprimunt. Caput. I.

Anguinem supprimunt atramentum sutorium, quod græci χαλκούανθρον appellant: chalcitis, acata, & ex aqua liuum, thus, aloë, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta uel cimolia, uel figularis, mīsy, frigida aqua, uinū, acetum, alumen, melinum, squama & ferri, & æris. atq; huius quoq; duæ species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris.

Quæ uulnus glutinant. Caput. II.

Glutinant uulnus, myrra, thus, gummi, præcipueq; ananbinū, psyllēū, tragaantha, cardamomon, bulbi, lini semen, nastarcium, oui album, gluten, ichthyocolla, uitis alba, confusa

LIBER

testis suis cochleæ, mel coctum, spongia, uel ex aqua frigida, uel ex uino, uel ex aceto expressa. ex hisdem lana succida, si leuis plaga est: etiam araneū reprimunt, alumen & scissile, quod $\alpha\chi\iota\varsigma$ uocatur: & liquidum, melinū, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentū sutoriū.

Quæ concoquunt, & mouent pus. Caput. III.

Concoquunt, & mouent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris, & fuligo, & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

Quæ aperiunt uulnera. Caput. IIII.

Uulnera aperiunt tanquam ora in corporibus, quod $\sigma\upsilon\mu\alpha$ græce dicitur: cinnamomum, balsamum, panacis, iuncus quadratus, puleium, flos albe uiole, bdella, galbanum, resina terebinthina, & pinea, propolis, oleum uetus, piper, pyretrum, chamaepytis, uua aminia, sulphur, alumen, ruta semen.

Quæ purgant. Caput. V.

Urgant, ærugo, auripigmentum, quod $\alpha\pi\sigma\epsilon\upsilon\iota\nu\delta\epsilon\varsigma$ à græcis nominatur. Huic autem & sandaracæ in omnia eadē uis: sed ualidior est squama æris, pumex, iris, balsamū, styrax, thuris, cortex, resina, & pinea, & terebinthina ligda, cœnathe, lacerti sterces, sanguis columbæ, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacū potest: sed ualentius est abrotanum, ficus arida, cocum gnidium, scobis eboris, omphaciū, radícula, coagulum, sed maxime leporinū: cui eadem quæ cæteris coagulibus facultas, sed ubiq; ualidior est: fel, uitellus crudus, cornu ceruinū, gluten taurinum, mel crudum, misyos, chalcitis, crocum, uua aminia, abrotanum, spuma argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticiula, eruū.

Quæ rodunt. Caput. VI.

Odunt alumen liquidum, sed magis rotundum: ærugo, chalcitis, mysi, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaracæ, minium synopicum, galla, balsamum, myrra, thuris cortex, galbanū, resina terebinthina humida, piper utrunq; sed rotundum magis, cardamum, auripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij semen, narossi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nucibus, allium, mel crudum, uinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, uua aminia, cynamomum, styrax, cuius semen, resina, narossi semen, fel, nukes amaræ, oleumq; earum, atramentum sutorium, chrysocolle, ueratrum, cinis.

Quæ exedunt corpus. Caput. VII.

e Xedunt corpus acaciæ suavis, hebenus, ærugo, squama æris, chrysocolle, cinis cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hyposiphis, diphyrges, sal, auripigmentum, sulphur, cicuta, sandaraca, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum sutorium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifici, uel lactucæ marine, quæ τὸς μύλλος à græcis nominatur: alcyonium, fel, turturis fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites & phrygius, & asius, & scissilis, mysi, uinum, acetum.

Quæ adurunt. Caput. VIII.

a Durunt auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, mysi, ærugo, calx, carta combusta, sal, squama æris, fex combusta, myrra, sterco & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hirundinis, piper, coarum gnidium, allium, diphyrges, lac utrunq; quod proximo capite supra comprehensum est: uer atrum & album, & nigrum, cantharides, corallium, piretrū, thus, salamandra, eruca, sandaraca, uua aminia, chrysocolle, ochra, alumen scissile, ouillum sterco, oenanthe.

Quæ crustas ulceribus inducunt. Caput. IX.

e Adem ferè crustas ulceribus tanquā igne adustis inducunt: sed præcipue chalcitis utiq; si cocta est: flos æris, ærugo, auripigmentum, mysi, & id quo magis coctum.

Quæ crustas ulceribus resolunt. Caput. X.

e Rustas uero has resoluit, farina triticea cum ruta, uel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discutiat ea, quæ in aliqua pte corporis coierunt. Caput. XI.

a Discutieda uero ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt: maxime possunt abrotanum, helenium, amaracus, alba uiolela, mel, lilium, sampsucus, cyprius, lac, fertula campana, serpillum, cupressus, cedrus, iris, uiolela purpurea, narcissus, rosa, crocum, passum, iuncus quadratus, nardum, cinamonum, cassia, ammoniacum, cera, resina, uua aminia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini, & narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapidis aut molaris: crudus uitellus, amaræ nuce, sulphur.

Quæ euocant, & educunt. Caput. XII.

e Vocat, et educit ladanium, alumē rotundū, hebenus, lini semē, omphacum, fel, chalcitis, bdeliū, resina terebinthina, & pinea, propolis, ficus arida decocta, sterco columbæ, pumex, farina lolij, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccæ, nitrum, sal.

LIBER

Quæ exasperata lenient. Caput. XIII.

l Euat id quod exasperatum est, spodium, hebenus, gummi, onni album, lac, tragacanthum.

Quæ carnem nutriunt, & ulcus implent. Cap. XIII.

c Arnem alit, & ulcus implet resina pinea, ochra actica, uel asterica, cera, butyrum.

Quæ molliunt. Caput. XV.

m Olliunt æs combustum, terra crethria, nitrum, papaueris lacryma, ammoniacum, bdellium, cera, seuum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum, fertula campana, narcissi & radix, & semen, rosæ folia, coagulum, vitellus crudus, amaræ nucis, medulla omnis, stibi, pix, cholea actica, cicuta semen, plumbi recementum, σκωπ' αὐ' μολύβδου græci uocant: panacis, cardamomum, galbanum, resina, una ammiu, sty-rax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

Quæ cutem purgant. Caput. XVI.

i Tem cutem purgat mel: sed magis si est cum galla, uel eruo, uel lenticula, uel marrubio, uel iride, uel ruta, uel nitro, uel ærugine.

De mixturis simplicium rerum, & de ratione ponderum, & quid malagma, et emplastrum, et pastillus inter se differant. Caput. XVII.

e Xpositis simplicibus facultatibus dicendum est quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem uariæ: neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur: alia adiçantur: iisdemque seruatis, ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit: innumerabilia mixturarum genera sunt: quæ comprehendere si possent, tamen esset superuacuum. Nam et ydem affectus intra paucas compositiones sunt: & mutare eas cuilibet cognitis facultatibus facile est: itaque contentus his ero quas accepi uelut nobilissimas. In hoc autem uolumine eas explicabo: quæ uel desiderari in prioribus potuerunt: uel ad eas curationes pertinent: quæ protinus hic comprehendam sic: ut tamē quæ magis cōia sunt, simul iungam. Si qua singulis, uel et paruis accommodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed & antea sciri uolo, in uncia pondus denariorum septem esse. Unus deinde denarii pondus diuidi à me in sex partes id est sex uncias: ut idem in uncia denarii habeam, quod græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellant. id ad nostra pondera relatum, paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata uero, atque emplastra, pastilli: quos ὀνιχοὺς græci uocant: cum plurima eadem habeant: differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus, eorumque etiam succulis, emplastra, pastilli: magis ex quibus-

dam metallicis fiunt. deinde malagmata confusa abunde mollescunt. nam super integram cutem iniunguntur. Laboriose uero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastilliq; fiunt: ne ledant uulnera cum imposita sunt. Inter emplastrum autem, & pastillum hoc interest: quod emplarum utiq; liquari aliquid accipit. in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. arida medicamenta per se teruntur. deinde mixtis his instillatur aut acetum aut si quis alius non pinguis humor accessurus est. & ea rursum ex eo teruntur. Ea uero quae liquari possunt ad ignem simul liquantur: & si quid olei misceri debet: tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt quae seperatim fieri debuerunt: in unum omnia miscentur. At pastilli haec ratio est. Arida medicamenta contrita humore non pingui aut uino, uel aceto coquantur, & rursum cocta inarescunt. Atq; ubi utendum est eiusdem generis humore, diluuntur. tum emplastrum imponitur. pastillis illinitur, aut alicui molliori: aut cerato miscetur.

De malagmatis. Caput. XVIII.

Malagma aduersum calidas podagras.

Is cognitis, primum malagmata subiiciam: quae fere non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit ad calidas podagras aptum. Habet gallae & immaturae, & alterius coriandri seminis, citreae, lacrimae aridae, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati eloti, quod *πεπονητορ* graeci uocant: selibram. Reliqua fere calefaciunt. Sed quaedam digerunt materiam: quaedam extrahunt, quae *πισταστίνη* uocantur. pleraq; certis magis partibus membrorum accomodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

I materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoq; mediocri, aptum est id quod habet resinae aridae, nitri, ammoniaci, galbani singulorum pondo, cereae pondo. Aut in quo haec sunt, aeruginis rasae, thuris, singulorum. P. *. ammoniaci salis. P. VI. squamae aeris, cereae, singulorum. P. VIII. resinae aridae. P. VII. aceti cyathus. Idem praestat cumini farina cum struthio & melle. P. II.

Malagma ad iecur dolens.

I iecur dolet: id in quo est balsami lacrimae. P. XII. costi, cinamomi, casiae, corticis myrrae, croci, iunci rotundi, balsami, seminis iridis illiricae, cardamomi, amomi, nardi, singulorum.

LIBER.

P.XVI. quibus adiūctur nardinum unguentum, donec cæratī crassitudo sit. Et huius quidem recentis usus est. Si uero seruandum est, resina terebinthina. P.XVI. ceræ. P.X. ex uino leni contunduntur, tum eo miscentur.

Malagma ad lienem.

T si lienis torquet, glādis, quam βάλανον græci uocant: cortex, Et nitrum paribus portionibus contunduntur: respergunturq; aceto quā acerrimo. Vbi cæratī crassitudinem habet, linteo antea in aqua frigida madefacto illinitur: Et sic imponitur: supraq; farina hordacea inijcitur: sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat. satiusq; est id bis, aut ter fieri. Communem autem Et iocineri, Et lieni, Et abscessibus, Et strumæ, parotidibus, articulis, calabus quoq; suppurantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni uentris Lysias cōposuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani, resinae, singulorum. P.II. ammoniaci, bdellij, cære, seui taurini, iridis aridæ. P.III. cæclirios acetabulo, piperis granis quadraginta. quæ contrita irino unguento temperantur.

Malagma ad laterum dolores.

D laterum autem dolores compositio est, Apollophanis, in qua sunt resina terebinthina, turis, fuliginis, singulorū P.III. bdellij, ammoniaci, iridis, seui uitulini, aut capri= ni à renibus sicut singulorum. P.III. Hæc aut eadem omnem dolorem leuant: dura emolliunt: modicriter calefaciunt. Ad idem latus Andree quoq; malagma est: quod Et resoluit: educit humorem: pus maturat: ubi id maturum est, autem rumpit: ad cicatricem perducit. prodest impositum minutis, maioribusq; abscessibus: item articulis: ideoq; Et coxis: et pedibus dolentibus: item si quid in corpore collisum est, reficit: præcordia quoq; dura, Et inflata emollit: cissa extrahit. ad omnia deniq; ualeat, quæ adinuare calor potest. id habet ceræ. P.I. uisci, sycamini, quam alias sycomerum uocat: lacrimæ singulorū. P.XI. piperis Et rotundi, Et longi, ammoniaci, thimiamatis, bdellij, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, xilobalsami, thuris masculi, myrræ, resina aridæ, singulorum. P.X. pyretri, coacti gnidij, spumæ nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ creticæ, radicis ex cucumere agrestis, resina terebinthina liquidæ singulorum. P.XX. quibus adiūctur unguenti

unguenti irini quantum satis est ad ea mollienda, atq; cogenda.

Malagmata ad resoluenda quæ astricta sunt: & mollienda quæ dura sunt: & digerenda quæ coeunt.

Receptum uero est ad resoluenda quæ astricta sunt: mollienda quæ dura sunt: digerenda quæ coeunt: id quod ad Polyarchum authorem refertur. habet iunci quadrati, cardamomi, thuris, fuliginis, ammoni, ceræ, resinæ liquidæ pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

Liud ad eadem Nilei crocomagmatis, quod quasi recremētū eius est. P. XIII. ammoniaci, thymiamatis, ceræ, singulorū, P. XXX. ex quibus duo priora ex aceto teruntur: cerā cū rosa liquatur: & tum omnia iunguntur.

Malagma moschi ad molliendum.

Proprie etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. habet galbani unciam, thuris fuliginis. P. Z. ceræ, ammoniaci, thymiamatis trientes, picis aridæ. P. XII. aceti heminas tres.

Malagma medi ad digerenda quæ coeunt.

Fit etiam ad digerenda quæ coeunt sub authore Me do, quod habet ceræ. P. Z. panacis. P. semis, squamæ æris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum. P. Z. plumbi combusti P. I. & semis.

Malagma Panthemi ad eadem.

De eadē Panthemus utebatur calcis. P. semis, sinapis contriti, item fœni græci, aluminis, singulorum. P. I. Seni bubuli. P. II. & semis.

Malagma ad strumas.

De strumam multa malagmata inuenio. Credo autem quod peius id malum est, minusq; facile discutitur: eo plura esse tentata, quæ in personis uarie responderunt. Andreas author est, ut hæc misceantur urticæ seminis. P. XI. pipis rotundi, bdellij, galbani, ammoniaci, thymiamatis, resinæ aridæ, singulorū. P. XIII.

Aurelij Cor.

LIBER

resinæ liquidæ, ceræ, pyretri, piperis longi, lactucæ marinæ seminis, sulphuris ignem non experti: quod ἀρπυριον vocatur, fecis aridæ, aceti, spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radices ex cucumeri siluestri, resinæ, singulorum. P. XXV. Quæ ex leni uino contunduntur.

Aliud malagma ad id ualens.

Expeditius ad idem fit: quod habet visci, semini, stercoreis, resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris. P. XXI. lapidis quæ πυρίτων vocat. P. XIII. cumini acetabulum. Itē in quo est lapidis eiusdem pars una, sulphuris due partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

Malagma ad strumam, & phymata.

Rabis autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ φύματα vocantur: quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum. P. XI. lapidis eius: quem πυρίτων vocat. P. XIII. quibus quidam adiciunt sulphuris. P. II.

Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

St etiam proficiens in struma, & in his tuberculis: quæ diffaciliter concoquuntur, & in his: quæ ἀρπυριόδαι vocantur: quod ex his constat. sulphuris. P. XII. nitri. P. XIII. myrræ. P. XVI. fuliginis thuris. P. semis, salis ammoniaci. P. Z. ceræ. P. I.

Malagma protarchi ad parotidas, & fauam, & mala ulcera.

Rotarchus autem ad parotidas eaq; tubercula: quæ μολιμύρια idest faui uel φύματα nominantur: item mala ulcera, pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum. P. XVIII. cum ceræ. P. XVIII. miscebat: hisq; olei cyathum, & dimidium adiciebat.

Malagma aduersus panum, & phymata.

T aduersus panum tum primum orientem: quod φύετλον græci vocant, & omne tuberculum: quod φύμα nominatur, misceatur ochra: quæ attice nominatur cum duabus partibus simile, hisq; contunditur: subinde mel instillatur: donec malagmatis crassitudo sit.

Malagma aduersus phymata.

Iscurit etiā omne tuberculū: quod φύμα vocatur: id quod
d habet calcis, nitrī sumæ, piperis rotundi, singulorum. P. XI.
galbani. P. XII. salis. P. XIII. quæ excipiuntur cerato ex ro-
sa facto.

Malagma ad supprimendum omne quod abscedit.

Vpprimūtq; omne quod abscedit id: in quo est galbani, fabæ
fresæ, singulorum. P. XI. myrræ, thuris, ex radice apparatus
corticis, singulorum. P. XIII. Satisq; omnia abscedentia di-
gerit murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adiecto.

Malagma ad sanguinem supprimendum, & phymata.

T si satis sanguis subit: recte imponitur quod aduersus φύ-
ματα quoq; potest. Constat ex his bdellij, styracis, ammoniaci,
galbani, resinæ & aridæ, & liquidæ pineæ. Item ex lentis-
sæ, thuris, iridis singulorum. P. XII.

Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.

ἀπυρόδου uero, & φύματα commode his leniuntur: galbani,
uisi, ammoniaci, resinæ terebinthinæ in singulis. P. XI. seui
taurini. P. semis, fecis combustæ quā maxima portione, dū
id facius non faciat: quā esse malagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei contusæ.

Vod si facie contusa liuor subcruentus est: hæc cōpositio no-
cte & die impōita tollit. Aristolochiæ, thapsiæ, singulorū.
P. XII. bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galbani, re-
sinæ aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis illyricæ, ce-
ræ singulorum. P. XIII. Idem faba quoq; impōita proficiat.

Malagmata stomachiæ ad aperiendum.

Vnt etiā quedam malagmata: quæ σωματιναὶ græci uo-
cāt: quoniam aperiendi nim habent. Quale est quod ex
his constat. piperis longi, sumæ nitrī, singulorum. P. XII
erisimi. P. XIII. Quæ cum melle miscentur. Idemq; etiā strumæ
aperiendæ sunt eius generis. Vehementiusq; ex his est id quod habet
calcis. P. XIII. piperis grana sex, nitrī, ceræ, singulorum. P. XX. mel-
lis. P. Z. olei heminam.

LIBER

Niconis malagma ad resoluendum,
aperiendumq; ac purgandum.

n Iconis quoq; est quod resoluit: aperit: purgat. Habet alcyo-
nium, sulphur, nitrum, pumicem paribus portionibus: qui-
bus tantum picis, & cere adijcitur, ut fiat cerati crassitudo.

Malagma ad ossa, & nervos.

a D ossa autē Aristogenis fit ex his. sulphuris. P. XI. resine te-
rebinthinae, nitri spuma, & ex scylla partis interioris, plu-
bi eloti singulorum. P. XII. thuris fuliginis. P. XVIII. ficus ari-
de quam pinguisima, seu taurini, singulorum. P. XVIII. cere. P. XXI.
iridis macedonicae. P. XVI. sesami fricti acetabulum. maximq; ner-
uis & articulis malagma conuenit.

Malagma Euthylei ad articulos, & ad omnem dolorem.

i Citur Euthylei est et ad articulos, & ad omnem dolorem,
& ad uescica, & ad recenti cicatrice contractos articulos:
quas ἀρῦνδας graeci nominant. quod habet fuliginis thuris
acetabulum, resine tantundem, galbani sine surculis sesunciam, am-
moniaci, bdellij, singulorum. P. XIII. cere. P. semis. Aliud item fit: quod
habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri singulorum. P. XIII. resine li-
quidae. P. XVI. cere. P. XXVI.

Malagma Sasogorae ad dolores articulorum.

a D dolores articulorum Sasogorae, plumbi combusti, papau-
ris lacrymae, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seu, re-
sinae, cere pares portiones.

Chrysippi malagma, ad idem ualens.

c Chrysippi, resinae liquidae, sandaracae, piperis singulorum
P. XII. quibus cere paulum adijcitur.

Clesipontis malagma, ad idem ualens, & ad parotidas,
& phymata, & strumam.

c Lesypontis cere creticae, resinae terebinthinae, nitri quam
ruberrimi, singulorum. P. semis, olei cyathi tres. sed id nitru
ante

ante per triduum instillata aqua teritur, & cum sextario eius inco-
quitur: donec omnis humor consumatur. Potest uero ea compositio etiā
ad parotidas, phymata, strumam, omnemq; coitum humoris emolli-
endum.

Malagma ad articulos.

- a** D articulos fici quoq; aridi partem nepetæ mixtum, uel unā
taminiam sine seminibus, cum puleio recte aliquis imponit.

Malagma Aristonis aduersus podagras, & recētia phy-
mata, & omnis dolores.

- e** Adem podagræ præsidia sunt. Sed ad eam fit Aristonis
quoq; quod habet nardi, cinnamomi, cassiæ, chameleontis, iūci
rotundi, singulorum. P. ℥VIIII . seu caprini ex irino liquati.
P. ℥XXX . iridis. P. ℥XI . quæ in aceto quā acerrimo iacere per viginti
dies debet. Idem autem etiam recentia phymata, doloresq; omnes di-
scutit.

Theoni malagma ad pedum dolores.

- a** T Theonus ad pedum dolores seu à renibus partem tertiā,
salis partes duas miscebat, hisq; membranula illitam impo-
nebat: tum super iniiciebat ammoniacū, thymiana in aceto liquatū.

Numenij malagma ad podagram cæteros
que articulos induratos.

- a** T Numenius podagram, cæterosq; articulos induratos hoc
molliebat. abrotani, rosæ aridæ, papaueris lacrimæ, singu-
lorū. P. ℥IIII . resinæ terebinthinæ. P. ℥IIII . thuris, spumæ
nitri, singulorum. P. ℥VIIII . iridis, aristolochiæ, singulorum. P. ℥XII .
ceræ. P. ℥IIII . gbus adijcitur cedri cyathus unus, olei laurei cyathi
tres, olei acerbi sextarius.

Dexij malagma si quando callus in articulis increuit.

- f** I quando autem in articulis callus increuit Dexius docuit
imponere calcis. P. ℥IIII . cerussæ. P. ℥VIIII . resinæ pineæ.
P. ℥XXX . piperis grana. XXX . ceræ. P. Z. Quibus dum con-
funduntur, hemina uini lenis instillatur.

De emplastris. Caput. XVIII.

- e** X emplastris autem nulla maiorem usum præstant: quā
quæ cruentis protinus uulneribus iniunguntur, & uulnē graci

LIBER

uocant. Hæc enim reprimunt inflammationem nisi magna uis eam cogit, atq; illius quoq; impetum minuunt, tum glutinant ulnera: quæ id patiuntur: cicatricem hisdem inducunt. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideoq; ἀλιπὲς nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus ulneribus injicitur.

Primum ex his est quod barbarum uocatur. Habet æruginis rasæ. P. XXXII. spumæ argenti. P. XXX. aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum. P. XI. quibus adiunguntur olei, & aceti singulæ hemina.

Coacan emplastrum nigrum ad idem ualens.

Iterum ad idem: quod χαῖνον uocant: habet spumæ argenti P. XC. resinæ aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est: qui ferè talis fit. ex pice, atq; resina. At ex bitumine nigerrimus. ex ærugine, aut æris squama uiridis. ex minio rubet. ex cerussa albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

Aucæ admodum compositiones sunt, in quibus aliquid mixturæ uarietatis nonat. Ergo id quoq; nigrum est. quod βασίλινον nominatur. Habet panacis. P. XI. galbani. P. XII, picis & resinæ, singulorum. P. XX. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum ad idem.

T quod peruiride est, smaragdinum appellatur. in quo sunt resinæ pineæ. P. XII. ceræ. P. XI. æruginis. P. semis. turis fuliginis. P. Z. olei tantundem, aceti, quo fuligo, & ærugo in unum coguntur.

Emplastrum ruffum ad idem.

Est etiam coloris ferè ruffi: quod celeriter ad cicatricem ulnera perducere uidetur. Habet thuris. P. XI. resinæ. P. XII. squamæ æris. P. XIII. spumæ argenti. P. XXX. ceræ: P. XC. olei heminam.

Paracollecticum emplastrum ad idem.

Ræterea est: quàm παρακολλητικὸν à glutinando uocant. Constat ex his. bituminis, aluminis scissilis. P. XIII. spumæ argenti. P. XL. & olei ueteris hemina.

Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens.

Rætereæ sunt quædam generis eiusdem: quæ: quia capitibus fractis maxime conueniunt: κεφαλικὰ à græcis nominantur. philotæ compositio habet terræ erythrææ, chalcitidis, singulorū. p. ʒiiii. myrrhæ, æris combusti. p. ʒx. ichhyocollæ, singulorū. p. ʒvi. æruginis rase, aluminis rotundi, mysi crudi, aristolochiæ, singulorum. p. ʒviii. squamæ æris. p. ʒx. thuris masculi. p. ʒii. ceræ. p. i. rosæ & olei acerbi ternos cyathos: ceteri quantum satis est: dum arida ex eo conuertuntur.

Emplastrum uiride ad idem ualens.

Liud ad idem uiride: æris combusti, squamæ æris, myrrhæ ichhyocollæ, singulorum. p. ʒvi. mysi crudi, æruginis rase, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum. p. ʒviii. ceræ. p. ʒi. olei hemina, aceti quod satis sit.

τετραφάρμακον emplastrum ad pus mouendum.

Vri autem mouendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est. τετραφάρμακον à græcis nominatur. habet parætes portiones ceræ, picis, resinæ, seui taurini: si id non est, uitulini.

Enneapharmachum emplastrum ad pus mouendum, & ad purgandum ualens.

Iterum ad idē ἐννεαφάρμακον nominatur: quod magis purgat. constat ex nouē rebus, cera, melle, seuo, resina, myrrha, rosa, medulla uel ceruina uel uitulina uel bubula, hyssopo, busyro. Quorum ipsorum quoque pondera paria miscentur. Sunt autem quædam emplastra: quibus utriusque rei facultas est. quæ si singula habenda sunt, meliora sunt. sed in copia reijcienda sunt: his potius adhibitis: quæ proprie id, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam.

Attalum emplastrum ad uulnera.

Si igitur ad uulnera attalum: quod habet squamæ æris. p. ʒvi. fuliginis. p. ʒxv. ammoniaci tantundem. resinæ terebinthinæ liquidæ. p. ʒxxv. seui taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium.

Judei emplastrum fracto capiti accommodatum.

P. IIII. squame aris rubri, aris combusti. singulorum. P.
XXII. ammoniaci, thymamatis, thuris fuliginis, resine aride, singu-
lorum. P. XVI. resine colophoniace, cere, seu vitulini curati, singu-
lorum. P. XXX. aceti sesquicyathum, olei minus cyathum. ῥεσπαριον
μείρα græci appellant: quæ curata vocant, cum ex seuo puta omnes mē-
branulæ diligenter exemptæ sunt, aut ex alio medicamento.

Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum.

5 Vnde etiam quedam emplastra nobilia ad extrahendum.
Quæ ipsa quoque ἐπιπαστῆς nominatur. Quale est: quod,
ga lauri baccas habet διὰ δαπνιδῶν appellatur. in eo est, re
sine terebinthinae. p. ℞. nitri, ceræ, picis aridæ, baccarum lauri, sin
gulorum. p. ℞. x. olei paulum. Quotiens aut baccam, aut nucem, aut
simile aliquid posuero, scire oportebit, anteq̃ expendatur, ei summam
pelliculam esse demendam.

Aliud δὲ ἀφαιρῶν ad extrahendum, & plus movendum.

¶ *Liud eo nomine: quod puri quoq; mouendo est, seu nitulini,
a ammoniac, thymamatis, picis, ceræ, nitri, bacarum lauri,
resinæ aridæ, aristolochiæ, pyretri pares portiones.*

Philocratis emplastrum ad extrahendum, & pus mouendum

p Ræter hæc est philocratis: quod habet salis ammoniaci. P.
 ꝥVII. aristolochiæ. P. ꝥVIII. ceræ, resinæ terebinthinæ. sic
 lignis thuris, singulorū. P. ꝥXV. spumæ argenti. P. ꝥXXXII. Quibus
 ut pus quoq; moneat, iridis. P. ꝥIIII. Et galbani. P. ꝥVI. adiunguntur.

ρὺ πῶδες emplastrum ad extrahendum.

ptimum tamen ad extrahendum est id: quod à similitudine
o sordium p^o t^odes græci appellât. Habet myrræ, croa, iridis,
propolis, bdellij, capitulorum punici mali, aluminis et sciss
lis, et rotundi. mysi, chalcitis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis am
moniaci, uiscæ, singulorum. P. ꝯIIII. aristolochiæ. P. ꝯVIII. squamæ
æris. P. ꝯXVI. resinæ terebinthinæ. P. ꝯLXXV. ceræ, et seni, uel tur
rini, uel hircini. P. ꝯC.

Emplastrum

Emplastrum Hecatei ad extrahendum.

h Ecce quoque auctore emplastrum generis eiusdem fit ex his.
galbani. P. XII. fuliginis thuris. P. XIII. picis. P. XVI. cere.
Et resinæ terebinthinæ, singulorum. XVII. quibus paulu
irini unguenti miscetur.

Alexandrinum emplastrum uiride ad extrahendum.

u Alensque ad idem emplastrum uiride alexandrinum est.
Habet aluminis scissilis. P. XVIII. salis ammoniaci. P. XV
III. Z. squamæ aeris. P. XVI. myrrhæ, thuris singulorum. P.
XVIII. cere. P. CL. resinæ colophoniacæ, aut pineæ. P. CC. olei
hemina, acetii sextarium

De emplastris exedentibus.

q Vædam autem sunt emplastra exedentia: quæ *σπῆρα* græci
uocant quale est id quod habet resinæ terebinthinæ, fuligi-
nis, thuris, singulorum. P. Z. squamæ aeris. P. XI. ladani. P.
XII. aluminis tantundem, spumæ argenti. P. XIII.

Emplastrum quod exest corpus, Et ossa resoluit, Et
super crescentem carnem coeret.

e Est etiam uehementer corpus, atque ossa quoque resoluit, Et
super crescentem carnem coeret id quod habet spumæ ar-
genti, squamæ aeris, uncias singulas, nitri ignem non expit,
lapidis asy, aristolochiæ. p. sextantes, cere resinæ terebinthinæ, thuris
olei ueteris, atramenti sutorij, salis ammoniaci. P. semis, æruginis, rase.
p. bessem, acetii scyllitici hemina, uini aminei tantundem.

Emplastra aduersus morsus, Et alia recentiora uulnera.

f Vnt etiam aduersus morsus quedam acomodata quale est.
Diogenis, nigrum: quod habet bituminis, cere, resinæ pineæ
aridæ, singulorum. P. XXX. spumæ argenti. P. XC. olei sexta-
rium. Aut in quo sunt. squamæ aeris. P. XIII. cerussæ, Et æruginis
passæ singulorum. P. VIII. ammoniaci. P. XII. cere, resinæ pineæ.
singulorum. P. XXV. spumæ argenti. P. XC. olei sextarium. Aut in
quo sunt squamæ aeris. P. XIII. galbani, P. VI. cerussæ, Et ærugi-
nis rase, singulorum. P. VIII. ammoniaci. P. XII. cere, resinæ pi-
næ singulorum. P. XLV. spuma argenti concoquitur.

LIBER

ἐμπίον emplastrum rubrum ad idem ualens.

Utrum quoque emplastrum, quod ἐμπίον uocatur, huc aptum est. Habet resinæ terebinthinæ. P. XII. galbani. P. X. IIII. minij. sinopis. P. XVI. thuris fuliginis. P. XVI. ceræ. P. XVII. spumæ argenti. P. XLVI. olei ueteris heminam.

Aliud emplastrum ad idem ualens.

Tē id quod ex his constat. squamæ æris: thuris fuliginis: singulorum. P. XIII. galbani. P. XVI. salis ammoniaci. P. XII. Z. ceræ. P. XXXV. olei tribus heminis. Hæc autē alijs quoque recentioribus uulneribus recte imponuntur.

ἀσκή emplastra non grauibz uulneribus accommodata, & maxime senilibus.

Vnt enim alba lenia: ἀσκή græci uocant. ferè nō grauibz uulneribus accommodata, præcipuèq; senilibus. Quale est qđ habet cerussæ. P. XXXII. seu nitulini curati, & ceræ: singulorum. P. XLVIII. olei heminas tres: ex quibus ea cerussa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

Liud qđ hēt cerussæ. P. XX. ceræ. P. XXXV. olei hemina, aquæ sextariū. Quæ quotiens adiūctur cerussæ uel spumæ argenti: scire licet illa ex his coquēda esse. Est autē ea præcādida cōpositio quæ supra posita est, ideoq; elephantina nominatur.

Lenia emplastra.

Enia quoque quædam emplastra sunt, quas λιπαρὰς ferè græci nominant: ut id quod habet minij. P. XIII. spumæ argenti. P. XXV. ceræ et adipis suillæ. singulorum. P. XXVII nitellos quatuor.

Emplastrum lene.

Lia compositio generis eiusdem: ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum. P. XVI. cerussæ. P. XVIII. spumæ argenti, plumbi recrementi, σπορίαν πολύβδου græci uocant, singulorum. P. XXX. cicini olei, & myrti, singulorum heminæ.

Archagathi emplastrum lene.

Etia quæ ad auctorem Archagathum refertur, mysi cocti, æris combusti, singulorum. P. XIII. cerussæ coctæ. P. XVIII resinæ terebinthinæ. P. XX. spumæ argenti. P. XVI.

Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta.

Tiamnum spumæ, argenti, ceræ, adipis suillæ singulorum
P. XXXVII. vitelli cocti quatuor, rosæ hemina, Aut cerati ex
oleo myrteo facti partes tres, adipis suillæ pars quarta, pau-
lum ex plumbi recremento. Aut spumæ argenti selibra ex olei hemi-
na, & aquæ marinæ altera cocti donec bullire desierit, cui paulum
ceræ sit adiectum, aut pares portiones ceræ, seu, sibi, spumæ argenti,
cerussæ.

De pastillis, & primo de his, qui ad recentia vulnera glutinā-
da, sanandāq; apti sunt. Cap. XX.

Pastilli quoq; facultates diuersas habent. sunt enim ad recen-
tia vulnera glutinanda, sanandāq; apti. Qualis est qui ha-
bet chalcitis, mysi, spumæ nitri, floris æris, gallæ, aluminis
scissilis modice cocti, singulorum. P. XI. æris combusti, capitulorum ma-
li punici, singulorum. P. XIII. Hunc oportet diluere aceto, sic, ubi vul-
nus glutinandū est, illinere. At si nervosus aut musculosus is locus est,
comodius est, cerato miscere sic, ut illius octo partes: nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda vulnera.

Lius ad idem cōstat ex his, bituminis, aluminis scissilis, sin-
gulorum. P. XI. æris combusti. P. XIII. spumæ argenti. P. X.
olei sextarium.

De sphragide pastillo: quæ Polybus conficit, ad glutinandū vulnus.

Sed longe polybi celeberrimus est. οpolyς autē nominatur.
qui habet aluminis scissilis. P. XI. Z. atramenti sutorij. P. X
II. myrrhæ. P. XV. aloes tantundē, capitulorum punici mali, fellis tau-
rini, singulorum. P. XVI. Quæ contrita uino austero excipiuntur.

Pastillus ad ulcera sordida, & nigriliem in auribus, nari-
bus, obscenis partibus, inflammationesq; eorum.

Dulcera sordida & nigriliem in auribus, naribus, obscenis
partibus, inflammationesq; eorum, chrysocollæ. P. XI. atra-
menti sutorij, aluminis scissilis, singulorum. P. XII. halicacabi corticis.
P. X. III. minij. P. XVI. spumæ argenti. P. XII. cerussæ. P. XXVI.
Quæ ex aceto & coguntur, & ubi utendum est: diluuntur.

LIBER

Pastillus andronis ad uiam inflammata, ad naturalia
ralia sordida etiam cancro laborantia.

Andronis uero est ad uiam inflammata, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia, gallæ, atramenti sutorij, myrrhæ singulorum .P. .xij. aristolochiæ, aluminis scissilis, singulorum .P. .xii. capitula punici mali .P. .xxxv. ex passo coacta, et cum
usus exigit aceto, uel uino diluta, prout ualentius, aut lenius uitium est,
cui medendum est.

Pastillus ad fissâ ani, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum.

Proprie autem ad ani fissâ, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum, æruginis .P. .xii. myrrhæ .P. .xii. sibi;
lacrymæ papaueris, acaciæ, singulorum .P. .xxvi. Quæ ex
uino, et teruntur, et in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum cum urina.
Expellere autem ex uesica cum urina calculum uidetur hæc
compositio. castiæ, croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis
radicis, balsami, hyperici, partes portiones conteruntur. deinde
de uinû lene instillatur, et pastilli fiunt: qui singuli habeant .P. .xz;
hiq; singuli quotidie mane ieiuno dantur.

De pessis. Caput. XXI.

Acc tria compositionum genera: idest quæ in malagmatis, pastillis, emplastrisq; sunt. maximû, præcipueq; uarium usum
præstant. Sed alia quoq; utilia sunt. ut ea quæ foeminis subiciuntur (πεσσις græci uocant) Eorû hæc proprietas est, medicamenta
composita molli lana excipiuntur, eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

Ad sanguinem autem euocandû canneis duabus adijcitur nistri .P. .xii. aut alij semen cõteritur. adijcitur myrrhæ paululum, et unguento susino miscetur, aut cucumeris siluestris
pars interior ex lacte muliebri diluitur.

Ad uulnam molliendam.

Ad uulnam molliendam oui uitellus, et foenum græcum, et
rosa, et crocum temperantur. Aut claterij .P. .xz. salis tantundem, uiae taminia .P. .xvi. nulle excipiuntur.

Alia pessi compositio ad idem valens.

a Vt Boetho auctore, croci resinæ terebinthinæ, singulorum
P. XIII. myrræ. P. X. ZZ. rosæ. P. XI. seu vitulini. P. X. Z.
ceræ. P. XII. misceantur.

AD inflammationes vuluæ Numenij, Pessus.

Prima autem aduersus inflammationes vuluæ Numenij com-
positio est: quæ habet croci. P. X. Z. ceræ. P. XI. butyri. P. X.
VIII. adipis anserinæ. P. XII. vitellos coctos duos, rosæ
minus cyatho.

Ad eijciendum è vulua infantem mortuum.

f I uero infans intus decessit: quo facilius eijciatur, malicorium
ex aqua terendum: coq; utendum est.

Si mulier initio locorum concidit, qua curatione utendum sit.

f I concidere initio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis
comburendæ, conterendæq; deinde his mel adijciendum est.
si non compræhendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

De medicamentis quibus aridis utimur, ad carnem super-
crescentem exedendam. Caput. XXII.

q Vadam autem mixturæ medicamentorum sunt: quibus ari-
dis neq; coactis utimur sic, ut inspergamus: aut cum aliquo
liquido mixta illinamus: quale est ad carnem supercre-
scentē exedendā. qd̄ habet squamæ, fuliginis thuris singulorū. P. XI.
æruginis. P. XII. Hæc aut eadem cum melle purgant ulcera: cum cerâ
implent. Myri quoq; & galla si paribus portionibus misceantur, corpus
consumunt: eaq; uel arida inspergere licet: uel excepta cadmia illinere.

Ad putrem carnem continendam ne ultra serpat, eamq;
leniter exedendam plures compositiones.

p Vtrem uero carnē continet, neq; ultra serpere patitur, &
leniter exest mel, uel cum lenticula, uel cum marrubio, uel
cum oleæ folijs ante ex uino decoctis. Item sertula campana
in mulso cocta, deinde contrita, aut calx cum cerato, aut amaræ nucis
cū allio sic, ut huius pars tertia sit: paulumq; his croci adijciatur. aut
quod habet spuma argenti. P. XVI. cornu bubuli combustum. P. XII.

LIBER

aluminis scissilis, thuris, singulorum. p. xiiii. gallæ. p. xviii. aristolochiæ. p. xx. Vehementius idem facit etiam adurendo, auripigmentum cum chalcitide, aut nitro, aut calce, aut charta combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio quæ habet chalcitidis, capitulorum punici mali, aloes, singulorum. p. xii. aluminis scissilis, thuris, singulorum. p. xiiii. gallæ. p. xviii. aristolochiæ. p. xx. vallis quantum satis sit ad ea cogenda. Vel catharides. p. xi. sulphuris. p. xi. lolij. p. xiii. Quibus adijciatur picis liquidæ quantum satis est. adiungendum vel chalcitis quoque cum resina, et ruta mixta, aut cum eadem resina: diphryges, aut uua aminia cum pice liquida. Idem uero possunt feces vini combustæ, et calcis, et nitri pares portiones, uel aluminis scissilis. p. xxz. thuris sandaracæ, nitri singulorum. p. xi. gallæ. p. xviii. aristolochiæ. p. xx. mellis quantum satis est.

Hieræ compositio.

St etiam hieræ compositio. quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum. p. xii. aloes, thuris, aluminis scissilis, singulorum. p. xiiii. Aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum. p. xviii. malicorij contriti. p. xx.

Iudæi compositio.

St iudæi: in qua sunt calcis partes duæ, nitri quæ ruberrima pars tertia. quæ urina impuberis pueri cogitur, donec strigmentum crassitudo sit. Sed subinde is locus: cui id illinitur: morificandus est.

Iolæ compositio.

T iolas, chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum. p. xi. calcis. p. xii. auripigmenti tantumdem miscebat.

Ad sanguinis profluvia, uel ex membrana cerebri, uel alijs locis et ad cancerum, et ad inducendam cicatricem, et ad coerendam carnem crescentem.

I uero ex membrana: quæ super cerebrum est, profluit sanguis, vitellus combustus et contritus inspergi debet. Si alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamæ æris, singulorum. p. xi. sandaracæ. p. ii. marmoris cocti. p. xiiii inspergi debet. Eadem cancro quoque obsistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ æris, thuris fuliginis, singulorum. p. xii. calcis. p. p. iiii. Eadem incrementem quoque carnem coercent.

Timei compositio ad ignem sacrum, uel cancerum.

Inuens autem ad ignem sacrum, uel ad cancerū, his utebatur.
 Myrræ. P. XII. thuris, atramenti sutorij, singulorum. P. XIII.
 sandaracæ, auripigmenti, squamæ æris, singulariū. P. XIII.
 galle. P. XVI. cærussæ combustæ. P. XVIII. Eadem uel arida insper-
 sa, uel melle excepta idem præstant.

Ad sternutamenta excitanda.

Sternutamenta uero, uel albo ueratro, uel struthio coniecto
 in naves excitantur, uel his mixtis: piperis, ueratri albi, sin-
 gulorum. P. XZ. castorei. P. X. spumæ nitri. P. XI. struthij. P. XIII.

Gargarizationes quibus fieri debeant.

Gargarizationes autem aut lenandi causa fiunt, aut reprimē-
 di, aut euocandi. Lenat lac, cremor uel ptisanæ, uel furfurū.
 Reprimunt aqua, in qua uel lenticula, uel rosa, uel rubus, uel
 cotoneum malum, uel palnula decoctæ sunt. Euocant, sinapi, piper.

De antidotis, & quibus malis opitulentur. Capit. XXIII.

Nitidota raro, sed præcipue interdum necessaria sunt: quia
 grauissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem datur col-
 lisis corporibus uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel
 uiscerum, laterum, faucium, interiorumq; partium doloribus. Maxime
 autem desideranda sunt aduersus uenena uel per morsus, uel per ci-
 bos, aut potiones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

Num est: quod habet lacrymæ papaueris. P. XZ. acori, ma-
 lobathri. P. XV. iridis illiyrice, gummi, singulorum. P. XII.
 anesi. P. XIII. nardi gallica, foliorum rosæ aridorū, carda-
 momi, singulorum. P. p. IIII. petroselinū. P. p. IIII. Z. folij. P. p. V. castæ
 nigre, silis, bdellij, balsami, seminis piperis albi, singulorum. P. XZ. sty-
 racis. P. V. Z. myrræ, oppoponacis, nardi syrii, thuris masculi, hypocisti-
 dis succi, singulorum. P. XVI. castorei. P. XVI. costi, piperis albi, galbani,
 resinæ terebinthine, croci floris, iunci rotundi, singulorum. P. VI. Z.
 dulcis radicis. P. p. VIII. Z. Quæ uel melle, uel passo excipiuntur.

LIBER

Aliud antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus
Ptolemæo regi composuit.

Iterum quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse,
atq; Ambrosia nominasse: ex his constat. Costi, thuris masce-
li, singulorū. P. p. V. piperis albi. P. p. Z. floris iunci rotundi. P.
II. cinnamomi. P. p. III. casia nigræ. P. p. IIII. croci ciliij. P. p. IIII.
Z. myrræ quàm stacten nominat. P. p. V. nardi indici. P. p. V. Z. quæ
singula contrita melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendum est id:
quod ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione vini diluatur.

Antidotum Mithridatis.

Obilissimum autem est Mithridatis, quod cotidie sumendo
rex ille dicitur aduersus uenenorum pericula tutum corpus
suū reddidisse. in quo hæc sunt, costi. P. p. S. Z. acori. P. p. V.
hypici, cumini, sagpeni, agatæ suci, iridis illyricæ, cardamomi, singu-
lorū. P. p. II. anesi. P. p. III. nardi gallici, gentiæ æradias, aridorū ro-
sæ foliorum, singulorū. P. p. IIII. papaueris lacrymæ, petroselinū, sin-
gulorū. P. p. IIII. Z. casia, filis lolij, piperis longi, singulorū. p. p. XVI.
syracis. p. p. V. Z. castorei, thuris hypocistidis suci, myrræ, opoponacis, sin-
gulorum. p. p. VI. Z. malobathri folij. XVI. floris iunci rotundi, resinæ
terebinthinæ, galbani, dauci cretica seminis, singulorū. P. p. VI. Z. nar-
di, opobalsami, singulorū. P. p. VI. Z. thlappis. p. p. XV. ZZ. radice pon-
ticæ. p. p. VII. croci, Zinziberis, cinnamomi, singulorum. p. p. XVIII. r.
Hæc contrita melle excipiuntur: Et aduersus uenenum, quod magni-
tudinem nucis græcæ impleat, ex uino datur. In cæteris autem affe-
ctibus corporis pro modo eorū, uel quod ægyptiæ fabæ, uel quod Erui
magnitudinem impleat, satis est.

DE acopis. Caput. XXIIII.

Copa quoq; utilia nervis sunt: quale est quod habet floris
iunci rotundi. p. p. II. ZZ. costi, iunci quadrati, lauri baatarum,
ammōiaci, cardamomi, singulorū. p. p. IIII. Z. myrræ, æris
cōbusti singulorū. P. p. VII. iridis illiricæ, cere singulorū. P. p. XIII.
alexadrini calami, iunci rotundi, aspalathi, xylobalsami, singulorum
P. p. XVIII. seu. P. I. unguenti irini cyathum.

Acopum αῶδες nervis utile.

Iterum quod αῶδες uocant, hoc modo fit: aeræ. P. Z. olei
tantundem, resinæ terebinthinæ ad nucis inglandis magni-
tudinem simul incoquantur: deinde infusa in mortario te-
runtur:

runtur, instillaturq; subinde quàm optimè mellis acetabulum: tum iri
ni unguenti, & rosæ terni cyathi.

Ex ipsa ad ulcera purganda, & implenda.

Ex ipsa autem græci vocant, liquida quæ illinuntur. Qua-
le est quod fit ad ulcera purganda, & implenda, maximo
inter nervos paribus portionibus inter se mixtis, butyri, me-
dulle vitulinæ, seu vitulini, adipis anserinæ, ceræ, mellis, resinæ tere-
binthinæ, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur: deinde
liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis pur-
gat. Magis uero emollit: si pro rosâ cypirus infunditur.

Ad sacrum ignem.

Ad sacrum ignem spumæ argenti. P. XVI. corni bubuli com-
busti. P. XII. conteruntur, adijciuntq; inuicem uinum, & id
quod specialiter sil uocatur, & myrtæ: donec utriusq; terni
cyathi coniungantur.

De catapotijs. Caput. XXV.

Catapotium ad somnum accersendum, & leuationem
doloris, & simul ad concoquendum.

A catapotia quoq; multa sunt, uarijsq; de causis fiunt. αὐτοδυνα
uocant quæ somno dolorem leuant. Quibus uti: nisi nimis
necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex uehementibus me-
dicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendū:
quod habet papaueris lacrymæ, galbani, singulorum. P. XI. myrrhæ,
castorei, piperis, singulorum. P. XII. Ex quibus quod erui magnitudi-
nem habet, satis est deuorasse.

Catapotium ualentius ad somnum.

Iterum stomacho peius, ad somnū ualentius ex his fit, mā-
dragoræ. P. Z. apij seminis, item hyoscyami seminis, singulo-
rū. P. XIII. Quæ ex uino teruntur. Vinum autem eiusdē
magnitudinis: quæ supra posita est: abunde est sumpsisse.

Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Iue autem capitis dolores, siue ulcera, siue lippitudo, siue
dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta,
Aurelij Cor. k

LIBER

sive inflammatio uulue est, siue coxa, siue iecur, aut lienis, aut latus torquet, siue uitio locorum aliqua prolabitur, et obmutescit, occurrat dolori per quietem eiusmodi catapotium. Silis, acori, rutae siluestris seminis, singulorum. P. p. I. castorei, cinnamomi, singulorum. P. XII. papaueris lacrymae, panaces, radices mandragorae, malorum aridorum, iun. rotundi floris, singulorum. P. p. II. piperis grana. LVI. Haec per se contrita, rursus insillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, et potui datur.

Catapotium aliud, ad multa ualens.

Vnus etiam siluestris papaueris, cum iam ad excipiendam lachrymam maturum est, manipulus qui manu comprehendere potest, in uas demittitur, et superinfunditur aqua: quae id contegit, atque ita coquitur. Vbi iam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus proijcitur, et cum eo humore passi pari mensura misceatur, infusetque, donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapota ex eo sunt ad nostrae fabae magnitudinem, habentque usum multiplicem. Nam et somnum faciunt uel per se assumpta, uel ex aqua dati, et aurium dolores leuant, adiectis exiguo modo rutae succi, ac passi. Et tormina supprimunt ex uino liquata, et inflammationem uulue coercet mixta cerato ex rosa facto: cum paulum his croci quoque accessit, et ex aqua fronti inducitur, pituitam in oculos decurrentem tenent.

Catapotiū ad inducendū somnū: quod uulua dolens prohibuit.

Item si uulua dolens somnum prohibuit, croci. P. XII. anesi, myrrhae, singulorum. P. p. I. papaueris lacrymae. p. p. XIII. autae seminis. p. XVIII. miscentur, excipiunturque uino uetere, et quod lupini magnitudinem habet in tribus cyathis aquae diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

Ad iecur sanandum.

Ad sanandum iecur uiri. P. X. Z. croci, myrrhae, nardi gallici, singulorum. P. XI. melle excipiuntur, daturque quod aegyptiae fabae magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

Ad lateris dolores finiendos, piperis, aristolochiae, nardi, myrrhae pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

D thoracis, nardi. P. XI. thuris, casia, singulorū. P. XIII. myrrhæ, cinnamomi, singulorū. P. XVI. croci. P. XVIII. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis hemina tres.

Catapotium Athenionis ad tussim.

D tussim Athenionis, myrrhæ, piperis, singulorum. P. p. XI. castorei, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. Quæ separatim contusa postea iunguntur, et ad magnitudinem fabæ nostræ bina catapotia mane, bina noctu dormituro dantur.

Catapotium Heraclidis tarentini ad tussim, et somnum.

I tussis somnum prohibet, ad utranq; Heraclidis tarentini croci. P. XI. cinnamomi. castorei, papaueris lacrymæ, singulorū. P. XI. myrrhæ, pipis longi. costi, galbani, singulorū. P. Z.

Catapotium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.

Vod si purganda sunt ulcera in faucibus tussientibus, panaces, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum. P. X. galbani. P. Z. hyssopi. P. Z. conterenda sunt. hisq; hemina mellis adiungenda, et quod digito excipi potest, deuorandum est.

Collice castij medici.

Collice vero Castij ex his constat, croci, anesi, castorei, singulorū. P. XIII. petroselin. P. XIII. piperis et longi, et rotundi, singulorum. P. XV. papaueris lacrymæ, iunci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum. P. XVI. Quæ melle excipiuntur. Id autem et deuorari potest, et ex aqua calida sumi.

Ad infantem mortuum, aut secundas expellendas.

Infantem uero mortuum, aut secundas expellit aquæ potio, cui salis ammoniaci. P. XI. aut cui dictami cretici. P. XI. adiectum est.

Laborantibus ex partu quid dari debeat.

Ex partu laborantibus erisimum ex uino tepido ieiunæ dari debet.

Ad adiunandam uocem.

Uocem adiunat thuris. P. XI. in duobus cyathis uini datum.

Aduersus difficultatem urinae.

Aduersus urinae difficultatem, piperis longi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris lacrymæ, croci, costi uncia singula, styraeis, resinæ terebinthinæ. P. sextantes, mel, absinthij cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ ægyptiæ et mane, et conato dari debet.

k ij

Arteriace uero hoc modo fit: cassiæ, iridis, cinnamomi, nardi, myrrhæ, thuris, singulorum. P. ꝯ. I. croci. P. ꝯ. I. piperis grana. ꝯ. XX. ex passi tribus sextarijs decoquantur: donec melis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhæ, thuris, singulorum. P. ꝯ. I. coniunguntur in passi eundem modum, eodemq; modo decoquantur. Aut eiusdem passi hemina tres usq; eo coquantur: donec extracta inde gutta indurescat, & adiçatur tritæ cassiæ. P. ꝯ. I.

De quinq; generibus noxarum corporis, & primo de uulneribus quæ maxime per tela inferuntur. Cap. XXVI.

Ubi facultates medicamentorū proposuerim, genera in quibus noxa corpori est: proponam. Ea quinq; sunt. Cum quid extrinsecus læsit: ut in uulneribus. Cū quid intra se ipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in uesica calculus. Cum quid increuit, ut uena quæ intumescens in uaricem conuertitur. Cum quid deest, ut cum curata pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus medicamenta. Alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his: quæ præcipue scalpellū, et manū postulant: nunc de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoq; curadi partem sicut priorem. Et ante dicam, de his quæ in quibet partem corporis incidunt. Tum de his, quæ certas partes infestant. Incipiam à uulneribus. In his aut ante oīa scire medicus debet: quæ insanabilia sunt: quæ difficilē curationē habeant: quæ promptiorē. Est. n. prudētis hominis: primum eū, qui seruari nō potest, non attingere, nec subire speciem eius ut occisi, quem fors ipsius peremit. Deinde ubi grauis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessarijs periclitantis in difficili rem esse: ne si uicta ars malo fuerit, uel ignorasse, uel sefellisse uideatur. Sed ut hæc prudenti uiro conueniunt, sic rursus histrionis est, paruā rē attollere, quo plus præstitisse uideatur. Obligatoriq; æquū est confessione præptæ rei: quo curiosius etiā circumspectat, ne, quod per se exiguum est malum, maius curantis negligentia fiat.

Quæ uulnera insanabilia sint.

Eruari nō potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui iocineris portæ, cui in spina medulla percussa est, cuiq; aut pulmo medius, aut ieiunum, aut tenuius intestinum, aut uentriculus, aut renes uulnerati sunt: cui uel circa fauces grandes nena, uel arterie præcisæ sunt.

Quæ vulnere difficilē curationem habeant.

IX autem ad sanitatē perueniunt: quibus ulla parte pulmo,
 aut iocineris crassum, aut membrana, quæ continet cerebrū,
 aut lienis, aut uulua, aut uesica, aut ullum intestinum, aut se-
 ptum transversum vulneratū est. Hi quoq; in præcipiti sunt: in qui-
 bus usq; ad grandes intusq; conditas uenas in alis, uel poplitibus
 mucro descendit. Periculosa etiam vulnere sunt, ubicunq; uenæ maio-
 res sunt. quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt.
 Idq; euenit non in alis tantum, atq; poplitibus, sed etiam in his ue-
 nis, quæ ad anum, testiculosq; perueniunt. Præter hæc malum vulnus
 est, quodcunq; in alis uel foeminibus, uel inanibus locis, uel in articu-
 lis, uel inter digitos est. Item quodcunq; musculum, aut neruum, aut ar-
 teriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

Quæ vulnere tutiorē curationem habeant.

Utissimum omnium quod in carne est. Et hæc quidem loco
 uel peiora uel meliora sunt. modo uero periculi facit quod-
 cunq; magnum est.

*Observationes quedam et ætatis, et corporis, et uitæ,
 et temporis in uulneribus.*

Liquid etiam in uulneris genere, figurāq; est. Nam peius
 est quod etiā collisum, quā quod tantū discissum est. adeo
 ut acuto quoq; quā retuso telo uulnerari commodius sit.
 Peius etiā uulnus est, ex quo aliquid excisum est: ex quo uero caro alia
 parte abscissa, alia dependet: pessima quæq; plaga in orbē est: tutissi-
 ma quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic, illi uel figu-
 ræ uulnus est: eo uel deterius, uel tolerabilius est. Quin etiam confert
 aliquid et ætas, et corpus, et uitæ propositum, et anni tempus, quia
 facilius sanescit puer uel adolescens, quā senior: ualens quā infir-
 mus: neq; nimis tenuis, neq; nimis plenus, quā si alterum ex his est.
 integri habitus, quā corrupti: exercitatus, quā iners: sobrius, et tem-
 perans, quā uino, ueneriq; deditus. Opportunissimumq; curationi tem-
 pus uernum est, aut certe: neq; feruens neq; frigidum, si quidem uulne-
 ra et nimis calor, et nimium frigus infestant: maxime tamen horū
 uarietas: ideoq; perniciosissimus autumnus est. Sed pleraq; ex uulne-
 ribus oculis subiecta sunt: quorundam ipsæ sedes indicat sunt, quas
 alio loco demonstrauimus, cum positus interiorum partiū ostendimus.
 Veruntamen quia quedam uicina sunt, interest quoq; uulnus in sum-

Aurelij Cor.

k iij

ma parte sit, an penitus penetraverit: necessarium est notas subijcere, per quas quid intus actum sit, scire possimus: et ex quibus vel spes, vel desperatio oritur.

Signa percussi cordis.

i Citur corde percusso, sanguis multus effertur: uenæ languescunt: color pallidissimus: sudores frigidi, maliq; odoris: tamquam irrorato corpore oriuntur: extremisq; partibus frigidis matura mors sequitur.

Signa pulmonis icti.

p Vlmone uero icto, spirandi difficultas est: sanguis ex ore spumas: ex plaga rubens: simulq; etiam spiritus cum sono fertur in uulnus inclinari iuvat: quidam sine ratione consurgunt. Multi, si in ipsum uulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

Signa iocineris uulnerati.

i Ocineris autem uulnerati notæ sunt, multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis: ad spinam redacta præcordia: in uentrem cubandi dulcedo: punctiones, doloresq; usq; ad iugulum, iunctumq; ei latus scapularum: os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus uomitus accedit.

Signa percussorum renium.

r Enibus uero percussis, dolor ad inguina, testiculosq; descendit: difficulter urina redditur: eaq; aut est cruenta, aut cruor fertur.

Signa uulnerati lienis.

a T liene icto sanguis niger à sinistra parte prorumpit: præcordia cum uentriculo ab eadem parte indurescunt: sitis ingens oritur: dolor ad iugulum, sicut iocinere uulnerato uenit.

Signa percussæ uulnæ.

a T cum uulua percussa est, dolor inguinibus, et coxis, et femoribus est. sanguinis pars per uulnus, pars per naturale descendit: uomitus bilis insequitur. Quædam obmutescunt: quædam mente labuntur: quædam sui compotes: nervorum, oculorumq; dolore urgeri se consentiunt: morientesq; tandem eadē, quæ corde uulnerato, patiuntur.

Signa percussi cerebri, uel membranæ eius.

In cerebrum membranæ uel eius uulnus accepit: sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit: fereq; bilis uomitus insequitur. Quorundam sensus obtunduntur: appellatiq; ignorant. Quorundam trux uultus est: quorundam oculi quasi resoluti huc, atq; illuc mouentur. fereq; tertio, uel quinto die delirium accedit. multorum etiam nervi distenduntur. Ante mortem autem pleriq; fascias, quibus caput deligatum est: lacerant: ac nudum uulnus frigori obijciunt.

Signa percussi stomachi.

Bi stomachus autem percussus est: singultus, et bilis uomitus insequitur. Siquid cibi, uel potionis assumptum est, ea redditur cito. Venarum motus elanguescent: sudores tenues oriuntur: per quos extremæ partes frigescent.

Signa ieiuni intestini, et uentriculi uulnerati, et aliorum intestinorum.

Omnes uero ieiuni intestini, et uentriculi uulnerati notæ sunt. Nam cibi, et potio per uulnus exeunt: præcordia indurescunt. nonnunquam bilis per os redditur. intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina icta uel sterco, uel odorem eius exhibent.

Signa percussæ medullæ, quæ in spina est.

Medulla uero quæ in spina est discissa, nervi resoluuntur: aut distenduntur: sensus intercidit: interposito tempore aliquo sine uoluntate inferiores partes uel semen, uel urinam, uel etiam sterco excreant.

Signa septi transversi percussi.

¶ T si septum transversum percussum est, præcordia sursum contrahuntur: spina dolet: spiritus rarus est: sanguis spumans fertur.

Signa uesicæ uulneratæ.

¶ E si uero uulnerata dolent inguina. quod super pubem est: intenditur. pro urina sanguis, aut ex ipso uulnere urina descendit: stomachus afficitur. itaq; aut bilem uomunt: aut singultuant: frigus, et ex eo mors sequitur.

De sanguine, et sanie, et pure, et eorum specibus quando uel meliora, deteriora uel sint.

¶ Is cognitis etiam nunc quædam alia noscenda sunt ad omnia uulnera, ulceraq; de quibus dicturi sumus: pertinentia. Ex his aut exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est.

k iiij

LIBER

Sanies est tenuior hoc, varie crassa, et glutinosa, et colorata. Pus crassissimum, albidissimumque; glutinosius et sanguine, et sanie. Exit aut sanguis ex vulnere recenti, aut iam sanescente. Sanies est inter utrumque tempus. pus ex ulcere iam ad sanitatem spectante. Rursus et sanies, et pus quasdam species graecis nominibus distinctas habent. Est enim quaedam sanies quae uel ἰχθῆρ, uel μελίμπος nominatur. Est pus quod ἐλαῶδες appellatur. ἰχθῆρ tenuis, subalbidus ex malo ulcere exit: maximeque ubi nervo laeso inflammatio secuta est. μελίμπος crassior, et glutinosior subalbida, melli; albo sub similis fertur. Haec quoque ex malis ulceribus ubi nervi circa articulos laesi sunt, et inter haec loca maxime ex genibus. ἐλαῶδες tenue subalbidum quasi unctum colore, atque pinguitudine, oleo albo non dissimile apparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus autem est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore uel liuidus uel niger, aut pituita mixtus, aut varius. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaque protinus eius vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itemque postea spes in his maior est, ex quibus melioris generis quaeque proueniunt. Sanies igitur mala est multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quae et ipsum ulcus et iunctam ei cutem erodit. Melior non multa modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. ἰχθῆρ autem peior est multus, crassus, subliuidus, aut subpallidus, glutinosus ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui caetera omnia contraria prioribus habet. μελίμπος autem mala est multa, et percrassa: melior quae et tenuior, et minus copiosa est. Pus inter haec optimum est. Sed id quoque peius est multum, tenue, dilutum, magisque si ab initio tale est. Itemque si colore sero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est. Praeter haec si male olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius. Itemque si leue est: si nihil olet: si aequale est. modo tamen conuenire et magnitudini vulneris, et tempori debet. Nam plus ex maiore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. ἐλαῶδες quoque peius est multum, et parum pingue, quo minus etiam quoque id ipsum pinguius, eo melius est.

Curatio aduersus profusionem sanguinis in vulneribus.

Vibis exploratis ubi aliquis ictus est, qui seruari potest: protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis sit profusio: ne ue inflammatio interimat. Si profusionem timemus, quod ex se de vulneris, et magnitudine eius, et ex impetu ructis sanguinis in-

telligi potest, sicut linamentis vulnus implendum est: supraque imponenda spongia ex aqua frigida expressa: ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescat, sepius linamenta mutanda sunt. Et si sicut parum valent, aceto madefacienda sunt. id uehemens ad sanguinem supprimendum est. Ideoque quidam id vulnere infundunt. Sed alius rursus metus subest: ne nimis ualenter ibi retenta materia magnam inflammationem postea moueat. quæ res effiat neque roden tibus medicamentis, neque adurentibus: et ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendum: quanuis plerique ex his sanguinem supprimunt. Sed si semel ad ea decurritur, potius quæ mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profusio uincuntur uenæ, quæ sanguinem fundunt, apprehendendæ: circaque id quod ictum est, duobus locis deligendæ, intercidendæque sunt, ut in se ipsæ coeant: et nihilominus ora præclusa habeant. ubi ne id quidem res patitur: possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque nervus, neque musculus est, ut puta in fronte, uel superiore capitis parte, commodissimum tamen est cucurbitulam admonere à diuersa parte, ut illuc sanguinis cursus reuocetur.

Curationes aduersus uulnerum inflammationem.

Aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu ea timeri possunt, ubi læsum est uel os, uel nervus, uel cartilago, uel musculus: aut ubi parum sanguinis pro modo uulneris fluxit. Ergo quotiens quid tale erit, sanguinem mature suppressere non oportebit: sed pati fluere dum tutum erit: adeo ut si parum fluxisse uidebitur: mitti quoque ex brachio debeat, utique si corpus inuenile, et robustum, et exercitatum est: multoque magis si id uulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus læsus uidebitur, præcidendus erit. Nam percussus mortiferus est: præcisus sanitatem recipit.

De glutinatione uulnerum.

Sanguine autem uel suppresso, si nimis erumpit: uel exhausto, si per se parum fluxit: longe optimum est, uulnus glutinari. Potest autem id uel quod in cute uel etiam in carne est: si nihil ei præterea mali accedit. Potest caro alia parte dependens, alia inherens: si tamen etiam num integra est, et coniunctione corporis fo uetur. In his uero quæ glutinantur duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte, sui debet: maximeque si discissa auris ima est: uel minus nasus, uel frons, uel buccæ, uel palpebra, uel labrum, uel circa

LIBER

guttur cutis, uel uenter. Si uero in carne uulnus est, hiatq; neq; in unius orae facile attrahuntur: sutura quidem aliena est. Imponenda uero fibulae sunt, ἀρτήρῃες γὰρ ἑλληνες nominant: quae oras, paulum tamen contrahunt: quo minus lata postea cicatrix sit. Ex his autem colligi potest, id quoq; quod alia parte dependens, alia inhærebit: si alienatum adhuc non est: suturam, an fibulam postulet. Ex quibus neutra ante debet imponi, quam intus uulnus purgatum est: ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim et in pus uertitur: et inflammationem mouet: et glutinari uulnus prohibet. ne linamentum quidem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est: inibi relinquendum est. nam id quoq; inflammat. Compræhendi uero sutura, uel fibula non cutem tantum, sed aliquid etiam ex carne: ubi suberit hæc, oportebit quo ualentius hæreat, neq; cutem abrumpat. Vtraq; optima est ex acia molli non nimis torta, quo uentius corpori insadat. Vtraque neq; nimis rara, neq; nimis crebra inicienda est. Si nimis rara est, non continet: si nimis crebra est, uehementer afficit: quia quo sæpius acus corpus transit, quoq; plura loca iniectum uinculum mordet, eo maiores inflammationes oriuntur: magisq; æstate. neutra etiam uim ulam desiderat. sed eatenus utilis est, quia cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Ferè tamen fibulae latius uulnus esse patiuntur. Sutura oras iungit: quæ ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto debent: ut si quid intus humoris concreuerit, sit qua emanet. Si quod uulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet: deinde omni uulneri primo imponenda est spongia ex aceto expressa. si sustinere aliquis acuti uim non potest: uino utendum est. Leuis plaga uiuatur etiam si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. sed ea quoque modo imposita est: dum madet, prodest. itaq; ut inarescat, non est committendum. Licetq; sine peregrinis, et conquisitis, et compositis medicamentis uulnus curare. sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet: quod sine seuo compositum sit ex his, quæ cruentis uulneribus apta esse proposui. Maximèq; si caro est: barbarum: si nerui, uel cartilago, uel aliquid ex eminentibus, quales aures, uel labra sunt, Polybi sphragidim. Alexandrinum quoq; uiri de neruis idoneum est: eminentibusq; partibus ea, quam greci πόλινου οὖρον uocant. solet etiam colliso corpore exigua parte findi cutis. quod ubi incidit, non alienum est, scalpello latius aperire: nisi muscoli, neruiq; iuxta sint: quos incidi non expedit. ubi satis deductum est, medicamentum imponendum est. At si id quod collisum est, quantum parum diductum est: latius tamen aperiri propter neruos, aut musculos non licet: adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extrahant, præ-

capueq; ex his id quod p̄tōdes uocari proposui. Non alienum est etiā
am ubicunq; uulnus graue est, impositum, quo id inuetur, insuper cir
cundare lanam succidam ex aceto, & oleo: uel cataplasma; si mollis
is locus est, quod leniter reprimat. Si nervosus, aut musculosus: quod
emolliat.

Quomodo uulnus ligari conueniat.

f Ascīa uero ad uulnus deligandum lintea aptissima est: eaq;
lata esse debet, ut semel iniecta non uulnus tantum, sed pau
lum utrinq; etiā oras eius comprehendat. Si ab altera par
te atro magis recessit, ab ea melius attrahitur. Si aeq; ab utraq; trās
uersa comprehendere oras debet: aut si id uulneris ratio non pati
tur: media primum iniecienda est, ut tum in utranq; partem ducatur.
sic autem deliganda est: ut & contineat, neq; astringat. quod non
continetur, elabitur. quod nimis astrictum est, cancro periclitatur.
Hyeme saepius fascia circuire debet: aestate quotiens necesse est: tum ex
trema pars eius inferioribus actu assuenda est. nam nodus uulnus
lædit: nisi tamen longe est. illo neminem decipi decet, ut propriam ui
serum curationem requirat: de quibus supra posui. Nam plaga ipsa
curanda extrinsecus uel sutura, uel alio medianæ genere est. In uisce
ribus nihil mouendum est: nisi aut si quid ex iocinere, aut liene, aut
pulmone duntaxat extremo dependeat: præcidatur. alioquin uul
nus interius ea uictus ratio, eaq; medicamenta sanabunt: quæ cuiq;
uiseri conuenire superiore libro proposui.

De ratione uictus, & notis uulnerum, curationibusq; eorum.

h Is ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est: usq;
si graue uulnus est: abstinere quantum uires patiuntur ante
inflammationē a cibo debet. bibere donec sitim finiāt aquā
calidam. uel si aestas est, neq; febris, neq; dolor est: et frigidam. adeo
tamen nihil perpetuum est. sed semper pro uiribus corporis, æstimā
dum ut imbecillitas etiā cibum protinus facere necessarium possit:
tenuem scilicet & exiguum, qui tantum sustineat. Multiq; etiam ex
profluuio sanguinis inter morientes ante ullam curationem uino re
ficiendi sunt: quod alioquin inimicissimum uulneri est. nimis uero
intumescere uulnus, periculosum: nihil intumescere: periculosissimum
est. illud inditum est magnæ inflammationis: hoc emortui corpo
ris. Protinusq; si mens homini consistit: si nulla felix accessit: scire li
cet mature uulnus sanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet,

LIBER

si in magno ulnere, dum inflammatio est: permanet. Illa pernicio-
sa est, quæ uel leui ulneri superuenit: uel ultra tempus inflammatio-
nis durat: uel delirium mouet: uel si neruorū rigor, aut distentio, quæ
ex ulnere orta est: eam non finit. Vomitus quoq; biliosus non uolun-
tarius, uel protinus ut percussus est aliquis, uel dum inflammatio ma-
net, malum signum est, in his duntaxat, quorum uel nerui uel etiam
neruosi loci ulnerati sunt. Spōte tamen uomere non alienum est, præ-
cipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neq; protinus post cibum, neq;
iam inflammatione orta: neq; cum in superioribus partibus plaga est.
Biduo sic ulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendq; sa-
nies ex aqua frigida est: eademq; rursus iniicienda sunt. Quinto iam
die quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto
ulnere considerandus color est. Quod si liuidus, aut pallidus, aut ua-
rius, aut niger est: scire licet malum ulnus esse. idq; quandoq; ani-
maduersum est terrere nos potest. album, aut rubicundum esse ulcus,
commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculū ostendit.
bona signa sunt ubi hæc sine dolore tenuis et mollis est. Sed si gluti-
natur ulnus, aut leniter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ pri-
mo fuerunt. Si grauis inflammatio est, neq; glutinādi spes est, ea quæ pus
moueant: aquæ quoq; calidæ necessarius usus est, ut et materiam dige-
rat: et duritiam emolliat: et pus citet. Ea sic temperanda est, ut et
manu contingenti iocunda sit: usq; eo adhibenda, donec aliquid ex tu-
more minuisse, coloremq; ulceri magis naturalem reddidisse uideatur:
maximèq; si grande ulnus est, *τετραπόρμακον*: si in articulis, digitis,
locis cartilagineis *πυρρῶδες*. Post id fomentum si lata plaga non pa-
tet: imponi protinus emplastrum debet: et si latius hiat, illud empla-
strum liquari ex irino unguento oportet: eoq; illita linamenta disponi
per plagam: deinde emplastrum supra dari, et super id succidam la-
nam: minusq; etiam, quam primo fisciæ astringendæ sunt.

Curaciones propriæ articulorum.

Ropriæ quedam in articulis uisenda sunt: in quibus si præ-
cipue **p** si nerui sunt, qui continebant: debilitas eius partis sequitur.
Si id dubium est: et ex acuto telo plaga est: ea transversa
commodior est. Si retuso et graui est, nullum in figura discrimen est.
At uisendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo na-
scitur: albumq; et crassum diu fertur: neruum præcsum esse credibi-
le est. Magis quoq; maiores dolores, inflammationesq; quo maturius
excitatae sunt. Quamuis autem non abscissus neruus est: tamen si cir-
ca tumor durus diu permanet: necesse est et diuturnum ulcus esse:

et sano quoque eo tumorem permanere futurumque est, ut tarde membrum id extendatur uel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, ubi recuruato articulo curatio adhibita est, quam in recuruando eo, quod rectum continuerimus. Coll. cari quoque membrum: quod ictum est ratione certa debet. Si glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est: ut in neutram partem inclinatum sit. Si iam plus profuit, ut deuexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moueri et ambulare nisi sanis alienum est. Minus tamen his est periculosum, qui in capite uel brachijs, quam qui inferioribus partibus uulnerati sunt. Minimeque ambulatio conuenit: foemine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo cubabit, tepidus esse debet. Balneum quoque, dum parum uulnus purum est: inter res infestissimas est. Nam id et humidum et sordidum reddit: ex quibus ad cancerum transitus esse consuevit. Lenis frictio recte adhibetur, sed his partibus, quae longius absunt à uulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

Inflammatione finita, uulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta, supraque id, emplastrum, uel *ερεχάκη* uanor dandum est. Tum demum uero purum uulnus est: cum rubet, ac nimium neque siccum neque humidum est, ac quodcumque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est. Quod aut pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum est: id purum non est.

Quomodo uulnus implendum est.

Vergato, sequitur ut impleatur, iamque calida aqua catenus necessaria est, ut sanies remoueatur. Lanae succidae superuacuius usus est. Lota melius circundatur. Ad implendum autem uulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua. Itaque ea adhiberi non alienum est, ut butyrum cum rosa: exigua mellis parte, aut cum eadem parte, aut cum eadem rosa *τεροακή* uanor, aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum. Cibi boni succi, uittatis omnibus acribus, sed iam plenioribus: Nam et auis, et uenatio, et suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienum est. Itemque usque ad cicatricem, si nerui, musculi uel uulnerati sunt, etiam si alte caro, aut si plaga in summa cute generis tutioris est: potest non peruetus, modice tamen datum ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est: quod in neruosis locis musculosisque necessarium est: cerato quoque super uulnus utendum est. At si caro supercreuit, modice reprimat statim linamentum, uehementius squama aeris. Si plus est quod tolli opus est: adhibenda sunt etiam uehementio-

percreuit, modice reprimat: siccum linamentum, uehementius squamis æris. Si plus est quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum uehementiora, quæ corpus exedunt. Cicatricem post omnia hæc commodè inducit lycium ex passò, aut lacte dilutum, uel etiam per se impostum siccum linamentum.

De uulneribus: quæ extrinsecus per uulnera incidunt, curationibusq; eorū.

h I cordo felix curationis est. Sed quædam tamen periculosa incidere consuerunt. Interdum enim uetustas ulcus occupat, inducitq; ei callus, et circum oræ crassæ liuent: post quæ quicquid medicamentorū ingeritur, parum proficit, quod serè negligenter curato ulcere superuenit. Interdum uel ex nimia inflammatione, uel ob æstus immodicos, uel ob nimia frigora, uel quia nimis uulnus astrictū est, uel quia corpus aut senile, aut mali habitus est cancer occupat. Id genus à grecis diductum in species est, nostris uocabulis non est. Omnis autem cancer non solum id corrumpit: quod occupauit, sed etiam serpit: deinde alijs, alijsq; signis decernitur. Nam modo super inflammationem rubor ulcus ambit. isq; cum dolore procedit. ἐπιστῆλαι grecæ nominant. Modo ulcus nigrum est: quia caro eius corrupta est. Idq; uehementius etiam putrescendo intenditur. Vbi uulnus humidum est, et ex nigro ulcere humor pallidus fertur, maliq; odor est, caruncula corrupta, interdum etiam nerui ac membranae resoluuntur, specillumq; demissum descendit, aut in latus, aut deorsum, eoq; uitio nonnunq; os quoq; afficitur. modo oritur ea: quàm grecæ ὤμφαται appellant. Priores in qualibet parte corporis fiunt. Hæc in prominentibus membris idest inter ungues et alas, uel inguina, serèq; in senibus, uel his, quorū corpus mali habitus est. Caro in ulcere uel nigra, uel liuida est: sed sicca et arida, proximaq; cutis plerumq; sub nigris pusulis impletur, deinde ei proxima uel pallida, uel liuida, serèq; rugosa sine sensu est. Vltior in inflammatione est, omniaq; ea simul serpunt, vlcus: in locum pusulosum. Pusula: in eum, qui pallet aut liuet. Pallor aut liuor: in id quod inflammatum est. Inflammatio: in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta oritur, ingensq; sitis. quibusdam etiam delirium accedit. alij quauis mentis suæ cōpotes sunt, balbutiendo tamen uix sensus suos explicant. Incipit affici stomachus. Fit foedi spiritus ipse odor. Atq; initium eius quidem mali recipit curationem. Vbi uero penitus insedit, insanabile est. plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

Curatio ulceris.

¶ C pericula quidem uulnerum hæc sunt. Vt ut autem ulcus scalpello conijcendum est, excidendæq; eius oræ, et quicq;

quid super eas linet, æque inadendum. si navicula intus est: quæ his sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde ubi sanguis emissus, non tantumque vulnus est, eadem curatio adhibenda: quæ in recentibus vulneribus exposita est. si scalpello aliquis uti non vult: potest sanare id emplastrum: quod ex ladano fit, et cum ulcus sub eo exesum est: id, quo cicatrix inducitur.

Curatio erysipelarum.

I D autem quod ἐρυσιπέλας vocari dixi: non solum vulnere si peruenire: sed sine hoc quoque oriri consuevit: atque interdum periculum maius affert: utique si circa cervicem aut caput constitit. Oportet si vires patiuntur sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimentia et refrigerantia, maximeque cerussam solani succo: aut cimoliam cretam aqua pluviali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam cupresso adiectam, aut si tenerius corpus est: lentikulam. Quicquid impositum est: betæ folio contegendum est, et super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo. sulphuris. P. XI. cerussæ et croci, singulorum. P. XII. eaque cum vino conterenda sunt, et id his illinendum: aut si durior locus est, solani folia contrita suillæ adipi miscenda sunt, et illita linteolo super iniicienda. At si nigrities est: neque dum serpit: imponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedunt: repurgatumque ulcus sic, ut cætera nutriendum est. Si magis putre est: iamque procedit ac serpit: opus est vehementius erodentibus. Si ne hæc quidem evincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est: siccum est cum aduritur: post unctionem putris ulceris superponenda sunt, quæ crustas à vino resoluant, eas ῥαῖες græci vocant. ubi exciderunt, purgandum ulcus maxime melle et resina ulla. sed alijs quoque purgari potest: quibus purulenta curantur, eodemque modo ad sanitatem perducendum est.

Curatio Gangrenæ.

8 Angrenam vero si nondum planè tenet, sed adhuc incipit: curare non difficillimum est, utique in corpore iuuenili, et magis etiam si muscoli integri sunt: si nervi vel læsi non sunt: vel leviter affecti sunt: neque ullus magnus articulus nudatus est: aut carnis in eo loco paulum est: ideoque non multum, quod putresceret, fuit, constitutque eo loco vitium quod maxime fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est et intentione quadam proximum quoque locum male habet: usque eo sanum corpus concidere.

LIBER

Medicamenta uero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt: quæ pus
 mouere consueverunt ideoq; ne aqua quidem calida. Grauius quoque:
 quamuis reprimentia, aliena sunt. Sed his quàm leuissimis opus est. si
 perq; ea, quæ inflàmata sunt: utendum est refrigerantibus. Si nihilo
 magis malum consistit, uiri id quod est inter integrum ac uitiatum locum
 debet. Præcipueq; in hoc casu petendū non à medicamentis solum, sed
 etiam à uictus ratione præsidium est. Neq; enim id malum nisi cor-
 rupti uitioq; corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, ab-
 stinentia utendum. Deinde danda quæ per cibum potionemq; aluum:
 ideoq; etiam corpus astringant, sed ea leuia. Postea si uitium consistit:
 imponi super uulnus eadem debent: quæ in putri ulcere præscripta
 sunt. Ac tum quoq; plenioribus cibis uti licebit ex media materia, sic
 tamen non nisi aluum corpusq; siccantibus. aqua uero pluuiali frigi-
 da. balneum nisi iam certa fiducia reddite sanitatis est, alienum est,
 si quidem emollitum in eo uulnus cito rursus eodem malo afficitur.
 Solent uero nonnunq; nihil omnia auxilia proficere, ac nihilo minus
 serpere his cancer. Inter quæ miserum sed unicum auxilium est, ut cæ-
 tera pars corporis tuta sit, membrum quod paulatim emoritur, absci-
 dere. Hæ grauissimorum uulnerum curationes sunt. Sed ne illa qui-
 dem negligenda, ubi integra cute interior pars collisa est, aut ubi dera-
 sum, ac tritum'ue aliquid est, aut ubi surculus corpori infixus est, aut
 ubi tenue, sed altum uulnus insedit. In primo casu commodissimum
 est malicorium ex uino coquere, interioremq; eius partem conterere,
 & cerato miscere ex rosa facto, idq; supponere. deinde ubi cutis ipsa
 exasperata est, inducere lene medicamentum: quale λιπαρόν est. Dera-
 so uero detrictoq; imponendum est emplastrum τετραφάρμακον, minus
 endusq; cibus, & uinum subtrahendum. Neq; id: quia non habebit
 altiores ictus, contemnendum erit. Si quidem ex eiusmodi casibus
 sæpe canceri fiunt. Quod si leuius id erit, & in parte exigua, contenti
 esse poterimus eodem leni medicamento. Surculum uero, si fieri potest,
 oportet uel manu, uel etiam ferramento eicere. Si uel præfractus est,
 uel altius descendit: quàm ut ita fieri possit, medicamento euocandus
 est. Optime autem educit super imposita arundinis radix, si tenera
 est, protinus contrita, si iam durior, ante in mulso decocta. Cui semper
 mel adijciendum est, aut aristolochia cum eodē melle. Pessima ex sur-
 culis arundo est, quia aspera est. Eademq; offensa etiam in filias ha-
 stula est. Sed usu cognitum est utraq; aduersus alteram medicamen-
 tum esse. si contrita super imposita est. Facit autem idem in omnibus
 surculis quodcumq; medicamentum extrahedi uim habet. Idem altis-
 & uulnibusq; uulneribus aptissimum est. Priori rei Philocratis: huic He-

cætei

cati emplastrum maxime conuenit.

Quo modo cicatrix uulneri inducenda, purgandaq; sit.

Bi uero in quolibet uulnere uentum ad inducendum cicatricem est: quod per purgatis iam repletisq; ulceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur, deinde cum iam continenda est: sicut imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet: quo & reprimatur cicatrix, et colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix siluestris cucumeris praestat. Idem compositio, quae habet elaterij. P. XI. spumae argenti. P. XII. unguenti pond. XIII. Quae excipiuntur resina terebinthina: donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoq; cicatrices leniter purgat paribus portionibus mixta, aerugo, plumbum elotum, eademq; rosa cocta, siue ungtur cicatrix: quod in facie fieri potest: siue id ut emplastrum imponitur: quod in alijs partibus commodius est. At si uel excreuit cicatrix, uel concussa est, stultum est decoris causa rursus & dolore, & medicinam sustinere. Alioqui res utriq; suaturri patitur: Si quidem utraq; cicatrix exulcerari scalpello potest. si medicamentum aliquis manuul: idem efficiunt compositiones hae: quae corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniicienda sunt. Super concussam, impletia: donec utrunq; ulcus sanae cuti aequetur, & tum cicatrix inducatur.

De uulneribus quae per morsus inferuntur, eorumq; curationibus. Caput XXVII.

Ixi de his uulneribus, quae maxime p tela inferuntur. Sequitur ut de his dicam, quae morsu fiunt, interdum hominis, interdum simiae, saepe canis, nonnunquam ferorum animalium, aut serpentium. Omnis autem fere morsus habet quoddam uirus. Itaq; si uehemens uulnus est: cucurbitula admouenda est. si leuius: protinus emplastrum iniiciendum, praecipueq; Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, quae aduersus morsus proposui. si ea non sunt. uiride alexandrinum. si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his quae recentibus uulneribus acomodantur. Sal quoque his, praecipueq; ei, quod canis fecit, medicamentum est: si manus uulneri imponitur, superq; id duobus digitis uerberatur (Ex saniat enim) ac salsa mentum quoq; recte super id uulnus deligatur.

Aurelij Cor.

1

Curatio aduersus rabiosi canis morsum.

Curationes communes aduersus omnes morsus serpentium.

1145 exsurgat.

mus exsugit. Neq; hercules scientiam præcipuam habent hi qui psilli nominantur: sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam uenenum serpentis, ut quædam etiã uenatoria uenena, quibus galli præcipue utuntur: non gustu, sed in uulnere nocent. Ideoq; colubra ipsa tuto estur: ictus eius occidit: & si stupente ea, quod per quædam medicamenta circulatores faciunt: in os digitum quis indidit: neq; percussus est: nulla in ea salua noxa est. Ergo quisquis exemplum psylli secutus id uulnus exsuxerit, & ipse tutus erit: & tutum hominem præstabit. Illud ne intreat, ante debet attendere: ne quod in gingiuis, palato ue, alia ue parte oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco calido collocandus est sic, ut id, quod percussus erit, in inferiorem partem inclinetur. Si neq; qui exsugit: neq; cucurbitula est: sorbere oportet ius anserinum, uel ouillum, uel uitulinum, & uomere. Vium autem gallicum pullum per medium diuidere: & protinus calidum super uulnus imponere sic, ut pars interior corpori iungatur. Facit id etiã hædus, agnus ue discissus, & calida eius caro statim super uulnus imposita. emplastra quoq; quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumq; est uel ephesium, uel id quod ei subiectum est. præfensq; in aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est: necessarium est exsorbere potionem uini uini cum pipere, uel quidlibet aliud, quo calor mouendus est: ne humore intus coire patiatur. Nam maxima pars uenerorum frigore interimit. Omnia etiã urinam mouentia, quia materiam extenuant: utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium,
& primo aduersus ictum Aspidis.

h Acc aduersus oēs ictus cõmunia sunt. Vnus tamen ipse docuit, eum, quæ aspis percussit: acetum potius bibere debere.

Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri: qui cum ab hac ictus esset: et partim ob ipsum uulnus, partim ob immodicos æstus siti premeretur: ac locis siccis alium humorem nõ reperiret: acetum, quod forte secum habebat, ebibat: & liberatus est. Credo qm id, quauis refrigerandi uim habet, tamen habet etiã dissipandi. Quo fit ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo ui uerisimile est, spissescere quoq; intus humorem hominis ab eo discuti: & sic dari sanitatẽ.

Aduersus ictum scorpionis.

i N quibusdam etiã alijs serpentibus certa quædã auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimũ medicamentum est. Quidam contritum cum uino bibunt: quidam eodẽ modo contritum super uulnus imponunt: quidã super prunã

LIBER

eo imposito uulnus suffumigant undiq; ueste circumdata, ne is fumus dilabatur: tum carbonem eius, super uulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris, quam ὁλιόπριον graeci uocant: semen, uel certe folia ex uino. Super uulnus uero etiam fursures ex aceto, uel ruta siluatica recte imponitur, uel cum melle sal tostus. Cognoui tamen modicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

Aduersus aranei & scorpionis ictum.

e T ad scorpionis autem & ad aranei ictum allium cum ruta recte miscetur, ex oleoq; contritum super imponitur.

Aduersus Cerastris, & Dipsae, & Haemorrhoidis ictum.

a T si Cerastes, aut Dipsas, aut Haemorrhoids percussit: catapotium, quod aegyptiae fabae magnitudinem aequet, arefactum in duas portiones diuidendum est sic, ut ei rutae paulum adiungatur. Trifolium quoq; & mentastrum, & cum aceto panaces aequae proficiunt. Costumq; & cassia, et cinnamomum recte per potionem assumentur.

Aduersus Chersydri ictum & cerastris.

a Duerfus Chersydri uero ictum, panacis, aut laser, quod sit scrupulorum. IIIS. ꝯI. uel porri succus cum hemina uini sumendus est, et edenda multa satureia. Imponendum autem super uulnus stercus caprinum ex aceto coctum, aut ex eodem hordeacea farina, aut ruta, uel nepeta cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoq; uulnere, quod cerastes fecit, aequale ualeat.

Aduersus Phalangij ictum.

u Bi uero phalangium nocuit, praeter eam curationem, quae manus redditur, sepe homo demittendus in solium est, dandusq; ei myrrhae & uuae taminie par modus ex passi hemina: uel radicae semen, aut lolij radix ex uino, & super uulnus fursures ex aceto coctae: imperandumq; ut is conquiescat.

Aduersus ictus italorum anguium, qui minus terribiles peregrinis sunt.

u Erum haec genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt, maximeq; aestuosis locis gignantur. Italia, frigidioresq; regiones hac quoq; parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus quos satis proficit

herba betonica, uel cantabrica, uel centaurion, uel agrimonia, uel trixago, uel personina, uel marinae pastinacae singulae, binae uel triae et cum uino potui datae: et super uulnus impositae. Illud ignorari non oportet, ois serpentis ictum et ieiuni, et ieiunio magis nocere. Ideoque pernitiosissimae sunt, cum incubant. Vtilissimum quoque est, ubi ex anguibz metus est, non ante progredi, quam quid aliquis assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia uenena, uel cibo,
uel in potione assumpta.

Non tam facile his opitalari est, qui uenenum, uel in cibo, uel in potione sumpserunt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non a cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto uomere. Deinde, ubi praecordia exhausta, bibere antedidum. si id non est, uel merum uinum.

Specialia remedia aduersus quaedam uenena, et primo
aduersus cantharidas.

Vnt tamen quaedam remedia propria aduersus quaedam uenena, maximeque leniora. Nam si cantharidas aliquis ebibit: paucace cum lacte cotusa, uel galbano, uino adiecto dari, uel lac per se debeat.

Aduersus cicutam.

I cicuta: uinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est: deinde is uomere cogendus. posteaque iaser ex uino dandum. isque, si febre uacat: in calidum bainum mittendus. Si non uacat: ungendus ex calefactentus est. post quae quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum.

I hyoscyamum: feruens mulsam bibendum est: aut quodlibet lac, maxime tamen asinum.

Aduersus cerussam.

I cerussam: ius maluae, uel ius glandis ex uino contritae maxime praesunt.

Aduersus sanguisugam si epota est: et lac quod intus coit.

I sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. si lac intus coit, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto iaser.

Aurelij Cor.

l iij

LIBER

Aduersus fungos inutiles.

I fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut epota, aut
S cum sale & aceto edenda est. Ipsi uero hi & specie quidem
 discerni possunt ab utilibus, & cocturae genere idonei fieri.
 Nam siue ex oleo inferuerunt, siue piri surculus cum his inferunt,
 omni noxa vacant.

De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.

Dustis quoq; locis extrinsecus uis infertur. Itaq; sequi uide-
a tur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur folijs, aut
 lilij, aut lingue canina, aut betæ in uetere uino, oleoq; deco-
 ctis. Quorum quilibet protinus impositum ad sanitatem perducit.
 sed diuidi quoq; curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia re-
 primentiaq; primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculâ
 exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex priori
 bus est lenticula cum melle farina, uel myrrha, uel uino: creta cimo-
 lia cum thuris cortice contrita & aqua coacta, atq; ubi usus necessitas
 incidit: aceto diluta. Ex insequentibus quælibet *κατὰ*. sed idonea
 maxime est, quæ uel plumbi recrementum, uel uitellos habet. Est etiâ
 illa adustorum curatio, dum inflammatio est: impositam habere cum
 melle lenticulam. Vbi ea declinauit, farina cum ruta, uel porro, uel
 marrubio, donec crusta cadant. Tum erui cum melle, aut irim, aut
 resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit. Nouissime sicum lina-
 mentum.

De interioribus ulceribus, quæ aliqua corporum
 parte corrupta nascuntur. Cap. XXVIII.

De carbunculo, & eius curatione.

B his quæ extrinsecus incidunt ad ea ueniendum est, quæ
a interius corrupta aliqua corporis parte nascuntur. Ex quib-
 bus non aliud carbunculo peius. eius hæc notæ sunt. Rubor
 est: superq; eum non nimium pustulæ eminent: maxime nigrae: inter-
 dum subliuidæ, aut pallidæ. In his sanies esse uidetur: infra color ni-
 ger est. Ipsum corpus aridum & durius quàm naturaliter oportet.
 Circa quem quasi crusta est: eaq; inflammatione cingitur: neq; in eo
 loco lenari cutis potest: sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus ur-
 get: nonnunquam horror, aut febris oritur: aut uirumq;. Idq; uitium
 subter actis quasi quibusdam radicibus serpit: interdum celerius, in-
 terdum tardius: supra quoq; procedens inalbescit: dein liuidum fit,
 circumq; exiguae pustulæ oriuntur. Et si circa stomachum, fauces ue

incidit, subito spiritum saepe elidit. Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id graue est (nam non sentit: quoniam ea caro mortua est) finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta undique à uina carne deducta, quae trahit secum quicquid corruptum erat: purusque iam sinus curari potest implentibus. At si in summa cute uitium est: possunt succurrere quaedam uel exedentia tantum, uel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumque uero medicamentum positum est: si satis proficiet, protinus à uina corruptam partem resoluit. Certaque esse fiducia potest ferè, ut undique uitiosa caro excedat: qua huiusce rei medicamen exest. Si id non fit, medicamentum malo uincitur, utique ad usum non properandum est: sed in eiusmodi casu abstinendum à cibo, à uino est. Aquam liberaliter bibere expedit: magisque ea seruanda sunt, si febricula quoque accessit.

De carcinomate, et eius curatione.

On idem periculum carcinoma affert, nisi imprudentia curantis agitata est. Id uitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarum. Et iecore autè, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur: isque immobilis, inaequalis tumet: interdum etiam torpet. Circa eum inflatae uenae quasi recuruantur: haecque pallent, aut linent: nonnunquam etiam in quibusdam deliteant. Tactusque is locis alijs dolorem affert, in alijs cum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet: nonnunquam hisdem omnibus ulcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quae uocantur graeci *νοδουλώματα*: aspredine quadam et magnitudine sua. Colorque eius ruber est, aut lenticulae similis neque tuto fertur. Nam protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Saepe haemorrhoeus obmutiscit, atque eius anima deficit. Quibusdam etiam si id ipsum pressum est, quae circa sunt: intenduntur et intumescunt. Ob quae pessimum id genus est: ferèque primum id fit quod *καρκίνος* à graecis nominatur. Deinde ex eo id carcinoma quod sine ulcere est. Deinde ulcus ex eo thymum. Tolli nihil nisi *καρκίνος* potest: reliqua curationibus irritantur. Et quo maior uis adhibita est, eo magis quidam uis sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro adusserunt: quidam scalpello exciderunt. Neque ulli unquam mediana proficit: sed adusta protinus conata sunt et increuerunt, donec occiderent. Exarsa etiam post indu-

LIBER

etiam cicatricem tamen reuenterunt: & causam mortis attulerunt. Cui interim plerique nullam uim adhibedo, qua tollere id malum tentent: sed imponendo tantum lenia medicamenta, quae quasi blandiantur: quo minus ad ultimam senectutem perueniant, non prohibentur. discernere autem non habes quod curatione recipit à carcinomate, quod non recipit: nemo scire potest. sed tempore, & experimento. Ergo ubi primum id uitium notatum est: imponi debet medicamenta adurentia. si leuatur malum, minuunturq; eius inditia, procedere curatio potest & ad scalpellum, & ad usionem. si protinus irritatum est, scire licet iam carcinoma esse: remouendaq; sunt omnia acria, omnia uehementia. sed si sine ulcere is locus durus est: imponi ficum quam pinguis simam, aut potius des emplastrum satis est. si ulcus aequale est, ceratū ex rosa iniiciendum est: adijciendusq; ei puluis ex contrita testa: ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. si id nimium supercreuit: tentanda squama aeris est: quae lenissima ex adurentibus est: eatenus nequid eminere patiatur: sed ita, si nihil exacerbauit. sin minus, eodem cerato contenti esse debebimus.

De Theriomate, & eius curatione.

Et etiam ulcus, quod θηρίωμα graeci uocant. Id & per se nascitur: & interdum ulceri ex alia causa facto superuenit: color est uel lividus, uel niger: odor foedus, multus, & mucosus similis humor. Ipsum ulcus neq; tactum, neq; medicamentum sentit: prurigne tantum mouetur. at circa, dolor est, & inflammatio. Interdum etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. ad id quoq; malum serpit. quae omnia saepe intenduntur. Fitq; ex his ulcus, quod ἐρυσίπηλις graeci uocant: quia celeriter serpendo, penetrandoq; usq; ossa, corpus uorat. id ulcus inaequale est, caeno simile: inestq; multus humor glutinosus: odor intollerabilis, maiorq; q̄ pro modo ulceris inflammatio. Vtrunq; sicut omnis cancer, fit maxime in senibus: uel his, quorum corpora mali habitus sunt. Curatione utriusq; eadem est: sed in maiore malo magis necessaria. Ac primum à uictus ratione ordinandus est: ut quiescat in lectulo: ut primis diebus à cibo abstineat: aquā quam plurimam assumat. alius quoq; ei ducatur. dein post inflammationē cibum boni succi capiat: uitatis omnibus acerbis, potionis quantum uolet sic, ut interdum quidem aqua contentus sit. in coena etiam uini austeri aliquid bibat. non aequae tamen fame in his, quos ἐρυσίπηλις urget: atq; his qui θηρίωμα adhuc habebit, utendum erit. & uictus quidem talis necessarius est. Super ulcus uero

inspergenda arida aloë oenanthe est: et si parum proficiet, chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne nudatus est: contegendus ante linteolo est: ne sub eo medicamento aduratur. Si ualidioribus etiam nunc remedijs opus est: ad eas compositiones ueniendum est, quæ uehementius adurunt. Quicquid autem inspergitur, auerso specillo infundi debet. Super danda cum melle sunt uel linamenta, uel oleæ folia ex uino decocta, uel marrubium: eaq; linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso. Circaq; quæ tumor ex inflammatione est, imponenda quæ reprimunt cataplasmata. Si sub his nihil proficitur: ferro locus aduri debet: diligenter nervus, si qui apparent: ante contextis. Adustum uel medicamentis, uel ferro corpus primum purgandū, deinde implendū esse: apparere cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne, et eius curatione.

Acer quoq; ignis malis ulceribus annumerari debet. eius duæ species sunt. Alterum est subrubicandum, aut mixtum rubore, atq; pallore: exasperatumq; pustulas continuas, quarum nulla, altera maior est, sed plurimæ perexiguæ. In his semper ferè pus, et sæpe rubor cum calore est: serpitq; id nonnunquam sanescente eo, quod primum uittatum est: nonnunquam etiam exulcerato: ubi ruptis pustulis ulcus continuatur: humorq; exit: qui esse inter saniem, et pus uideri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueq; in plantis. Alterum autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublinidum, inæqualiter tamen, mediumq; sanescit extremis procedentibus: ac sæpe id quod iam sanum uidebatur, iterum exulceratur. At circa proximam cutis, quæ uitium receptura est: tumidior, et durior est: coloremq; habet ex rubro subnigrum. Atq; hoc quoq; malo ferè corpora seniores tentantur: aut quæ mali habitus sunt, sed in cruribus maxime. Omnis autem sacer ignis ut minimum periculum habet ex his quæ serpunt: sic propè difficillime tollitur. Medicamentum eius fortuitum est: uno die febris, quæ humorem noxium absumat. Cuius quo crassius, et albidius est: eo periculi minus est. Prodest etiam infra os ulcerum ledi: quo plus puris exeat, et id, quod ibi corruptum corpus est: extrahat. sed tamen si febricula accessit, abstinentia, lectulo, alui distictione opus est. In omni uero sacro igni neq; lenibus, et glutinosis cibis, neq; salis, et acribus utendum est: sed his quæ inter utrumq; sunt: qualis est panis sine fermento, piscis, hedus, aues, exceptoq; apro omnis ferè uenatio. Si non est febricula, et gestatio utilis

LIBER

est, & ambulatio, & uinum austerū & balneum. Atq; in hoc quoq; genere potio magis liberalis esse, quam cibus debet. Ipsa autem ulcera si mediocriter serpunt: aqua calida. Si uehementius, uino calido fouenda sunt. Deinde acu pusula quaecumq; sunt aperiendae. Tum imponenda ea: quae putrem carnem exedunt. Vbi inflammatio sublata, ulcusq; purgatum est: imponi leue medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonea in uino accta atq; contrita. Potest emplastrum uel Hieræ, uel *τηροφάρμακον*, cui quinta pars thuris adiecta sit. Potest nigra hedera ex uino austero accta. Ac si celeriter malum serpit: non aliud magis proficiat. Purgato ulcere: quod in summa cute esse proposui: satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficiunt.

De Chironeo ulcere, & eius curatione.

Chironeum autem ulcus appellatur, quod & magnum est, et c
habet oras duas, collosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neq; in ulcere, neq; in eius humore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est: nihil serpit: ideoq; nullum periculum affert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur: deinde iterum rumpitur: ulcusq; renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Super id imponi debet, quod & lene aliquid, & uehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa sit ex his. Squamæ æris: plumbi eloti combusti, singulorum. P. XIII. Cadmiæ, ceræ: singulorum. P. XVIII. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

De ulceribus quæ ex frigore in pedibus & manibus oriuntur, & eorum curationibus.

Iunt etiam ex frigore hiberno ulcera: maxime in pueris, et f
præcipue pedibus, digitisq; eorum, nonnunq; etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulae oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est: nonnunquam humor exit: sed non multus, qui referre uel pus, uel saniem uidetur. In primis multa calida aqua fouendum est: in qua rapa decocta, aut si ea non sunt: aliquæ uerbena ex reprimentibus. Si nondum ad apertum ulcus: æs, q̄ maxime calidum quis pati potest, admouendum est. Si iam exulceratio est: imponi debet alumen æqua portione cum thure contritum, cum uino adiecto: aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est: hic quoq; melius lenia medicamenta proficiunt.

De struma, & eius curatione.

Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quedam ex pure & sanguine quasi glandulae oriuntur. Quae uel praecipue fatigare medicos solent: quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt, et siue ferro, siue medicamentis curantur. Plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoque post medicamento est opus. Quibus id quoque accedit: quod longo spatio detinent. Nascentur maxime in ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque foeminarum se repperisse chirurgus Megeus auctor est. Propter haec et album ueratrum recte datur: atque etiam saepius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur: quae humorem, uel educant, uel dissipent: quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoque quidam uiuantur: quae exedunt: crustaque eum locum astringunt: tunc uero ut ulcus curant. Quaecumque autem ratio curandi est: corpus puro ulcere exercendum atque alendum est: donec ad cicatricem perueniat. Quae cum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet, eum: si anguem edit: liberari.

De furunculo, & eius curatione.

Furunculus uero est tuberculum acutum cum inflatione & dolore, maximeque ubi iam in pus uertit. Qui ubi adaperitus est: & exit, super apparet pars carnis in pus uersa: pars corrupta subalbida, subrubra: quem uentriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quae maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est: sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cetera desunt: imponi debent primum non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde si non repressit: quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidem est, uel resina, uel fermentum. Expresso pure nulla ultra curatio necessaria est.

De phymate, & eius curatione.

Phyma uero nominatur tuberculum furunculo simile: sed rotundius & planius: saepe etiam maius. Nam furunculus omni dimidij magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit: sed inflammatio, dolorque sub eo minores sunt. Vbi enisum est pus: eodem modo, apparet uentriculus.

LIBER

quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta caro in pus uertitur. Id autem in pueris & sepius nascitur, & facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur, & difficilius curatur. Vbi ætas indurauit, ne nascitur quidem. Quibus uero medicamentis disenteretur, supra propositum est.

De phygelo, & eius curatione.

φύγελον autem est tumor non altus, latus, in quo quiddam pusula simile est. Dolor, & stentioq; uehemens est: & maior quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricitat: idq; tarde maturescit, neq; magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in uertice, aut in alis, aut inguinibus. Panem ad similitudinem figuræ nostri uocant. atq; id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstraui. Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius uitium ad suppurationē spectans. Idq; ferè fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius: maximq; eos, qui uentrem infestauerunt. sepiusq; oculis expositum est. siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma uocari proposui: rubetq; cum calore, & paulopost etiam cum duritia, magisq; innocenter indolescit: & sitim, uigiliamq; exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest: maximeq; ubi altius pus mouetur. Sed cum siti, uigiliisq; sentiuntur intus aliquæ punctiōnes, & quod de subito durius non est, melius est: & quamuis non rubet: coloris tamen aliter mutati est. quæ signa iam pure oriente nascuntur. Tumor, ruborq; multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus uis materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant: qualia et aliis & pauloante in erysipela proposui. Si iam durior est, ad ea ueniendum est, quæ digerant, & resoluant: qualis est ficus arida contusa, aut fex mixta cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit: aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, ante ex mulso decoctæ. Licet etiā miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, uiscum: pōdusq; adijcere myrrhæ dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt: quæ supra explicui. Quod per hæc discussum non est, necesse est maturescat: idq; quo celerius fiat, imponenda est farina hordeacea, ex aqua cotta recte miscetur. Eadem autem hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina, proprietatesq; supra reddidi, recte fiunt. eademq; omnium curatio. tantum modo distat. Crudum est autem, in quo magis quasi uenarum motus est, & grauitas, & ardor, & distentio, & dolor, & rubor, & durities. Et si maior abscessus est, horror,

aut etiam febricula permanet, Penitusq; condita suppuratio. Si pro his, quæ alibi cutis ostendit, punctiones sunt, ubi ista se remiserunt, iamq; is locus prurit, et aut sublividus, aut subalbidus est: matura suppuratio est: eaq; ubi vel per ipsa medicamenta, vel etia ferro aperta est: pus debet emitti. Tum si qua in alis vel inguinibus sunt: sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoq; partibus, si una plagi exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, æq; linamenta supernuacua sunt. In reliquis parca tamen: nec, nisi plagi est, imponi debent. Commode uero vel super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle, aut malicorium ex uino coctum. Quæ et per se, et mixta idonea sunt. Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malua contrita: vel fœnigræci, lini'ue semen ex passo coctum super dandum est. Quicquid deinde impositum est, non astringi sed modice deligari debet. Illo nemine decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem induendam: conueniunt, quæ in uulneribus exposita sunt.

De fistulis et earum generibus, et curationibus.

Nonnunquam autem ex eiusmodi abscessibus, et ex alijs ulcerum generibus fistulæ oriuntur. Id nomen est ulcers alto: angusto: calloso. Fit in omni ferè parte corporis: habetq; quedam in singulis locis propria: prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem aliæ breues sunt: aliæ altius penetrant, aliæ rectæ intus feruntur, aliæ multoq; plures transuersæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplices'ue ab uno ore intus orsæ: quæ tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur: aliæ rectæ: aliæ flexæ, et tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa: aut cartilagine[m] penetrant, aut ubi neutrum horum subest: ad interiora perueniunt. Aliæ deinde facile, aliæ cum difficultate curantur. Atq; etiam quedam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem, adiuuatq; ipsum corpus si iuuenile: si firmum est. Inimicæ, contraria his sunt. Itemq; si fistula os uel cartilagine[m], uel neruum, uel musculos læsit: si articulum occupauit: si uel ad uesicam, uel ad pulmone[m], uel ad uulnam, uel ad grandes uenas, arterias'ue, uel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem penetravit. Ad intestina quoq; eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit: si corpus uel ægrum, uel senile, uel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fi-

LIBER

fistulam conuenit: ut quo tendat & quam alte perueniat, scire possi-
mus. simul etiam protinus humida, an siccior sit. quod extracto spe-
cillo patet. si uero os in uicino est, id quod disci potest: si iam nec ne
eo fistula penetravit, quatenus nocherit. Nam si molle est, quod ulti-
mo specillo contingitur: intra carnem adhuc uitium est. si magis id
renititur, ad os uentum est. ibi deinde si labitur specillum, nondum
caries est. si non labitur, sed æquali inmittitur: caries quidem, uerum
adhuc leuis est. si inæquale quoque et asperum subest: uehementius os
exesum est. At cartilago ubi subhæsit, ipsa sedes docet: peruentumque
esse ad eam ex renixu patet. Sed ex his quidem colliguntur fistula-
rum sedes, spatia, noxæ. Simples uero hæc sint, an in plures partes
diducantur: cognosci potest ex modo puris: cuius si plus fertur, quam
quod simplici spatio conuenit: plures sinus esse manifestum est. Cumque
ferè iuxta sint, caro, & neruus, & aliqua nervosa: quales ferè tunice,
membraneque sunt: genus quoque puris docebit, num plures sinus intus
diuersa corporis genera perferant. si quidem ex carne pus leue, al-
bum, copiosius fertur. At ex nervoso loco: coloris quidem eiusdem,
sed tenuius, & minus. Ex neruo, pingue & oleo non dissimile. Denique
etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistula pene-
trarint: quia sæpe cum quis aliter decubuit: aliterque membrum collo-
cauit: pus ferri, quod iam desierat, iterum incipit: testaturque non solum
aliud sinum esse ex quo descendat: sed etiam in aliam corporis partem
eum tendere. sed si & in carne & recens, & simplex est: ac neque
rugosa, neque cava sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se
immobile, non nisi cum toto corpore mouetur: satis proficiet empla-
strum, quod recentibus uulneribus imponitur: dum habeat uel salē,
uel alumen, uel squamā aeris, uel æruginem, uel ex metallicis aliquid.
exque eo collirium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo ple-
nius. Idque ea parte qua tenuius est: altera antecedente demitti oportet
in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. quæ in omnibus fistula-
rum collirijs perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo su-
perimponendum: supraque injicienda spōgia est in acerū ante demissa.
soluique quinto die satis est. genusque uictus adhibendum est: quo car-
nem ali docui. Ac si longius à præcordijs fistula est: ex intervallo ieiu-
num radículas edisse: deinde uomere necessarium est. uetustate callo-
sa fit fistula. Callus autem neminem fallit, quia durus est: & aut al-
bus, aut pallidus. sed tum ualidioribus medicamentis opus est. Qua-
le est, quod habet papaueris lacrymæ. P. XI. gummi. P. XIII. cadmiæ
P. XIII. atramenti sutorij. P. XVIII. Ex quibus aqua coactis colliri-
um fit. aut in quo sunt gillæ. P. XI. æruginis; sandaracæ, aluminis

ægyptij, singulorum. P. XI. atramenti sutorij combusti. P. XII. aut quod constat ex chalcide, & saxo calcis quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est: adijciatur. eaq; melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, æruginis rase. P. XII. conterere: deinde ammoniac, thymiamatis. P. XII. aceto liquare: eoq; infuso ex ærugine colligere. idq; ex primis medicamentis est. Sed ut hæc maxime effectus sunt: sic cui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis prodere: aut quibus hæc maxime in effectum sunt, erodere. Satiusq; est uel papyri intortum, uel aliquid ex penicillo in modum collirij astrictum eo illinere. Scylla quoq; cocta, & mixta cum calce callum exest. si quando uero longior & transversa fistula est: demisso specillo contra principium huius incidi commodissimum est: & collirium utrunq; demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multiplicem existimamus, sic tamen ut brevis, intraq; carne sit: collirio uti non debemus: quod unam partem curet: reliquis omittat. sed eadem medicamenta arida in caldum scriptorium coniicienda sunt: usq; ori fistula aptandus: inspirandumq; ut ea medicamenta intus compellantur. aut eadem ex uino liquanda. Vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callosior, ex aceto sunt: atq; intus infundendum quicquid inditum est. superponenda sunt quæ refrigerent, & reprimant. nam ferè quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neq; alienum est ubi quis resoluuerit, anteq; rursus alia medicamenta coniiciat: per oricularium clysterem fistula eluere. si plus puris feratur, uino. si callus durior est, aceto. si iam purgatur, mulso, uel aqua, in qua eruum coctum sit sic, ut huic quoq; mellis paulum adijciatur. Ferè uero fit, ut ea tunica quæ inter ferrumentum, & integram carnem est, uicta medicamentis tota exeat: infraq; ulcus purum sit. quod ubi contingit, imponenda glutinamenta sunt: præcipueq; spongia melle cocto illita. Neq; ignoro multis placuisse linamentum in modum collirij compositum, tinctum melle demitti. sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neq; uerèdum est ne purum corpus puro corpori iunctum, non coeat: adiectis quoq; medicamentis ad id effectibus: cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura propeximis: sanescendo in unum eos iungat.

De melicera.

St etiam ulceris genus: quod à favi similitudine *μυλιν* nomen à græcis nominatur: idq; duas species habet. Alterum subalbidum furunculo simile, sed maius, et cum dolore maiore. quod ubi maturescit, hêt foramina, p quæ fertur humor glutinosus, et

LIBER

purulentus. Nec tamen ad iustam maturitatem peruenit. Si diuisum est, multo plus intus corrupti, quam in firunculo apparet, altiusq; descendit. Raro fit nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus emnens, durum, latum subuiride, subpallidum, magis exulceratum. Si quidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt: per quae fertur humor glutinosus subpallidus: crassitudinem mellis aut uisci referens: interdum olei. Si inciditur, uiridis intra caero apparet. Dolor autem & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoq; febre mouere consuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est: recte imponitur & ficus arida, & lini semen quod in uino coctum: & emplastra, ac malagmata materiam educantia: aut quae proprie huc pertinentia supra posui. Super alterum, & ea medicamenta. & farina ex mulso cocta sic, ut ei dimidium resinae terebinthinae miscatur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & uuae taminiae pars quarta fico adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt: totum ulcus usq; ad sanam carnem excidi oportet, & ulcere ablato super plagam medicamenta danda sunt: primum quae pus citent: deinde quae purgent: tum quae impleant.

De acrochordone & Thymio, & Myrmecio, & Clauo,
curationibusq; eorum.

Vnt quaedam uero uerrucis similia: quorum diuersa nomina ut uita sunt: ἀποχόρδωνα graeci uocant ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius coloris eiusdem: infra tenue: ad cutem latius: idq; modicum est: quia raro fabae magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur: sed ferè plura, maximq; in pueris, eaq; nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quae etiam in pus conuertuntur. At thymion nominatur, quod super corpus quasi uerrucula eminet, ad cutem tenue: supra latius, subdurum, & in summo perasperum. Idq; summum colorem floris thymi representat. Vnde ei nomen est. Ibiq; facile finditur & eruentatur, nonnunquam aliquantum sanguinis fundit: fereq; circa magnitudinem fabae aegyptiae est: raro maius: interdum per exiguum: modo unum, modo autem plura nascuntur, uel in talis, uel palmis, uel inferioribus pedum partibus. Pessima tamè in obscenis sunt: maximq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem uocantur, humiliora thymio durioraq; quae radices altius exiguunt, maioremq; dolorem mouent: infra lata: super autem tenuia: minus sanguinis mittunt: magnitudine uix unquam lupini modum

pinum modum excedunt. Nascuntur ea quoque, aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam quidem etiam alibi: sed in pedibus tamen maxime nascitur: præcipue tamen ex contuso: quantum interdum aliter, doloremque etiam, si non alias: tamen ingredienti mouet. ex his acrochordon: sine thymium sæpe etiam per se finiuntur: et quo minora sunt: eò magis Myrmecia et clauus sine curatione uix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. Thymio, clauoque excisis subter rotunda radícula nascitur: quæ penitus descendit ad carnem, eaque relicta idem rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhaeret: ideoque ne excidi quidem sine exulceratione magna possunt. Clauum subinde deradere commodissimum est. Nam sine ulla ui sic emollescit: ac si sanguinis quoque aliquid emissum est: sæpe emouitur. Tollitur etiam, si quis eum circum purgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulueris paulum: quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera uero genera medicamentis adurenda sunt. Alijque id quod ex fecæ uini, myrmecij id quod ex alumine, et sandaracæ fit: aptissimum. Sed ea: quæ circa sunt: folijs contegi debent: ne ipsa quoque exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus, et earum curationibus.

Pustula maxime uernis temporibus oriuntur: earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus, partemue aspredo quædam fit similis his pustulis: quæ ex urtica, uel ex sudore nascuntur. et *εἰς αὐτὴν μύησις* græci uocant: eaque modo rubet: modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures similes uariis oriuntur, nonnunquam maiores pustulae liuidæ, aut pallidæ, aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato: subestque his humor. Vbi hæruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet *φλυκταῖνα* græce nominatur. fiunt uel ex frigore, uel ex igni, uel ex medicamentis. Psoriasis autem paulo durior, pustula est subalbida: acuta ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis uero nonnunquam etiam ulcra scula sunt, aut aridiora, aut humidiora, et modo tantum cum prurigne, modo etiam cum inflammatione aut dolore, Exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id euenit in ætate puerili, raro in medio corpore: sæpe in eminentibus partibus. Pessima pustula est: quæ *εἰς τὴν ὑνκτὴν* uocatur. Ea colore uel subliuida, uel subnigra, uel alba esse consuevit. Circa hanc autem uehemens inflammatio est, et cum adaperitis

Aurelij Cor.

m

LIBER

est: reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est. Neq; enim ea faba maior est. Atq; hæc quoq; oritur in eminentibus partibus: & ferè noctu. Vnde nomen quoq; à græcis ei ἐπιπρωῖς impositum est. In omni uero pustularum curatione primum est, multum ambulare atq; exerceri. si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuire: abstinere ab omnibus acerbis & extenuantibus: eademq; nutrices facere oportet: si lactens puer ita affectus est. Præter hæc, qui iam robustus est: si pustulæ minutæ sunt: desudare in balneo debet, simulq; super eas nitrum inspergere: oleoq; uinum miscere: & sic ungi. Tum descendere in solium. si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupauit: imponenda lenticula est: detractaq; summa pellicula: ad medicamenta lenia transeundum. ἐπιπρωῖς post lenticulam recte herba quoq; sanguinali, uel uiridi coriandro curatur. Vlcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fœni græci mixta sic, ut his inuicem rosa atq; intubi suus adijciatur: donec mellis crassitudo fiat. Proprie ad eas pustulas: quæ infantes male habent: lapidis: quem πρῖον uocant P. XVIII. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adijciunturq; olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulæ debent: tum hoc illini.

De scabie, & eius curatione.

Scabies uero est humor cutis rubicundus: ex qua pustulæ oriuntur: quædam humidiores, quædam sicciores. Exit ex quibusdam sanies, fitq; ex his continue exulceratio pruriet. serpitiq; in quibusdā cito. Atq; in alijs quidem ex toto desinit: in alijs uero certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoq; prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaq; eam: quæ talis est, ἀσπὲς, idest fœca græci appellant. In hac quoq; uictus ratio eadem: quæ supra necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est: qd fit ex spodij, croci, æruginis, singulorum. P. XI. piperis albi: omphacij: singulorum. P. XI. cadmæ. P. XVIII. Aut ubi iam exulceratio est: id quod fit ex sulphuris. P. XI. ceræ. P. XIII. picis liquidæ hemina: olei sextarijs duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum authorem refertur. Habet hoc farina lupinorum sextarium: nitri cyathos quattuor: picis liquidæ heminam: resinæ humidæ sēlibram: aceti cyathos tres. Crocum quoq; licium, ærugo, myrrha, cinis æquis portionibus recte miscentur, & ex passo coquantur. Idq; omnē pituitam ubiq; sustinet. At si nihil aliud

est, amurca ad tertiam partē decocta, uel sulphur pice liquida mixtū
sicut in pecoribus proposui: hominibus quoq; scabie laborantibus opi-
tulantur.

De impetiginis speciebus & curationibus.

i Impetiginis uero species sunt quattuor. Minime mala est,
quæ similitudine scabiem representat. Nam & rubet &
durior est, & exulcerata est & roditur. Distat autem ab ea
quia magis exulcerata est, & uariis similes pustulas habet, uideturq;
esse in ea quasi bullulæ quædam ex quibus interposito tempore squa-
mulæ resolvuntur: certioribusq; hoc temporibus reuertitur. Alterum
genus peius est simile papulæ ferè: sed asperius, rubicundiusq;: figu-
ras uarias habens. Squamulæ ex summa cute discedunt: roseo maior
est: celerius & latius procedit: certioribusq; etiam nonnunquam pri-
or temporibus & fit et desinit: rubricæ cognominatur. Tertia etiam
num deterior est. Nam & crassior est, & durior, et magis tumet: in
summa cute finditur: & uehementius rodit. Ipsa quoq; squamosa, sed
nigra procedit: & late & tarde eminus serpit. In temporibus, aut
oritur, aut desinit, neq; ex toto tollitur: nigrae cognomen est. Quartum
genus est, quod curationem omnino non recipit: distans colore. Nam
subalbidum est & recenti cicatrici simile, squamulasq; habet palli-
das, quasdam subalidas, quasdam lenticulæ similes. quibus demptis
nonnunquam profluit sanguis. Alioquin uero humor eius albidus est,
cutis dura atq; fissâ est, proceditq; latius. Hæc uero omnia maxime
genera oriuntur in pedibus et manibus, atq; ungues quoq; infestant.
Medicamentum non aliud ualentius est, quàm quod ad scabiem quoq;
pertinere sub auctore. Protarcho retuli. Serapion autem nitri. P. XII.
sulphuris. P. XIII. exapiebat resina copiosa, eoq; utebatur.

De papulis, & earum curatione.

p Apularum uero duo genera sunt. Altera est, in qua per mi-
nimas pustulas cutis exasperatur & rubet, leniterq; rodi-
tur: medium habet pauxillo leuius: tarde serpit, idq; uitiū
maxime rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit. Alte-
ra autem est, quam ἀρτίαν, græci appellant. In qua similiter qui-
dem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturq; ac uehementius
& roditur & rubet: interdum etiam pilos remittit. Quæ minus
rotunda est: difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginē uertitur:

m ij

LIBER

sed levis papula, etiam si ieiuna salina quotidie defricatur: sanescit: maior commodissime murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Vt uero ad composita medicamenta ueniamus, idem illud Protarchi tanto ualentius in his est, quanto minus in his uitij est: alterum ad idem Myronis: nitri rubri, thuris, singulorum. P. XI. cantharidum purgatum. P. XII. sulphuris ignem non experti tantundem, resinae terebinthinae liquidæ. P. XXX. farinae lolij sext. iij: guth diathos tres: picis crudæ sext.

De uutilignis speciebus, idest de Alpho et Mela, et leuæ, et earum curatione.

Utiligo quoque, quamuis per se nullum periculum affert: tamen foeda est, et ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. Alphos uocatur, ubi color albus est ferè subasper et non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse uideatur. Interdum etiam latius, et cum quibusdam intermissionibus serpit. Melas colore ab hoc differt: quia niger est, et umbræ similis. Cætera eadem sunt. Aluon habet quiddam simile alpho, sed magis albida est, et altius descendit, in eaq; albi pili sunt, et lanugini similes. Omnia hæc serpunt. Sed in alijs celerius, in alijs tardius. Alphos et Melas in quibusdam uarijs temporibus et oriuntur, et desinunt. Leuæ quæ occupauit: non facile dimittit. Priora curationem non difficillimam recipiunt: ultimum uix unquam sanescit: ac si quid ei uitio demptum est: tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi. Si sanguis exit: quod ferè fit in duobus prioribus, remedio locus est. Si humor albidus, sanari non potest. Itaq; ab hoc quidem abstinendum est. Super id uero: quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure et thure sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem: quod ad Hireneum auihorè refertur. Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur adiecto aceto. His in sole uutiligo perungitur: deinde non ita multo post: ne nimis erodatur: eluitur. Proprie quidem Myrone authore eos: quos alphos uocari dixi, hoc medicamento perungunt. sulphuris. P. p. Z. aluminis scissilis. P. p. Z. nitri. P. XIII. myrti radice contrita acetabulum miscent: deinde in balneo super uutiliginem inspergunt farinam ex faba: tum hæc inducunt. Hi uero, quos melanas uocari dixi: curantur: cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo ante sudorè insperguntur: tum genus id uutilignis defricatur.

De vitijs singularum corporis partium. Cap. I.

De capillis fluentibus.

A Ixi de his vitijs, quæ per totum corpus orientia: medicamentorum auxilia desiderat. nunc ad ea veniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem sæpe radèdo succurritur. adiicit enim vim quædam ad continendum ladanum cum oleo matum. nunc de his capillis loquor, qui post morbum ferè fluunt. nã quo minus caput quibusdã ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

De porrigine & eius curatione. Cap. II.

P Orrigo autem est ubi inter pilos quædam quasi squamulæ surgunt, eæq; à cute resolvuntur, & interdù madent: multo sæpius sicca sunt. Idq; euenit modo sine ulcere, modo exulcerato loco: huic quoq; modo malo odore, modo nullo accidente: ferèq; id in capillo fit, rarius in barba: aliquando etiam in supercilio. ac neq; sine aliquo corporis vitio nascitur, neq; ex toto inutile est. nam bene integro capite non exit. Vbi aliquid in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi: quàm id quod nocet in aliam partem magis necessariam uerti. Commodius est ergo subinde pectendo repurgare: quàm id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit: quod humore sequente fieri potest, magisq; si id etiam mali odoris est, caput sæpe radendum est, dein id super adiunandum aliquibus ex leniter reprimentibus: quale est nitrum cum aceto, uel ladanum cum myrteo uino, uel myrobalanum cum uino. Si parum per hæc proficitur uehementioribus uti licet, cum eo, ut sciamus, utiq; in recenti vitio id inutile esse.

De sycofi & eius curatione. Cap. III.

E St etiam ulcus, quod à fici similitudine σύκοις à græcis nominatur. caro excrescit: & id quidem generale est. sub eo uero duæ species sunt. alterum ulcus durum & rotundum est, laterum humidum & inæquale. ex duro exiguum quiddam &

Aurelij Cor.

m iij

LIBER

glutinosum exit: ex humido plus, & mali odoris. Fit uero utrumque in his partibus, quæ pilis continguntur: sed id quidem, quod callosum & rotundum est, maxime in barba. Id uero quod humidum, præcipue est in capillo. Super utrumque oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum terrapharmacum ex aceto subactum: terra quoque erithrea ex aceto liquata recte illinitur.

De Aris & earum curationibus. Cap. IIII.

Rearum quoque duo genera sunt. commune utrique est: quod a mortua summa pellicula, pili primum extenuantur: deinde de excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus et mali odoris, incrementumque utrumque in alijs celeriter, in alijs tarde. Peius est quod densam cutem & subpinguem, & ex toto glabram facit: sed ea quæ ἀλωπεκία nominatur, sub qualibet figura dilatatur, fit et in capillo & in barba. Id uero quod à serpentis similitudine ὀφιοειδής appellatur: incipit ab occipitio: duorum digitorum latitudinem non excedit: ad aures duobus capitibus serpit: quibusdam etiam ad frontem: donec se duo capita in priorem partem committant. Illud uicissim in qualibet ætate est: hoc ferè in infantibus. Illud uix unquam sine curatione: hoc per se sæpe finitur. quidam hæc genera arearum scalpello exasperant. quidam illinunt adurētia ex oleo, maximeque charitum combustam. quidam resinam terebinthinam cum taspia inducunt. sed nihil melius est, quam nonacula quotidie radere: qua cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radice. neque ante oportet desistere, quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur: illini atramento scriptorio satis est.

De Variis, et Lenticulis, & Ephelide, & eorum curationibus. Cap. V.

enè ineptiæ sunt: curare Varos, et Lenticulas, & Ephelidas. P sed eripi tamen foeminis cura cultus sui non potest. Ex his autem quas supra proposui, uari, lenticulaeque uulgo notæ sunt: quanuis rarior ea species est, quam ξέλιος græci uocant: cum sit ea lenticula rubicundior et inæqualior. Equi uero à plerisque ignoratur: quæ nihil est: nisi asperitas quædam & durities mali coloris. cætera non nisi in facie, Lenticulae etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. de qua per se scribere alio loco uisum operæ præcium non est. sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non nisi

nus quàm ipsa est: aluminis, scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum et nitrum, cum pares portiones habet, contritaq; ex aceto sunt: donec ad mellis crassitudinem uenerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis mane eluendū est: oleoq; leniter ungendum. Epheliden tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia uero ista atq; etiā ad colorandas cicatrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, crocomagmatis, cretæ amoliæ subcerulæ, nucum amararum, farinæ hordei atq; erui, struthij albi: sertulæ campanæ seminis. quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquantur, illitumq; à uespere usq; mane eluitur.

De oculorum morbis, curationibusq; eorum: & primo de his morbis qui lenibus medicamentis curantur. Cap. VI.

Ed hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus uero et uarijs casibus oculi nostri patent. qui cum magnam partem ad uitæ simul & usum & dulcedinem conferant: summa cura tuendi sunt. protinus autem orta lippitudine quædam notæ sunt: ex quibus quid euenturum sit: colligere possimus. nam simul & lacryma, & tumor, & crassa pituita cœperint, si ea pituita lacrymæ mixta est: & ea lacryma calida est: pituita uero alba & mollis, tumor non durus: longæ ualeitudinis metus non est. at si lacryma multa & calida: pituita paulum, tumor modicus: idq; in uno oculo est: longum id, sed sine periculo futurum est. Idq; lippitudinis genus minime cum dolore est, sed uix ante uigesimum diem tollitur: nonnunq; per duos menses durat: sed quandoq; finitur. Si pituita alba et mollis esse incipit, lacrymæq; miscentur, aut si simul hæc utrunq; oculum inuaserunt: potest esse breuior, sed periculum ulcerum est. Pituita autem si crassa & arida dolorem quidē mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit: tumor magnus si sine dolore est & si cæcus, sine ullo periculo est. si cæcus quidem: sed cum dolore est, ferè exulcerat, & nonnunq; ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris, pupillis uel est: ubi super magnum dolorem lacrymæ salsæ, calidæq; eunt, aut etiam si tumore infinito diu lacryma cum pituita profluit. peius etiam nam est, ubi pituita calida, aut linida est, lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit: nocturna uigilia urget. si quidem sub his oculis plerunq; rumpitur: notumq; est, ut tantum exulceretur. In-

m iij

LIBER

tus ruptum oculum febricula inuat. Si foras iam ruptus procedit: si-
ne auxilio est: si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. at
si asperum, crassum est: etiam post curationem uestigium aliquod re-
linquit. Curari uero oculos sanguinis detractione, medicamento, bal-
neo, uino uetustissimus auctor Hippocrates memoriae prodidit. sed
eorum tempora & causas parum explicuit. In quibus medicinae sum-
ma est. neq; minus in abstinentia & alui ductione saepe auxilij est.
Hos igitur interdum inflammatio occupat: ubi cum timore in his do-
lor est, sequiturq; pituitae cursus nonnunquam copiosior uel acrior:
nonnunq; utraq; parte moderator. In eiusmodi casu prima omnium
sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet,
sic ut à sermone quoq; abstineat. nullum cibum assumere: si fieri po-
test ne aquam quidem: sin minus, certe quam minimum eius. Quod
si graues dolores sunt: commodius secundo die: si tamen res urget: etiā
primo sanguis mittendus est: utiq; si in fronte uenae tument, si firmo
corpori materia superest. si uero minor impetus, minus acrem cura-
tionem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertio uel die duci oportet.
At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. si-
tisq; est uti quiete & abstinentia, Neq; tamen in lippientibus longum
ieiunium necessarium est: ne pituita tenuior atq; acrior fiat. sed secū-
do die dari debet id quod leuissimum uideri potest ex his, quae pitui-
tam faciunt crassiores: qualia sunt oua sorbilia. si minor uis urget:
pulticula quoq; aut panis ex lacte. Insequentibusq; diebus quantum
inflammationi detrahatur: tantum adijci cibis poterit. sed generis eius-
dem: utiq; ut nihil falsum, nihil acre, nihil ex his: quae extenuant, su-
matur: nihil potui praeter aquam. Et uictus quidem ratio talis ma-
xime necessaria est. Protinus autem primo die croci. P. XI. & farinae
candidae quam tenuissimae. P. XII. excipere oportet oui albo: donec mel-
lis crassitudinem habeat: idq; in linteolum illinere & fronti agglu-
tinare, ut compressis uenis pituitae impetum cohibeat. si crocum non
est, thus idem facit: Linteolo an lana excipiat: nihil interest. Super
iungit uero oculi debent: sic ut croci quantum tribus digitis compre-
hendi potest: sumatur: myrrhae: ad fabae: papaueris lacrymae ad len-
ticulae magnitudinem. eaq; cum passo conterantur, & specillo super
oculum inducatur. Aliud ad idem: Myrrhae. P. XI. Mandragorae suc-
ci. P. XII. papaueris lacrymae. P. XII. foliorum rosae, cicutae seminis:
singulorum. P. XIII. acaciae. P. XIII. gummi. P. XVII. Et haec qui-
dem interdum. noctu uero: quo commodior quies ueniat: non alienum
est superimponere candidi panis interiorum partem ex uino suba-
ctam. Nam & pituitam reprimat: & si quid lacrymae prociessit, ab-
sorbet,

forbet: & oculum glutinari non patitur. Si graue id et durum propter magnum oculorum dolorem uidetur: oui & album & vitellus in uas disfundendum est, adijciendumq; eò mulsi paulum: idq; digito permiscendum. Vbi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpata, quæ id excipiat, superq; oculos imponi. Ea res & leuis est: & refrigerando pituitam coarctet, & non exarescat, et glutinari oculum non patitur. Farina quoq; hordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta commode imponitur. neq; ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum uti expresso: si leuior impetus est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fasciæ deliganda sunt, ne per somnam cadant, et hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso commode potest, et cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat: eorum aliquid dandum est: quæ αἰώδωα græci uocant. satisq; est puero, quod erui, uiro, quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum uero oculum primo die, nisi modica inflammatio est, nihil recte coniicitur. saepe enim potius conicitur eò pituita, quam manuitur. A secundo die graui quoq; lippitudini per indita medicamentum recte succurritur, ubi uel iam sanguis missus, uel aluus ducta est, aut ubi neutrum necessarium esse manifestum est.

De diuersis oculorum collirijs.

Ultæ autem, multorumq; auctorum colliria ad id apta sunt: nouisq; etiam nunc mixturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modice reprimentia facile et uarie miscantur. Ergo nobilissima exequatur.

Philonis collirium.

St igitur Philonis quod habet cerussæ elotæ: spodij gummi singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ combustæ. P. XI. Illud scire oportet, hic quoq; omnia medicamenta, singula primum per se teri: deinde mixta iterum adiecta paulatim, uel aqua, uel alio humore: gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstare, ut ubi colliria facta inaruerunt, glutinata sint, neque fricentur.

Dionysij collirium.

Dionysij uero collirium est, papaueris lacrymæ combustæ donec tenerescat. P. XI. thuris combusti, gummi: singulorum. P. XII. spodij P. XIII.

LIBER

Cleonis collirium.

Leonis nobile admodum: papaueris lacrymæ frictæ. P. XII. croci. P. XI. gummi. P. XI. quibus cum teruntur: adijciuntur rosei succus. aliud eiusdem valentius: squamæ æris quod sôma appellatur. P. XI. croci. P. XII. spodi. P. XIII. plumbi & eloti & combusti. P. XVI. gummi tantundem. eius aliud quoque idem est: maxime ubi multa pituita profluit. castorei. P. X. aloes. P. XL. croci. P. XXI. myrrhæ. P. XII. lycij. P. XIII. cædmæ curatæ. P. XVIII. sibi tantundem: acaciæ succi. P. XII. quod cum gummi misuit id quod habet liquidum in pixidecula servatur. Theodotus vero huic compositioni adiecit papaueris lacrymæ combusti. P. X. æris combusti et eloti. P. XII. nucleos palmarum combustos numero. XX. gummi. P. XII.

Theodoti collirium, Acharistum appellatum.

T ipsius Theodoti, quod à quibusdā ἀχαριστὸν nominatur: eiusmodi est. castorei: nardi indicij: singulorum. P. XI. lycij. P. XII. papaueris lacrymæ tantundem: myrrhæ. P. XII. croci, cerussæ elotæ: aloes, singulorum. P. XIII. cædmæ, botryodis elotæ æris combusti singulorum. P. XVIII. gummi. P. XVIII. acaciæ succi. P. XXX. sibi tantundem: quibus aqua pluvialis adijciuntur.

Cythion, uel tephriion collirium.

Ræter hæc ex frequentissimis collirijs est id quod quidam κύθιον: quidā à cinereo colore τέφριον appellant: amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ. P. XII. cerussæ elotæ. P. XVIII. spumæ elotæ. P. XXIII. quæ æque ex aqua pluviali conteruntur.

Enelpidis collirium, trygodes nominatum.

Velpides autem, qui ætate nostra maximus fuit oculus medicus utebatur eo, quod ipse composuerat: ἐνελπίδης nominabat. castorei. P. XI. lycij, nardi, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. croci, myrrhæ, aloes, singulorum. P. XIII. æris combusti. P. XVIII. cædmæ & sibi: singulorum. P. XXII. acaciæ succi. P. XXXVI. gummi tantundem. quo grauior uero quæque inflammatio est: eò magis leniri medicamentum debet, adiecto uel albo oui, uel ma

liebri lacte. at si neq; medicus, neq; medicamentum praesto est, saepius
 utrunlibet horum in oculis penicillo ad id ipsum facto infusum, id ma-
 lum lenit. Vbi vero aliquis releuatus est: iamq; cursus pituitae consti-
 tit: reliquias fortasse leniores futuras discutiunt balneum, et uinum.
 Igitur lauare debet leniter ante ex oleo perfrictus, diutiusq; in cru-
 ribus et feminibus, multa; calida aqua fouere oculos: deinde per
 caput prius calida, num egelida perfundi, à balneo cauere ne quo fri-
 gore afflatus ue laedatur. post hæc cibo paulo pleniore, quàm ex eoru
 dierum consuetudine uti, uitatis tamen oibus pituitam extenuantibus.
 uinū bibere lene: subausterū, modice uetus, neq; effuse, neq; timide,
 ut neq; cruditas ex eo, et tamen somnus fiat, lenianturq; intus laten-
 tia acris. sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum perturba-
 tionem, quàm attulerat: quod inadere his solet: qui manente adhuc
 pituita cursu, festinauerunt, quàm primū discedere debet: nihil eo die
 uini assumere: cibi minus etiā quàm pridie. deinde cum primum
 satis pituita substat, iterum ad usum balnei redire. solet tamen eueni-
 re nonnunquam siue tempestatum uitio, siue corporis, ut pluribus die-
 bus neq; dolor, neq; inflammatio, et minime pituita cursus finiatur.
 quod ubi incidit, iamq; ipsa uetustate res matura est, ab his hisdem
 auxilium petendum est: id est balneo ac uino. hæc enim ut in recen-
 tibus malis aliena sunt: quia concitare ea possunt et accendere, sic in
 ueteribus, quæ nullis alijs auxilijs cesserunt: admodum efficacia esse cō-
 fuerunt. uidelicet hic quoq; ut alibi, cum secunda uana fuerint con-
 trarijs adiuantibus. sed ante tonderi ad curam conuenit. deinde in
 balneo aqua calida q̄ plurima caput atq; oculos fouere: tum utrunq;
 penicillo detergere, et ungere caput irino unguento, continereq; in le-
 ctulo se, donec omnis calor qui conceptus est finiatur, desinatq; sudor,
 qui necessario in capite collectus est. tum ad idem cibi uiniq; genus ue-
 niendum sic, uti potiones meracæ sint: obtegendumq; caput et quie-
 scendum. sepe enim post hæc grauis somnus, sepe sudor, sepe alius
 deiectio pituita cursum finit. si leuatum malum est, quod aliquanto
 saepius fit: per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas re-
 finiatur. si diebus hisdem alius nihil reddit: ducenda est: quo magis
 superiores partes leuentur. Nonnunq̄ autem ingens inflammatio tan-
 to impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat: proprie enim πρὸ μῶ-
 σιν id, quoniam oculi prociuant, græci appellant. His utiq; si uires pa-
 tiuntur, sanguinē mittere: si id fieri non potest, aluum duci, longioremq;
 in diem indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis
 est. Ideoq; Cleonis collirio quidam, quod ex duobus ante positum est:
 utuntur. sed optimum est Nilei. neq; de ullo magis inter omnes au-
 ctiores conuenit.

LIBER

Nilei collirium omnium optimum.

D habet nardi indici, papaueris lacrymæ, singulorum. **P.**
XI. gummi. **P.** **XI.** croci. **P.** **XII.** foliorum rosæ recentium. **P.**
XIII. quæ uel aqua pluuiatili, uel uino leni subaustero
 coguntur. Neq; alienum est malicorium, uel sertulam campanam ex
 uino coquere, deinde conterere: aut myrrham nigram cum rosæ folijs
 miscere, aut hyoscyami folia cum oui cocti uitello, aut farinam cum
 acacie succo, uel passo, aut mulso. quibus si folia quoq; papaueris adij-
 ciuntur, aliquanto ualentiora sunt. Horum aliquo præparato penicil-
 lo fouere oculos oportet ex aqua calida expresso: i qua ante mel myr-
 ti, uel rosæ folia decocta sint. deinde ex illis aliquid imponi. præter
 hæc ab occipitio incisa cute cucurbitula admoenda est. Quod si per
 hæc restitutus oculus in sedem suam non est: eodēq; modo prolapsus
 permanet: scire oportet lumen esse amissum. deinde futurum ut ina-
 rescat is, aut in pus uertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo
 qui propior tempore est: incidi oculus debet: ut effuso pure & inflam-
 matio ac dolor finiatur: et intus tunica residat quo minus foeda postea
 facies sit. Utendum deinde uel hisdem collirijs est ex lacte, aut ouo
 uel croco, cui album oui misceatur. Ac si induruit & sic emortuus
 est, ne in pus uerteretur: quatenus foede prominebit excidendum erit:
 sic ut hamo summa tunica apprehendatur, infra id deinde scalpel-
 lus incidat: tum eadem medicamenta erunt coniicienda: donec omnis
 dolor finiatur. Hisdem medicamentis in eo quoq; oculo utendum est:
 qui primum prociat: deinde per plura loca fissus est.

De carbunculis oculorum, & eorum curatione.

Olent etiam carbunculi ex inflammatione nasci: nonnunq;
 in ipsis oculis, nonnunq; in palpebris: & in his ipsis oculis
 modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu aliud
 duenda est: cibis minuendus: lac potui dandū, ut acria quæ læserunt:
 leniantur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet: his uten-
 dum, quæ aduersus inflammationes proposita sunt. Atq; hic quoq; Nilei
 collirium optimum est. si tamen carbunculus in exteriori palpebræ
 parte est, ad cataplasmata aptissimū est lini semen ex mulso coctum:
 aut si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum, et curatione earum.

Pustulæ quoq; ex inflammationibus interdum oriuntur:
 quod si inter initia protinus incidit: magis etiam seruanda
 sunt quæ de sanguine et quiete supra posui. sin serius quàm ut sanguis

mitti possit: alius tamen ducenda est. si id quoque aliqua res inhibet, utique uictus ratio seruanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei: quale Cleonis est.

φιλαιθεός collirium ad pustulas oculorum.

D quoque: quod philalethos uocatur: huic aptum est. Myrrhæ, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. plumbi eloti, terræ sanctæ, quæ ἀσπὴρ uocatur: tragacanthæ: singulorum. P. XIII. stibis cocti, amyli: singulorum. P. XVI. spodij eloti, cerussæ elotæ, singulorum. P. XVIII. Quæ aqua pluuiali excipiuntur. Vnus collirij, uel ex oño, uel ex lacte est.

De ulceribus oculorum, et eorum curatione, et de διαβαλός collirio.

X pustulis ulcera interdum fiunt, ea quæ recentia æque lenibus medicamentis nutrienda sunt, et hisdem ferè quæ supra in pustulis posui. Fit quoque proprie ad hæc quod διαβαλός uocatur. Habet aeris combusti, et eloti papaueris lacrymæ frictæ: singulorum. P. XI. spodij eloti, thuris, stibis combusti et eloti, myrrhæ gummi, singulorum. P. XII.

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.

Venit etiam ut oculi, uel ambo, uel singuli minores fiant quam esse naturaliter debeant: Idque et acer pituitæ cursus in lippitudine efficiat, et continuati fletus, et ictus parum bene curati. In his quoque hisdem lenibus medicamentis: ex muliebri lacte utendum est. Cibus uero his, qui maxime corpus alere et implere consueverunt. Vitandaque omni modo causa: quæ lacrymas excitet: curaque domesticorum. quorum etiam si quid tale incidit: eius notitiæ suberahendum: atque acris quoque medicamenta, et acres cibi non alio magis nomine his nocent: quam quod lacrymas mouent.

De pediculis palpebrarum.

Enus quoque uitij est: qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. Id οὐρίαιον græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat: raro non ultra procedit. Sed ferè tempore interposito pituitæ cursus acerrimus sequitur: exulceratisque uehementer oculis aciem quoque ipsam corrumpit. His alius ducenda, atque ad cutem tendendū, diuque quotidie ieiunis perfricandum. His;

LIBER

ambulationibus, alijsq; exercitationibus diligenter utendum, gargarizandumq; ex mulso, in quo nepeta, & pinguis ficus decocta sit: saepe in balneo multa calida aqua fouendum caput. Vitandi acres cibi, lacte uinoq; pingui utendum, bibendumq; liberalius, quam edendum est. Medicamenta uero intus quidem lenia danda sunt, ne acriorem pituitam contant. Super ipsos uero pediculos alia, quae necare eos et prohibere ne similes nascentur, possint. Ad id ipsum spuma nitri: P. XI. sandaracae. P. XI. uuae taminiae. P. XI. simul teruntur, adijciturq; uetus oleum pari portione atq; acetum donec ei nullis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & ualidioribus medicamentis curantur: & de Andree collirio, & de dia nepatos.

Actenus oculorum morbi lenibus medicamentis nutrium =
h tur. Genera deinde alia sunt: quae diuersam curationem de siderant, fereq; in inflammationibus nata sunt, sed finitis quoq; his manentia. Atq; in primis in quibusdam perseverat tenuis pituitae cursus: quibus alius ab inferiore parte euocanda est: demendum aliquid ex cibo: neq; alienum est illi frontem compositione Andree, Quae habet gummi. P. XI. cerussae, stibis, singulorum. P. XII. spumae argenti & coctae & elotae. P. XIII. Sed & ea spuma ex aqua plumbi. tili coquitur, & arida haec medicamenta ex succo myrti continentur. His illita fronte, cataplasma quoq; super iniiciendum est ex farina, quae frigida aqua coacta sit: cuiq; aut acaciae succus, aut cypressus adiecta sit. Cucurbitula quoq; in ioco uertice recte accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi uero eo debet, quod habet squamam aëris: papaueris lacrymae: singulorum. P. XI. ceruini cornus combustae, & eloti plumbi, eloti gummi: singulorum. P. XIII. thuris. P. XII. Hoc collirium: quia cornum habet, dia nepatos nominatur. Quotienscumq; non adicio quod genus humoris adijciendum sit: aquam intelligi uolo.

Memigmenon Euelpidis collirium.

Idem Euelpidis: quod μεμυγμένον nominabat. In eo papaueris lacrymae, et albi piperis singula unciae sunt: gummi libra: aëris combustae. P. XI. Inter has autem curationes post intermissionem aliquam profuit balneum & uinum. Cumq; omnibus lippientibus uitandi cibi sunt, qui extenuant, tum praecipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quae pituitam crassionem reddunt: sicut in hoc genere materiae maxime

promptum est: confugiendum est ad ea: quæ quia uenirent, corpus quoque astringunt.

De oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, ueteribus, et de curationibus singulorum.

Ulcerata, si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certe uetera esse consue runt. Ex his supercrescentia collirio: quod *μικρὸν* uocatur: optime reprimuntur. Sordida purgantur et eodem, ex eo, quod *μείλιον* nominatur.

μείλιον collirium.

h Abet æruginis. P. XIII. gummi tantundem: ammoniaci, mini sinopici: singulorum. P. XXVI. Quæ quidam ex aqua, quidam quo uehementiora sint, ex aceto terunt.

Phynon collirium Euelpidis.

i D quoque Euelpidis, quod phynona appellabat, huic utile est Croci. P. XI. papaueris lacrymæ gummi, singulorum. P. XII. æris combusti et eloti, myrrhæ: singulorum. P. XIII. piperis albi. P. XVI. Sed ante linitum hoc, ungendum est.

Sphæron collirium Euelpidis.

i D quoque eiusdem, quod sphæron nominabat: eodem ualet. Lapidis hæmatitis eloti. P. XII. piperis grana sex: cadmiæ elotæ, myrrhæ, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XIII. croci. P. XIII. gummi. P. XVIII. Quæ cum uino amineo conteruntur.

Liquidum Euelpidis collirium.

l Iquidum quoque medicamentum ad idem componebat: in quæ erant hæc. Eruginis. P. X. mini combusti, atramenti sutorij annamoni: singulorum. P. XII. croci, nardi, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. myrrhæ. P. XII. æris combusti. P. XIII. anseris ex odoribus. P. XIII. piperis grana. XV. Hæc ex uino austero teruntur. Deinde cum passi tribus heminis decoquuntur. donec corpus unum sit. Idque medicamentum uetustate efficacius fit.

De cauis oculorum ulceribus, et curationibus.

c Aua uero ulcera commodissime implent ex his quæ supra posita sunt, sphæron, et id quod *φιλανθοῦς* uocatur. Idem sphæron uetusis ulceribus et uix ad catricem uenientibus optime succurrit.

LIBER
Hermonis collirium.

St etiam collirium, quod cum ad plura valeat: plurimum
tamen proficere in his ulceribus uidetur. Refertur ad her-
monem authorem: habet piperis longi. P. XII. albi. P. XV.
cinnamomi. cost: singulorum. P. XI. atramenti sutorij: nardi, casia, ca-
storei: singulorum. P. XII. gallæ. P. XV. myrrhæ, croci, thuris, lycij, ce-
russæ: singulorum. P. XV. papaueris, lacrymæ. P. XII. aloes: æris
combusti, cadmiæ singulorum. P. XXVI. acatiæ, stibis, gummi: singulo-
rum. P. XXV.

De cicatricibus oculorum: quæ ex ulceribus factæ sunt: et quomodo
curari debeant: et de Asclepia, et Canopite, et Pyxino collirijs.

Actæ uero ex ulceribus cicatrices duobus uitijs periclitan-
tur: ne aut caue, aut crassæ sint. Si caue sunt, potest eas im-
plere id, quod sphaerion uocari dixi, uel id, quod asclepias
nominatur: habet papaueris lacrymæ P. XII. sagapeni, opopanaçis:
singulorum. P. XIII. eruginis. P. XIII. cumini. P. XVIII. piperis. P.
XXII. cadmiæ elotæ: cerussæ: singulorum. P. XXVI. At si crassæ cica-
trices sunt: extenuant uel Smilion, uel Canopite collirium: quod habet
cinnamomi, acatiæ: singulorum. P. XI. Cadmiæ elotæ, croci, myrrhæ:
papaueris lacrymæ: gummi: singulorum. P. XII. piperis albi, thuris,
singulorum. P. XIII. æris combusti. P. XVIII. cum aqua pluviali.
uel Euelpidis Pyxinum: quod ex his constat. Salis fossilis. P. XIII.
ammoniaci: thymiamatis. P. XVIII. papaueris lacrymæ. P. XXII. ce-
russæ. P. XXV. piperis albi, croci siculi: singulorum. XXXI. gum-
mi. P. XIII. cadmiæ elotæ. P. XVIII. Maxime tollere cicatricem ui-
detur id quod habet gummi. P. XII. eruginis. P. XI. crocomagma-
tis. P. XIII.

De alio genere inflammationis oculorum.

St etiam genus inflammationis: in qua, si cui tument ac di-
stenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti
necessarium est: multaq; aqua calida caput, atq; oculos foue-
re: gargarizari ex lenticula, uel ex sic cremore: inungi acribus mudi-
camentis, quæ supra comprehensa sunt: maximeq; eo quod sphaerion
nominatur, quod lapidem hæmatitem habet. Atq; alia quoq; utilia
sunt, quæ ad extenuandam aspritudinem fiunt: de qua protinus di-
cam. Hanc autem inflammati oculorum ferè sequitur: interdum maior,
interdum

interdum leuior, nonnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit: deinde aspritudinem ipsam auget, fitq; ea in alijs breuis, in alijs longa, & quæ uix unquam finiatur. In hoc genere ualitudinis quidam crassas, durasq; palpebras & ficulneo folio, & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt: uersasq; quotidie medicamentis sufficiunt. Quæ neq; nisi in magna: uetustaq; aspritudine, neque sæpe facienda sunt. Nam melius eodē, ratione uictus & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore, multaq; oculorum palpebras aqua calida fovebimus. Cibos autem sumemus acres, & extenuantes.

Cæsarianum collirium.

¶ T medicamentum id quod cæsarianum uocatur, habet atramenti sutorij. P. XI. mysi. P. X. piperis albi. P. XV. papaueris lacrymæ, gummi: singulorum. P. XII. cadmiæ lotæ. P. XIII. subis. P. XVI. Satisq; constat hoc collirium aduersus omne genus oculorum ualitudinis idoneum esse, exceptis his, quæ lenibus nutriuntur.

Hieracis collirium.

¶ D quocq; quod Hieracis nominatur ad aspritudinem potest. habet myrrhæ. P. XI. ammoniaci: thymamatis. P. XII. æruginis rase. P. XIII. cum aqua pluuiatili. Ad idem idoneum est etiam id quod Canopite est: & id quod smilion uocatur, & id quod pyxinum, et id quod sphæron. Si composita medicamenta non ad sunt, felle capripino, uel quam optimo melle satis comode aspritudo curatur.

De Xerophthalmia.

¶ St etiam genus aridæ lippitudinis: *Ξεροφθαλμία* graeci appellant: neq; tument, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, et cum dolore quodam grauescunt, & noctu prægraui pituita inhaerescunt, quantoq; minor generis huius impetus: tanto finis manus expeditus est. In hoc uitio multum ambulare, multum exerceri, lauare sæpe, ibiq; desudare, multaq; frictione uti necessarium est. ubi qui neq; implent, neq; nimium acres, apti sunt: sed inter hos medijs mane ubi conuulsi manifestum est, non alienum est ex sinapi garrire: tum deinde caput, atq; os diutius defricare.

Aurelij Cor.

n

LIBER

Rhinion collirium.

Ollirium uero aptissimum est, quod Rhinion uocatur. habet myrrhæ. P. XI. papaueris lacrymæ: acaciæ succi, pipis, gummi: singulorum. P. XI. lapidis hæmatitis: lapidis phrygi, lycij, lapidis scissilis singulorum. P. XII. aeris combust. P. XIII. ac pyxinum quoq; eodem accommodatum est.

Ad oculos scabros colliria.

I uero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion id, quod supra positum est: potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rasæ: piperis longi, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XII. piperis albi, gummi, singulorum. P. XIII. cadmiæ clotæ, cerussæ, singulorum. P. XVI. nullum tamen melius est quam Euelpidis quod βασιλινδὲν nominabat. habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis asij, singulorum. P. XII. gummi. P. XIII. piperis albi. P. XIII. croci. P. XVI. psorici. P. XIII. Nulla autem per se materia est: quæ psoricum nominetur: sed chalcitidis aliquid, & cadmiæ dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idq; in uas fictile additum, et contactu ficulneis folijs sub terra reponitur: sublaturq; post dies uiginti rursus teritur, & sic appellatur. Verum in basilico quoq; collirio conuenit ad omnes affectus oculorum id esse idoneum: qui non leuibus medicamentis curantur. Vbi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos leuant, et mel, et uinum. succurritq; & his, & aridæ lippitudini si quis panem ex uino subactum super oculum imponit. nam cum ferè sit humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos aut palpebras exasperat, sic et si quid prodit humoris: extrahitur, & si quid iuxta est, repellitur.

Ad caliginationem oculorum, quæ propter lippitudinem oritur remedia & colliria.

Aligare uero oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac propter senectutem, imbecillitatem uel aliam consuevit: si ex reliquis lippitudinis id uitium est, adiunat collirium, quod asclepias nominatur, adiunat id quod ex crocomagmate fit.

Διὰ νρόνου collirium.

Proprie etiam ad id componitur: quod διὰ νρόνου uocant. habet piperis. P. XI. croci alids, papaueris lacrymæ, cerussæ, singulorum. P. XII. psorici, gummi: singulorum. P. XIII.

Ad caliginationem oculorum, quæ propter senectutem, aut
aliam imbecillitatem fit.

T si ex senectute, aliaue imbecillitate id est, recte inungi po-
test, & melle quàm optimo, et cyprino, et olco uetere. Cômô
dissimum tamen est balsami partem unam: & olei ueteris,
aut cyprini partes duas, mellis quàm acerrimi partes tres miscere.
Vtilia quoq; huic medicamenta sunt, quæ ad caliginē proximè, quæq;
ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. Cuiusq; uero oca-
li caligabunt: huic opus erit multa ambulatione atq; exercitatione,
frequenti balneo, ubi tutum quidem corpus perficiendum est: præci-
pue tamen caput, & quidem irino donec insudet: uelandumq; postea:
nec detegendum antequam sudor, & calor domi conquierint: tum cū
bis utendum acribus & extenuantibus, interpositisq; aliquibus die-
bus ex sinapi gargarizandum.

De suffusione oculorum.

Suffusio quoq; quam greci ὀφθαλμιασμία nominant: interdum
oculi potentiæ, quæ cernit, se opponit. Quod si inueteraue-
rit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam
certis observationibus discutitur. sanguinem ex frõte uel naribus mit-
tere, in temporibus uenas adurere: gargarizando pituitam euocare:
suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. nictus
optimus est qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum, quæ paralysis dicitur.

Cne resolutio quidē oculorum: quàm παραλυσις greci no-
minant, alio nictus modo, uel alijs medicamentis curanda est.

Exposuisse tantum genus uirij satis est. igitur interdum eue-
nit modo in altero oculo, modo in utroq; aut ex ictu aliquo, aut ex
morbo comitiali, aut ex distentione neruorum, quæ uehementer oculus
ipse concussus est, ut his neq; quoquam intendi possit, nec omnino con-
sistat, sed huc illuc ne sine ratione moneatur, ideoq; ne conspectum
quidem rerum præstet.

De mydriasi oculorum.

Non multū ab hoc malo distat id, quod μυδρίασις greci uo-
cant. Pupilla effunditur, & dilatatur, aciesq; eius hebescit,
ac penē difficillime genus id imbecillitatis eliditur. i. uir aq;
uero id est, et paralyti, & mydriasi pugnandū est p eadē oia, quæ in
caligine oculorū præcepta sunt, paucis tantū mutatis: siq; dem ad caput

LIBER

irino interdum acetum, interdum nitrum adijciendum est: melle in-
gratis satis est. quidam in posteriore uitio calidis aquis usi, relenatiq;
quidam sine ulla manifesta causa subito obcæati sunt. ex quibus non
nulli cum aliquandiu nihil uidissent, repentina profusione alui, lumē
receperunt: quo minus alienum uidetur, ex recenti re & interposito
tempore medicamentis quoq; moliri deiectiones: quæ omnem noxiam
materiam in inferiora depellant.

De imbecillitate oculorum.

Rater hæc imbecillitas oculorum est: ex qua quidam inter-
diu satis, noctu nihil cernunt: quod in foeminam bene respo-
dentibus menstruis non cadit: sed sic laborantes inungi opor-
tet humore iocineris maxime hircini: si minus, caprini, ubi ad assum-
coquitur, excepto: atq; edi quoq; ipsum iecur debet. Licet tamen etiam
hisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ uel cicatrices, uel aspri-
tudinem extenuant: quidam contrito semine portulacæ mel adijciunt
eatenus ne id ex specillo defillet: eoq; inungunt. Excitationibus, bal-
neo, frictionibus, gargarizationibus iisdem his quoq; utendum est.

Ad oculos qui extrinsecus offenduntur: cum sanguine suffusi sunt.

T hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus
uero interdum si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffun-
datur: nihil commodius est: quam sanguine uel columbæ, uel
palumbi, uel hirundinis inungere: neq; id sine causa fit: cum horum
acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum rede-
at, æleberrimq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut
per parietes, aut id herba chelidonio restitui: quod per se sanescit: eo-
rum ergo sanguis nostros quoq; oculos ab externo casu commodissima
tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minima
efficit columbæ & illi ipsi & nobis supra percussum uero oculum
ad inflammationem leniendam non est alienum imponere etiam
cataplasmata: sed ammoniacus, uel quilibet alius quam optimus teri
debet sic, ut ei paulatim oleum adijciatur, donec crassitudo strigmen-
ti fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea farina: quæ ex mulso
decocta sit. Facile autem recognitis cibis, quæ medici quoq; prodide-
runt: apparere cuilibet potest uix ullum ex his, quæ supra comprehē-
sa sunt: oculi uitium esse, quod non simplicibus quoq; & promptis re-
medijs submoueri possit.

h Aetenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamentum plurimum possint: ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum à luminibus natura nobis dedit: sed in his aliquanto maius periculum est: nam uita oculorum intra ipsos nocet. Aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementia, mortemque precipitant: quo magis inter initia protinus succurrendum est: ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit: abstinere, & continere se debet. Postero die, si uehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere, & operire: at magnus cum febre, uigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. si id aliquae causae prohibent, alius soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue foeni graeci, siue lini, siue alia farina ex mulsio decocta est. recte etiam subinde admoventur spogiae ex aqua calida expressae. tum leuato dolore ceratum circundari debet ex irino, aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa factum est, proficit. si uehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adijci cataplasmata debent papaueris corticis fricti atque contriti sic, ut ex his pars dimidia sit, eaque tum simul ex passo mixto decoquatur. In aure uero insundere aliquod medicamentum oportet, quod semper ante tepefieri conuenit: commodissimeque per strigilem instillatur. ubi auris repleta est: super lana mollis addenda est, quae humorem intus contineat. & haec quidem communia sunt. Medicamentum uero est & rosa, & radicum harundinum succus, & oleum in quo lumbri cotti sunt, et humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali persici expressus. composita uero ad inflammationem, doloremque leniendum haec ferè sunt: castorei, papaueris lacrymae pares portiones conteruntur: deinde adijcitur his passum. uel papaueris lacrymae, croci, myrrhae par modus sic teritur, ut inuicem modo rosa, modo passum instilletur, uel id, quod amarum in aegyptia faba est conteritur, & rosa adiecta: quibus myrrhae quoque paulum à quibusdam miscetur, uel papaueris lacrymae, aut thus cum muliebri lacte, uel amararum nucum cum rose succo, uel castorei, myrrhae, papaueris lacrymae pares portiones cum passo: uel croci. P. XI. myrrhae, aluminis scissilis, singulorum P. XII. quibus tum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, melis minus cyatho: idque ex primis medicamentis est: uel papaueris lacryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis: quae habet castorei opopanax: papaueris lacrymae ex aceto, singulorum. P. XII. spumae lycij. P. XIII. quae contrita passo excipiuntur donec cerati

Aurelij Cor.

n iij

LIBER

crassitudinem habeant: atq; ita reponuntur. ubi usus requiritur, rur-
sus idem medicamentum adiecto passo, specillo teritur. Illud perpetuum
est, quotienscumq; crassius medicamentum est, quàm ut in aurem insil-
lari possit, adiucendum cum esse humorem, ex quo id componi debet:
donec satis liquidum sit. si vero pus quoq; aures habent, recte lycium
per se infunditur, aut irinum unguentum, aut porri succus cum melle,
aut centaureæ succus cum passo, aut dulcis punici mali succus in ipsius
cortice tepesfactus, adiecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam miscen-
tur myrrhæ, quam stacten cognominant. P. XI. croci tantundem, nuxes
amaræ. XXV. mellis sesquicyathus, quæ contrita, cum utendum est, in
cortice punici mali tepescant. ea quoq; medicamenta. quæ oris exulce-
rati causa componuntur, æq; ulcera aurium sanant: quæ si uetustiora
sunt, et multa sanies fluit: apta compositio est, quæ ad auctorem Era-
sistratum refertur: piperis. P. XI. croci. P. XI. myrrhæ, mysi cocti, sin-
gulorum. P. XII. æris combusti. P. XII. hæc ex uino teruntur: deinde
ubi inauerunt, adiunguntur passi heminæ tres, et simul coquuntur:
cum utendum est, adiicitur his mel, et uinum. Est etiam Itolemæi chi-
rurgi medicamentum, quod habet lentisci. P. XI. gallæ. P. XI. ompha-
cij. P. XI. succum punici mali. Est menophili ualidum admodum, quod
ex his constat: piperis longi. P. XI. castorei. P. XII. myrrhæ, croci, pa-
paueris lacrymæ, nardi syriaci, thuris, malicorij, ex ægyptia faba
partis interioris, nucis amararum, mellis quàm optimi, singulorum.
P. XIII. quibus cum teruntur, adiicitur acetum quàm acerrimum,
donec crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis, cinnamomi, cassiæ, sin-
gulorum. P. XI. lycij, nardi, myrrhæ, singulorum. P. XI. aloes. P. XII.
mellis cyathi tres, uini sextarius, ex quibus uinum cum lycio deco-
quitur: deinde his alia miscentur: at si multum puris, malusq; odor
est, æruginis rase, thuris, singulorum. P. XII. mellis cyathi duo, aceti
quattuor simul incoquuntur: ubi utendum est, dulce uinum misceatur,
aut aluminis scissilis, papaueris lacrymæ, cassiæ sicut par pondus mi-
scetur: hisq; adiicitur hyoscyami succi dimidio minor quàm unius ex
superioribus portio: eaq; trita ex uino diluuntur. per se quoq; hyo-
scyami succus satis proficit. Commune uero auxilium aduersus omnes
aurium casus: iamq; usu comprobatum Asclepiades composuit. In eo
sunt cinnamomi, cassiæ, singulorum. P. XI. flores iunci rotundi, castorei,
albi piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thu-
ris masculi, nardi syriaci, myrrhæ pinguis, croci, spumæ uiri, singulo-
rum. P. XII. quæ separatim contrita, rursus mixta ex aceto conterun-
tur: atq; ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. eodem modo co-
mune auxilium auribus laborantibus est. Polybi sphragis ex dulci ui-

no liquata: quæ compositio priore libello continetur. quod si et sanies profluit, et tumor est, non alienum est, mixto uino per oricularium elysterem eluere: et tum infundere uinum austerum cum rosa mixtum: cui spodij paulum sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut herbae sanguinalis sucum cum rosa, aut mali punia sucum cum exigua parte myrrhæ: si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur: et tum aliquod ex his quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur: si magis pus profluit, et caput utique tendendum est, et multa calida aqua perfundendum, et gargarizandum, et usque ad lassitudinem ambulandum, et cibo modico utendum est. si cruor quoque ex ulceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi, uel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbae sanguinalis, aut acacie adiecto. quod si super ulcera caro increuit, eaque mali odoris sanguine fundit, aqua tepida elui debet: tum infundi id, quod ex thure, et ærugine, et aceto, et melle fit: aut mel cum ærugine incoctum: squama quoque aeris cum sandaraca contrita per fistulam recte insillatur.

Aduersus aurium uermes.

Bi uero uermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt: si longius, medicamentis enecandi: cauendumque, ne postea nascentur. ad utrumque proficit album ueratum cum aceto contritum: flui quoque aurem oportet uino, in quo marrubium decoctum sit. sic emortui uermes in primam auris partem pronocabuntur: unde facillime educi possunt.

Ad compressa aurium foramina.

In foramen auris compressum est, et intus crassa sanies subest, mel quam optimum addendum est: si id parum proficit, mellis cyatho et dimidio, æruginis rasæ. P. XII. adiacendum est: incoquendumque, et eo utendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis, et rosæ scrupuli duo. Item galbani. P. XII. myrrhæ cum melle, et fellis taurini, singulorum. P. XII. uini quantum satis est ad myrrham diluendam.

Ad grauem auditum.

Bi uero grauius aliquis audire cepit, quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit: in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus: si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, uel porri sucus, aut cum mulso nitri paulum: atque ubi crusta à corpore iam recedit,

LIBER

elucenda auris aqua tepida est: quo facilius ea per se diducta, oricula-
lario specillo protrahatur. si sordes æque molles sunt, eodem specillo
eximendæ sunt. at si duræ sunt: acetum, & cum eo nitri paululum
coniiciendum est. Cumq; emollitæ sunt, eodem modo elui aurem, purga-
riq; oportet. quod si capitis grauitas manet: attendendum idem, &
leniter, sed diu perfricandum est, adiecto uel irino, uel laureo oleo sic,
ut utriuslibet paulum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterq;
post unctionem aqua calida caput fouendū: Cibisq; utendum ex im-
becillissima & media materia, magisq; assumendæ dilutæ potiones:
nonnunq; gargarizandum est. Infundendum autem in aurem casto-
reum cum aceto, & laureo oleo, & succo radicula corticis: aut cucume-
ris agrestis succus adiectis contritis rose folijs: immaturæ quoq; uinæ
succus cum rosa instillatus aduersus sordiditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra se ipsas.

Liud uitij genus est: ubi aures intra se ipsas sonant: atq; hoc
quoq; fit, ne externum sonum accipiant: lenissimum est, ubi
id ex grauedine est. peius: ubi ex morbis, capitis ne longis do-
loribus incidit. Pessimum: ubi magnis morbis uenientibus, maximeq;
comitiali: prouenit. si ex grauedine est: purgare aurem oportet, et spi-
ritum continere, donec inde humor aliquis expimet: si ex morbo uel
capitis dolore, quod ad exercitationem, frictionem, perfusionem, gargariz-
ationemq; pertinet, eadem faciendæ sunt: cibis nō utendum nisi ex-
tenuantibus: in aurem dandus radicle succus cum rosa, uel cum suc-
co radicle ex cucumere agresti, uel castoreum ex aceto et laureo oleo.
ueratrum quoq; cum aceto conteritur: deinde melle cocto excipitur, &
inde collirium factum in aurem demittitur: si sine his caput, ideoq;
nouo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto uel iri-
no, uel laureo oleo, aut huic mixtum castoreū cum succo nactu am-
rarum, aut myrrha & nitrum, cum rosa et aceto. Plus tamen in hoc
quoq; proficit uictus ratio: eademq; faciendæ sunt: quæ supra compre-
hendi: cum maiore quoq; diligentia, & præterea, donec his sonus fi-
niatur, à uino abstinendum. quod si simul & sonus & inflammatio,
laureum oleum conicasse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus
exprimitur: quibus quidam uel castoreum, uel myrrham miscent.

Ad ea, quæ in aurem inciderunt extrahenda.

¶ Olet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus,
aliquod'ne animal. si pulex intus est: compellendum eò lanæ
paulum est, quo ipse is subit, & simul extrahitur: si non est secutus,
aliud'ne

aliud ue animal est, specillum lana inuolutum in resina quam glutinosissimam, maximeq; terebinthinam demittendum, idq; in aurem coniiciendum ibiq; uertendum est. Vtiq; enim comprehendet & eximet: sin aliquid ex aune est: specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso, paulum recuruato: si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi: sternutamenta quoq; admotu id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua uehementer intus compulsa: tabula quoq; collocatur media inherens capitibus utriusq; pendentibus, superq; eam homo deligatur in id latus uersus, cuius auris eo modo laborat sic, ut extra tabulam emineat. Tum malleo caput tabulae, qd a pedibus est, feritur: atq; ita concussa aure, id quod inest: excidit.

De narium morbis, & curationibus. Cap. VIII.

Ares uero intus exulceratis fouere oportet uapore aquae calidae, idest spongia expressa atq; admotu: fit & subiecto uase oris angust, calida aqua repleto. Post id sumentum illinenda ulcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa, aut argenti spiritum cum quolibet horum aliquis conterit: eiq; dum teritur inuicem uinum & oleum myrteum adijcit, donec mellis crassitudinem fecerit. si autem ea ulcera circa nares sunt, pluresq; crustas, & odorem foedum habent, quod genus graeci δ' αἰνῶν appellant: sciri quidem debet, nix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen haec tentari possunt, ut caput ad cutem tondeatur, assidueq; uehementer perfricetur: multa calida aqua perfundatur: multa ei deambulatio sit: abus modicus: neq; acer, neq; ualentissimus: tum in nares ipsam mel cum ex quo modo resinae terebinthinae coniiciatur: quod specillo quoq; inuoluto lana fit, attrahaturq; spiritalis succus, donec in ore gustus eius sentiat: sub his enim crustae resoluuntur, quae tum per sternutamenta elidi debent: puris ulceribus uapor aquae calidae subiiciendus est: deinde adhibendum, aut lycium ex uino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut mentha, aut marrubij succus, aut atramentum sutorium, quod candens factum, deinde contritum sit, aut interior scyllae pars contrita sic, ut horum cuilibet mel adijciatur: cuius caeteris admodum exigua pars esse debet: in atramento sutorio tanta, ut ea mixtura liquida fiat, cum scylla utiq; pars maior: inuoluendumq; lana specillum est, & in eo medicamento intinguendum, eoq; ulcera implenda sunt: rursumq; linamentum inuolutum, & oblongum eodem medicamento illinendum, demittendumq; in nares est, & ab inferiore parte leniter deligandum: idq; per hyemem & uer bis die, per aestatem & autu-

LIBER

minum, ter die fieri debet, interdum uero etiam in naribus carunculae quaedam similes muliebribus mammis nascuntur, haecque in partibus, quae carnosissimae sunt inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus: sub quibus ex toto consumuntur. Polypus uero est caruncula modo alba, modo subrubra, quae narium ossi inhaeret, et modo ad labra pendens nares implet, modo retro per id foramen, quo spiritus a naribus ad fauces descendit, adeo increscit, uti post una conspicia possit, strangulatque hominem maxime austro aut euro flante: saepeque mollis est, raro dura, eaque magis spiritum impedit, et nares dilatat: quae ferè napuiwides est: itaque attingi non debet. illud aliud genus, ferè quidem ferro curatur, interdum tamen inarescit: si addita in nares per linamentum, aut penicillum ea compositio est, quae habet minij sinopici, chalcitis, calcis, sandaracae, singulorum. P. X. I. atramenti sutorij. P. XII.

De dentium dolore, et curationibus. Cap. IX.

IN dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, unum ex toto circumsidendum est. ac ubi quoque primo abstinendum, deinde eo modico, mollique utendum, ne mandentis dentes irriter: tum extrinsecus admouendus per spongiam uapor aquae calidae, imponendumque ceratum ex cyprino, aut irino factum, lanaque id comprehendendum, capuique uelandum est. quod si grauior is dolor est: utiliter et aliud ducitur, et calida cataplasmata super maxillas iniunguntur, et ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, saepiusque mutatur: cuius rei causa et quinq; folij radix in uino mixto coquitur, et hyoscyami radix, uel in posca, uel in uino mixto coquitur sic, ut paulum his salis adijciatur, et papaueris non nimium aridi cortices, et mandragorae radix eodem modo. sed in his tribus utique uitandum est, ne quod austum erit, deuoretur: ex populo quoque alba cortex radice in hunc usum in uino mixto recte coquitur, et in aceto cornu ceruinum rasum, et nepeta cum ruda pingui: ac ficus item pinguis, uel in mulsio, uel in aceto, et melle: ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. specillum quoque lana inuolutum in calidum oleum demittitur, eoque ipso dens fouetur. quinetiam quaedam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur: in quem usum ex malo punice acido, atque arido malicorij pars interior cum pari portione, et gallae et pinei corticis conteritur, misceaturque his minimum, eaque contrita aqua pluuiali coguntur, aut panacis, papaueris lacrymae, peucedani, unae taminiae sine seminibus

pares portiones conteruntur, aut galbani partes tres, papaueris lacrymæ pars quarta. Quicquid dentibus admotum est, nihilo minus supra maxillam ceratum, quale supra posui: esse debet: lana obiectum: quidam etiam myrrhæ, cardamomi, singulorum. P. XI. croci, pyretri: fcorum partes: singulorum. P. XIIII. Sinapis. P. XVII. contrita lintolo illinunt, imponuntq; in humero partis eius, qua dens dolet: si is superior est, à scapulis: si inferior, à pectore: idq; dolorem leuat: Et cum leuauit, protinus submonendum est: si uero exesus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi res coegit, non est necesse: sed cum omnibus fomentis, quæ supra posita sunt, adiiciendæ quædam ualentiores compositiones sunt, quæ dolorem leuant: quales hæc sunt. habet autem papaueris lacrymæ. P. XI. piperis. P. XII. pforeos. P. XX. quæ contrita galbano excipiuntur, idq; arundatur: aut Menemachi maxime ad maxillares dentes in qua sunt croci. P. XI. cardamomi, thuris, fuliginis: fcorum partes, pyretri, singulorum. P. XIIII. sinapis. P. XVII. Quidam autem immiscet pyretri, piperis, elaterij, singulorum. P. XI. aluminis scissilis: papaueris lacrymæ, uix taminie sulphuris ignem non experti, bituminis, lauri baacorum, sinapis, singulorum. P. XII. Quod si dolor eximi eum cogit, Et piperis semen cortice liberatum, Et eodem modo baacæ hederæ coniecta in id foramen, dentem findit, isq; forte stans excidet: Et plati piscis quim pastinacæ nostri, *πρωμα* græci uocant, aculeus torretur: deinde conteritur, resinaq; excipitur, quæ denti arundata hunc soluit: Et alumen scissile in id foramen coniectum dentem citat: sed id tamen inuolutum in lanula demitti commodius est, quia sic dente seruat dolorem leuat. Hæc à medicis accepta sunt: sed agre stium experimento cognitum est, cum dens dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus uelli debere, Et in peluem conijci, supraq; aquam infundi, collocariq; iuxta sedentem hominem undiq; ueste coniectum: tum in peluem candentes silices demitti sic, ut aqua tegantur, hominemq; eum biant ore uaporem excipere, ut supra dictum est undique inclusum. nam Et sudor plurimus sequitur, Et per os continens pituita defluit, idq; sæpe longiorem, sæpe annuam ualeitudinem bonam præstat.

De tonsillis, Et earum cura. Cap. X.

Si uero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput uelandum est extrinsecus: is locus uapore calido fouendus, multa ambulatione utendum, caput in lecto sublimo

LIBER

habendum, gargarizandumq; est ex reprimentibus. radix quoq; ea: quam dulcem appellant contusa & in passo, mulso'ue decocta idem praestat. leniterq; quibusdam medicamentis eas illini non alienū est: quae hoc modo fiunt. ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit: tum croci, myrrhae, aluminis scissilis, singulorum. P. XII. per se conteruntur, paulatimq; his adiunguntur vini lenis cyathi duo, mellis unus: deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur: aut eiusdē succi sextarius eodem modo coquitur, atq; eadem ratione trita ei adiunguntur haec nardi. P. XV. omphacij. P. XI. cinnamomi, myrrhae, casiae, singulorum. P. XI. eadem autem haec & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibis quoq; in hac valetudine lenis esse debet ne exasperet, quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediat, in lecto conquiescendum, a cibo abstinendum, neq; assumendum quicquam praeter aquam calidam est: alius quoq; ducenda est: gargarizandum ex fico & mulso: illine dum mel cum omphacio: intrinsecus admodum, sed aliquanto diutius vapor aquae calidae, donec ea suppurent, et per se aperiantur: si pure substante non rumpuntur. hi tumores, incidendi sunt: deinde ex mulso calido gargarizandum ex fico: at si modicus. quidem tumor & exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adiciendum est: illinendaq; ulcera hoc medicamento. passi quamdulcissimi tres heminae ad unā coquantur: tum adijciuntur thuris. P. XI. croci, myrrhae: singulorum. P. XI. leniterq; oīa rursus feruescunt. ubi pura ulcera sunt, eodem furfurum cremore, uel lacte gargarizandum est. atq; hic quoq; ab his lenibus opus est: quibus adijci dulce uinum potest.

De oris ulceribus, & curationibus, & quae antherae sint. Cap. XI.

Ulcera autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda sunt: optime his medicamentis curantur, quae supra posita ex malis punicis fiunt: continendusq; saepe ore reprimens cremor, cui paulum mellis sit adiectum: utendum ambulationibus, et non acris cibo. simulatq; uero pura ulcera esse coeperunt, lenis humor, interdum etiam quam optima aqua ore continenda est. predestq; assumptum pyrum mitium, pleniorq; cibus, dum acris uacet. inspergq; ulcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallae immaturae sit adiectum. si iam crustas habent, quales in adultis esse consueverunt, adhibendae sunt haec compositiones, quas graeci ἀνθηρὰς nominant. Iunci quadrati, myrrhae, sanda-

sandaracæ, singulorum. P. XIIII. aluminis pares portiones: aut croci, myrrhæ, singulorum. P. XII. iridis, aluminis, scissilis, sandaracæ: singulorum. P. XIIII. iunci quadrati. P. XVIII. aut gallæ, myrrhæ: singulorum. P. XII. aluminis, scissilis. P. XII. rosæ foliorum. P. XIIII. quidam autem croci. P. X. aluminis, scissilis, myrrhæ: singulorum. P. XI. sandaracæ. P. XII. iunci quadrati. P. XIIII. miscent. Priora arida insperguntur: hoc cum melle illinitur neq; ulceribus tantum, sed etiã tonsillis. Verũ ea longe periculosissima ulcera sunt, quas æp̃thor græci appellant, sed in pueris. hos enim sæpe consumunt: in uiris et mulieribus idem periculum non est. Hæc ulcera à gingivis incipiunt, deinde palatum, totumq; os occupant: tum ad unã, faucesq; descendunt quibus obsessis non facile fit, ut puer convalescat. ac miserius etiam est: si lactans adhuc infans est: quo minus imperari remedium aliquod potest: sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisq; operibus, quæ superiores partes movet: mittenda in balneum, iubendaq; ibi calida aqua mammas perfundere: tum alenda cibus lenibus, et his qui facile non corrumpuntur. Potiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est: vini diluti. Ac si alius nutriti substitit: ducenda est. Si pituita eius in os coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera puniendi sunt melle, cui rhus: quem syriacum vocant, aut amaræ nucis adiectæ sunt, vel mixtis inter se rosæ folijs aridis, pineis nucleis, mentæ colliculo, melle: vel eo medicamento, quod ex moris fit: quorum succus eodem modo quo punia mali ad mellis crassitudinem coquitur: eademq; ratione ei crocum, myrrhæ, alumen, vinum, mel miscetur: Neq; quicquam dandum, ad quod humor euocari possit. Si vero iam firmior puer est: gargarizare debet his ferè, quæ supra comprehensa sunt. at si lenia medicamenta in eo parum proficiunt: adhibenda sunt ea, quæ adurendo crustas ulceribus induant: quale est scissile, alumen, vel chalatis, vel atramentum sutorium: prodest etiam fames et abstinentia quanta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera interdum caseus ex melle recte datur.

De gingivarum ulceribus. Cap. XII.

Inguæ quoq; ulcera non alijs medicamentis egent, quàm quæ prima parte superioris capitis exposita sunt: sed quæ in latere eius nascuntur: diutissime durant. Videndumq; est num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere sæpe ulcus eo loco non sinit: ideoq; limandus est. solent etiam interdum iuxta dentes in gingivis tubercula quædam oriri dolentia, τρυπόδοντιδες græci

LIBER

appellant. hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut inter se mixtis sale fossili, combusto cupresso, nepeta, deinde eluere os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare: donec pituita satis profluat. In maiore vero inflammatione iisdem medicamentis utendum est: quæ ad ulcera oris supra posita sunt, & mollis linamenti paulum inuoluendum aliqua compositione ex his, quas avicenna vocari dixi, demittendumq; id inter dentem, & gingiuam: quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admouendus erit spongiæ uapor calidus, imponendumq; ceratū. Si suppuratio se ostendit: diutius eo uapore utendum erit, & continendum ore calidum mulsū, in quo ficus deacta sit: Itemq; subcrudum incidendum, ne si diutius ibi pus permanferit: os lædat. quod si maior is tumor est, commodius totus exaditur, sic, ut ex utraq; parte dens liberetur. Pure exempto, si leuis plaga est, satis est ore calidam aquam continere, & extrinsecus fovere eodem uapore: si maior est, lenticulæ cremore: ut hisdem medicamentis, quibus cætera ulcera oris curantur: alia quoq; ulcera in gingiuis plerunq; oriuntur: quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt. maxime tamen mandere ligustrum oportet, succumq; cum ore continere. Fit etiam interdum, ut ex gingiue ulcere, siue apodorsis fuit, siue non fuit, diutius pus feratur: quod aut dente corrupto, aut fracto, uel aliter uiciato osse, maximeq; id per fistulam uenire cōsuevit. ubi inadit, locus aperiendus, dens eximendus, testa ossis, si qua exaessit recidenda est: si quid uiciosi est, radendum. post quæ quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est: si uero a dentibus gingiue recidunt, eadem avicenna succurrunt. Vtile est etiam pira, aut mala non permatura mandere, & ore cum humorem continere. Idemq; præstare non acie acetum in ore retentum potest.

De uua morbo & curatione. Cap. XIII.

Ve uehemens inflammatio terrere quoq; debet: itaq; in hac & abstinentia necessaria est, & sanguis recte mittitur: & si id aliqua res prohibet, aliud utiliter ducitur, & puiq; si per hæc uelandum, & sublimius habendum est: tum aqua gargarizandum, in qua simul rutus, & lenticula deacta sit. Illinenda autem ipsa uua uel omphacio, uel galla, uel alumine scissili sic, ut cuilibet eorum mel adijciatur. Est etia medicamentum huic aptum, quod Andronium appellatur. constat ex iis: alumine scissili: squama aris rubri: atramento sutorio, galla, myrrha, mysi: quæ p se contrita, mixtaq; rursus paulatim adiecto uino austero teruntur, donec is nullis crassi

tudo sit. ubi horum aliquo illita una est: chelidonie quoque succo per cochlear illita una maxime prodest. Ferè multa pitiuita decurrit, cumque ea quieuit, ex uino calido gargarizandum: quod si minor in ea inflammatio: laser terere: eique adycere frigidam aquam satis est, eamque aquam cochleario exceptam ipsi unæ subijcere, ac mediocriter eam tumentem aqua quoque frigida eodem modo subiecta reprimat. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, quæ uel cum lasere, uel sine eo hac curatione unæ subiecta est.

De cancro oris. Cap. XV.

Iquando autem ulcera oris cancer inuasit, primum considerandum est, num malus corporis habitus sit, eique occurrendum. deinde ipsa ulcera curanda: quod si in summa parte id uicium est: satis proficit ævōpā humido ulcere arida impersa, sicciore, cum exigua parte mellis illita: si paulo altius: chartæ combustæ partes due, auri pigmenti pars una: si penitus malum descendit: chartæ combustæ partes tres, auripigmenti, pars quarta, aut pares portiones salis fricti et iridis frictæ: aut item pares portiones chalcitidis, calas, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere: et super adurentia medicamenta imponere, ne uicium, et sanum locum lædant, quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem coniungunt, donec tabescere desinat: deinde id acetum coquunt, donec exsiccetur: cumque salem contritum inpergunt. quotiens autem medicamentum inijciatur, et ante, et post: os diluendum est uel cremore lentaculæ, uel aqua: in qua aut erui, aut oleæ, aut uerbene decoctæ sint sic, ut cuilibet eorum paulum mellis miscetur. acetum quoque ex scylla retentum ore, satis aduersus hæc ulcera proficit: ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratum est, rursus mixtum acetum: sed et diu continere utrumlibet, et id bis, aut ter die facere, prout uehemens malum est, necessarium est. quod si puer est, cui id inidit: specillum lana inuolutum in medicamentum demittendum est, et super ulcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia deuoret. Et si dolor in gingiuis est, moenturque aliqui dentes: refici eos oportet: nam curationes uehementer impediunt. si nihil medicamenta proficiunt: ulcera erunt adurenda: quod tamen in labris ideo non est necessarium: quoniam excidere commodius est. et id quidem æque adustum, atque excisum sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur: impleri non potest. Gingivarum uero ossa, quæ hebetia sunt: in perpetuum uisione nudantur. neque enim postea caro increscit. Imponenda tamen adustis lentacula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

LIBER

De parotibus, quæ sub auribus oriuntur. Cap. XVI.

*A*ec in capite ferè medicamentis egent. Sub ipsis uero auribus oriri παρωτίδες solent, modo in secunda ualitudine ibi inflammatione orta, modo post longas febres, illuc impletur morbi conuerso. Id alfectus genus est: itaq; nullam nouam curationem desiderat: animaduersionem tantummodo hanc habet necessariam: quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est: si ex aduersa ualitudine illud inuicium est, maturariq; & q̄ primum aperiri commodius est.

De umbilici prominentis curatione. Cap. XVII.

D umbilicos uero prominentes, ne manu, ferroq; utendum sit: ante tentandum est, ut abstineat: alius his ducatur, imponatur super umbilicum id, quod ex his constat. Cicuta, et fuliginis: singulorum. P. XI. cerussæ elotæ. P. XIII. plumbi eloti. P. X. VIII. onis duobus: quibus etiam solani succus adiicitur. Hoc dilutius impositum esse oportet, & interim conquiescere hominem: cibo modico uti sic, ut uidentur omnia instantia.

De obscenarum partium uicijs, & curationibus. Cap. XVIII.

*P*roxima sunt ea, quæ ad partes obscenas pertinent, quarum apud græcos uocabula & tolerabilius se habent, & accepta iam usu sunt cum omni ferè medicorum uolumine atq; sermone iactentur, apud nos fœdiora uerba ne consuetudine quidem aliqua uerecundius loquentium accommodata sunt: ut difficilis hæc explanatio sit simul & pudorem & artis præcepta seruantibus. neq; tamen ea res à scribendo detertere me debuit. Primum ut omnia, quæ salutaria accepi, comprehenderem: deim quia in uulgis eorum curatione etiã præcipue cognoscenda est, quæ inuitissimus quisq; alteri ostendit.

De colis morbis, & curationibus.

*C*itur si ex inflammatione coles intumuit: reduciq; summæ cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua foveendus locus est. Vbi uero glans contracta est, oriculario quocq; elysiere inter eam cutemq; aqua calida inferenda est. Si mollita sic & extenuata cutis ducanti paruit, expeditior reliqua curatione est: si

tumor

tumor uicit: imponenda est uel lenticula, uel marrubium, uel oleæ folia ex uino cocta sic, ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adijciatur: sursumq; coles ad uentrem deligendus est. quod in omni curatione eius necessarium est, usq; homo continere se debet, & abstinere a cibo, & potione aquæ tantum. siti uindicari. à postero die rursum adhibendum hisdem rationibus aquæ fomentum est, & cum uiquoq; experiundum, an cutis sequatur: eaq; si non parebit, leuiter summa scapulo concedenda erit: nã cū sanies profluxerit: extenuabitur his locus, & facilius cutis ducetur. Sine autē hoc modo uicta erit, siue nunquam repugnauerit, ulcera uel in cutis ulteriore parte, uel in glande, ultra uel eam in cole reperientur, quæ necesse est, aut pura si cæue sint, aut humida & purulenta. si sicca sunt, primum aqua calida fouenda sunt: deinde imponendum lycium ex uino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa buryrum: si leuis is humor est, uino eluenda sunt: tum buryri & rosæ mollis paulum, & resinæ terebinthinæ pars quarta adijcienda est, eoq; utendum: aut si pus ex his profluit, ante omnia elui mulsio calido debet. tum imponi piperis. P. XI. myrrhæ. P. XII. croci, mysi cocti, singulorum. P. XII. quæ ex uino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, unæ madentiori, nariumq; ulceribus accommodata est. Aliud ad eam, piperis. P. XI. myrrhæ. P. XI. croci. P. XII. mysi cocti. P. XI. æris combusti. P. XII. quæ primum ex uino austero conteruntur, deinde ubi inaruerunt: iterum teruntur ex passi tribus cyathis, & incoquuntur: donec uicta crassitudinem habeant. Aerugo quoq; cum cocto melle, & ea quæ ad oris ulcera supra comprehensa sunt, curant: aut Erasistrati compositio, aut Cratonis recte super purulentia naturalia imponitur. folia quoq; oleæ ex nouem cyathis uini coquuntur. his adijciatur aluminis scissilis. P. XIII. lycij. P. XVIII. mellis sesqui cyathus: ac si plus purus est, id medicamentum ex melle: si minus, ex uino diluitur. Illud perpetuum est: post curationem, dum inflammatio manet, quale supra positum est, cataplasma supra dare: & quotidie ulcera eadem ratione curare: quod si pus & multum et cum malo odore cœpit profluere, elui cremore lenticulæ debet sic, ut ei mellis paulum adijciatur, aut oleæ, aut lentisci folia, uel marrubiū decoquendum est. eoq; humore eodem modo cum melle utendum, imponendaq; eadem, aut etiam omphacum cum melle, aut id quod ex ærugine & melle ad aures fit, aut compositio Andronis, aut ἀνδρονίς sic, ut ei paulum mellis adijciatur. quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex uino curant. Si uero ulcus latius atq; altius serpit, eodem modo elui debet: imponi uero, aut ærugo, aut omphaciū

Aurelij Cor.

o

cum melle, aut Andronis compositio, aut marrubij, myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ, singulorum. P. III. minij sinopia. P. IIII. quæ per se singula primum teruntur, deinde iuncta iterum melle adiecto, donec liquidi ærati crassitudinē habeant: tum in aëre nase leniter coquantur, ne superfluant: cum iā gutta indurescūt, nas ab igne remouetur, idq; medicamentum tum, pro ut opus est, aut ex melle, aut ex uino liquatur. Idem autem per se etiā ad fistulas utile est. solet etiā interdum ad nervos ulcus descendere: profuitq; pūuita multa, sanies tenuis maliq; odoris, non cocta, aut aquæ similis, in qua caro recens lota est. doloresq; is locus, & punctiones habet: id genus quamuis inter purulentū est, tamen lenibus medicamentis curandum est: quale est emplastrum tetrapharmacum ex rosa liquatum sic, ut thuris quoq; paulum ei misceatur: aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit. supra uero à me positum est. præcipueq; id ulcus multa calida aqua fouendum est, uelandumq; neq; frigori committendum. Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute excusos sic, ut glans excidat. sub quo casu cutis ipsa circuncidenda est. perpetuumq; est, quotiens glans, aut ex cole aliquid, uel excidit, uel absconditur: hanc non esse seruandam, ne confidat, ulceriq; agglutinetur, ac neq; reduci possit postea, & fortasse fistulam quoq; urinæ cludat. Tubercula etiā, quæ quædam græci uocant circa glandem oriuntur, quæ uel medicamentis, uel ferro aduruntur, & cum crustæ exciderunt, squama æris inspergitur, ne quid ibi rursus increascit.

De cancri, qui in cole nascitur, curatione.

Aec circa cancerum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum
 h in his quoq; uel præcipue ulcera infestat. incipit à nigritie, quæ si autem occupauit: protinus specillū subiiciendum, eaq; incidenda est: deinde oræ uulsellaprehendendæ: tum quicquid corruptum est: excidendum sic, ut ex integro quoq; paulum demat, idq; adurendum. quotiens quid ustum est, id quoq; sequitur, ut imponenda lēticula sit: deinde ubi crustæ exciderunt, ulcera sic, ut alia curetur. at si cancer ipsum colem occupauit: inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeq; id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. si medicamenta uincuntur, hic quoq; scilpello quicquid corruptum est sic, ut aliquid etiā integri trahat, præcidi debet. illud quoq; æq; perpetuum est, excocto cancro uulnus esse adurendum: sed siue ex medicamentis, siue ex ferro crustæ ceciderunt, magnum periculum est, ne his decidētibus ex cole profusio sanguinis insequatur: ergo longā quiete & immobili penē corpore opus est, donec ex ipso crustæ

puræ leniter resoluantur. at si uel uolens aliquis, uel imprudens, dum ingreditur immature, crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est: si hæc parum ualet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timide debet, neq; ullo postea motu dandus eidem periculo locus est.

De phagedænæ in cole nascentis curatione.

Onnunquam etiam id genus ibi cæncrî, quod *φαιδαίνα* à græcis nominatur, oriri solet, in quo minime differendum: sed protinus huiusdem medicamenti occurrendum est, & si parum ualent: ferro adurendum. quædam etiam nigrities est, quæ nō sentitur & serpit, ac si sustinuerimus usq; ad uesciam tendit: neq; succurri postea potest. si id in summa glande circa fistulâ urinae est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde id ferro adurendum: si uero alte penetrauit, quicquid occupatum est, præcidendum est. cæterum eadem, quæ in alijs cæncris, facienda sunt.

De carbunculo qui in cole nascitur.

Cælescit etiam in cole interdum aliquid: idq; omni penè sensu cæret: quod ipsum quoq; excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est: deinde ipse quoq; medicamenti urendus, maximeq; chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle, aut ouillo stercore & contrito cum eodem melle: ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quæ ad ora ulceris componuntur.

De testiculorum morbis, & eorum curatione.

In testiculis uero si qua inflammatio sine ictu orta est: sanguis ex talo mittendus est: à cibo abstinendum: imponendum ex faba farina ex mulso cocta cum cumino contrito ex melle cocto, aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto: aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici farina ex mulsa cocta cū cypresso, aut lilij radix contrita, aut si ijdē induruerunt, imponi debet lini uel foeni græci semen ex mulso coctum, aut ex cyprino ceratum, aut similia ex uino contrita, cui paulū croci sit adiectum. si uetustior iā durities est, maxime proficiat cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, dein contrita. si ex ictu tument, sanguinē mitti necessariū est, magisq; si etiā liuens. Imponendū uero utriuslibet ex his quæ cum cumino componuntur, supraq; proposita sunt:

LIBER

aut ea compositio, quæ habet nitti cocti. P. XI. resine pinæ, gummi, singulorum. P. XII. unæ taminie sine seminibus. P. XIII. mellis quantum sat sit ad ea coquenda: quod si ex ictu testiculis aliquid desit, ferè pus quoque crescat, neque aliter succurri potest, quam si inciso scroto et pus emissum, et ipse testiculus excusus est.

De rhagadijs, et Condylomate, et hæmorrhoidibus, alijsque ani morbis, et curationibus eorum, et primo de rhagadijs.

Nus quoque multa, et ædijs plena mala recipit: nec in se multum abhorrentes curationes habet: at primum in co sæpe et quidem pluribus locis cutis exciditur. *ῥαγάδες* græci vocant, id si recens est: quiescere homo debet et in aqua calida desidere. Columbina quoque ova coquenda sunt, et ubi induruerunt, purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus sic, ut invicem utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut *ῥωδὴς* rosa diluendum est, aut hyssopum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto: aut eidem cerato liquido plumbum elotum adiungendum: aut resine terebinthinæ myrrha: aut stumæ argenti velis oleum: et quolibet ex his id perungendum: si quicquid læsum est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum super dandum est: et quicquid ante adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem casu neque acris cibis utendum, neque asperis, nec alium comprimentibus: ne aridum quidem quicquam satis utile est: nisi admodum paulum: liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt: vino leni uti nihil prohibet.

De condylomate.

Condyloma autem est tuberculum: quod ex quadam inflammatione nasci solet: id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos, potionesque pertinet: eadem servari debent, quæ proxime scripta sunt: huiusdem etiam omnis recte tuberculum id fovetur. sed desidere ante homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimentibus: tum recte imponitur, et lenticula cum exigua nullis parte, et sertula campana ex vino cocta, et rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto: et cum eodem cerato contritum, vel cotoneum malum, vel malicorij ex vino cocti pars interior, et chalatis cocta, atque contrita: deinde hyssopo, ac rosa excerpta: et ex ea compositione, quæ habet thuris. P. XI. aluminis scissilis. P. XII. cerusæ. P. XIII. stumæ argenti. P. XV. quibus dum teruntur: invicem rosa et vinum instillatur. vinculum autem ei loco linetolum, aut panniculus quadratus est: qui ad

qui ad duo capita duas ansas, ab altera uero parte totidem fascias habet, cumq; subiectus est, ansis ad uentrem datis à posteriore parte in eas adductæ fasciæ coniunguntur, atq; ubi artatæ sunt: dexteriori sinistra, sinisteriori dextra procedit, circumdatæq; circa aluum inter se nouissime nodo deligantur. sed si uetus condyloma iam induruit, neq; sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat: erugnis. P. XII. myrrhæ. P. XIII. gummi. P. XVIII. thuris. P. XXII. stibis: papaueris lacrymæ, acaciæ, singulorū. P. XXVI. quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus proxime dixi: renouant. si hoc parum in condylomate proficit: adhiberi possunt etiam uehementius adurentia. ubi consumptus est tumor: ad medicamenta lenia transeundum est.

De hæmorrhoidibus.

tertium autem uitium est, ora uenarum tanquam ex capitulis quibusdam surgentia: quæ sæpe sanguinem fundunt, αἱμορροΐδας græci uocant. idq; etiam in ore uulvæ foeminarum incidere consuevit. atq; in quibusdam parum tuto suppressitur, qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt. habet enim purgationem hanc non morbum: ideoq; curati quidā cum sanguinis exitum non haberent: inclinata in præcordia ac uiscera materia subitis, & grauissimis morbis correpti sunt. si cui uero id nocet, is desiderare in aqua ex uerbis debet: imponere maxime malicorium cum aridis rosæ folijs contritum: aut ex his aliqua, quæ sanguinem suppressunt. Solet autem oriri inflammatio, maxime ubi dura alius eum locum læsit. tum in aqua dulci desidendum est, & id fouendum ouis: imponendi uirelli cum rosæ folijs ex passo subacto: idq; si intus est, digito illinendum, si extra super illitum panniculum imponendum est. ea quoq; medicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibus uero in hoc casu hisdem quibus in prioribus utendum est: si ista parum iuuat, solent imposita medicamenta adurentia, ea capitula absumere. ac si iam uetustiora sunt, sub auctore Dionysio inspergenda sandaracæ est, deinde imponendum, quod ex his constat: squamæ æris, auripigmenti: singulorum. P. V. saxi cæcis. P. XVIII. postero die ac compungendum. adustis capitulis fit cicatrix: quæ sanguinem fundi prohibet. sed quotiens is suppressus est, ne quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia est. prætereaq; & uiris & foeminis, quibus menstrua non proveniunt, interdum ex brachio sanguis mittendus est.

Aurelij Cor.

• iij

LIBER

si anus, uel os uulue procidit, qua curatione utendum sit.

T si anus ipse uel os uulue procidit, (nā id quoq; interdum
a fit) considerari debet purum ne id sit: quod pronoluitū est,
an humore mucoso circumdatum. si purum est, in aqua de-
sidere homo debet, aut salsa, aut cum uerbis uel malicorio macta:
si humidum, uino austero subluendum est, illinendumq; fece uini com-
busta. ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponē-
daq; plantago contrita, uel folia salicis in aceto cocta, tum linteolum
et super lana æque deliganda cruribus inter se deuinctis.

De ulcere fungo simili in ano.

Vngo quoq; simile ulcus in eadem sede nasci solet. id si hy-
f ems est, egelida, si aliud tempus, frigida aqua fouendū est.
deinde squama æris inspergenda, supraq; ceratū ex myr-
teo factū. cui paulū squamæ, fuliginis, calcis, sit adiectum. si hac rōne
nō tollitur: uel medicamentis uehementioribus, uel ferro adurendū est.

De digitorum ulceribus. Cap. XIX.

Igitorum autem uetera ulcera commodissime curantur, aut
d lycio, aut myrrha cocta: cū utrilibet uinum adiectum est. in
hisdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore cō-
suevit. nē prius græci appellant. oportet alumen melinum rotundum
in aqua liquare donec mellis crassitudinem habeat: tum quantum
eius aridi fuit, tantundē mellis insundere, et radicula miscere, do-
nec similis croco colore fiat, eoque illinere. quidam ad eundem usum
decoquere simul malua solet: cū paria pōdera aluminis aridi et mel-
lis misuerint. si hac ratione ea nō exacerunt: excidēda sunt: deinde
digiti fouēdi aqua ex uerbis, imponendumq; sup medicamentum
ita factum. chalcitis, malicorinū, squama æris excipiuntur fico pingui.
leniter cocto ex melle. aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris
ignē nō experti par modus cerato miscetur ex myrteo facto. aut æru-
ginis rase. P. XI. squamæ. P. XII. mellis cyatho coguntur. aut pares
portiones miscentur: saxi calas, chalcitidis, auripigmenti. quicquid ho-
rum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est: tertio die
digitus resoluendus est. si quid aridi est, iterum exadendum, similisq;
adhibenda curatio est. si non uincitur, purgandus scalpello, tenuibusq;
ferramentis adurendus est: et sicut reliqua uita curandus est. at ubi
scabri ungues sunt, circum aperiri debent: qua corpus contingunt. tūc
super eos ex hac cōpositione æque imponi sandaracæ, sulphuris, sin-
gulorum. P. XII. nitri, auripigmenti, singulorum. P. XIII. resinæ lig-
dæ. P. XVIII. tertioq; id die resoluendū est. sub quo medicamento ui-
ciosi ungues cadunt, et in eorum locum meliores renascuntur.

De chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis esse chirurgicus
debeat, & quid in hoc libro describatur.

Etiam esse medicinae partē: quae manu cures,
& vulgo notum, & à me propositum est. ea
non quidem medicamenta atq; uictus rationē
omittit, sed manu tamen plurimum praestat.
estq; eius effectus inter omnes medicinae par-
tes euidentissimus. siquidem in morbis cum
multum fortuna conferat: eademq; saepe salu-
taria, saepe uana sint: potest dubitari secunda ualeitudo medicinae, an
corporis beneficio contingerit: in his quoq; in quibus medicamentis ma-
xime utimur: quamuis profectus euidentior est: tamen sanitatem &
per haec frustra quæri, & sine his reddi saepe manifestum est. sicut
in oculis quoque deprehendi potest: qui à medicis diu uexati sine his
interdum sanescunt. at in ea parte, quae manu curat, euident est,
omnem profectum, ut aliquid ab alijs adiunctur, hinc tamen pluri-
mum trahere. Haec autem pars, cum sit uetustissima, magis tamen ab
illo parente omnis medicinae Hippocrate, quam à prioribus exulta
est: deinde posteaquam diducta ab alijs habere professores suos coe-
pit, in aegypto quoque increuit Philoxeno maxime auctore, qui plu-
ribus uoluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gor-
gas quoque, & Sostratus, & Hieron, & Apollonij duo, & Ham-
monius alexandrinus: multiq; alij celebres uiri singuli quaedam re-
perierunt. ac Romae quoque non mediocres professores, maxi-
mēq; nuper Tryphon pater, & Euelpistus: & ut ex scriptis eius
intelligi potest, horum eruditissimus Megetes quibusdam in melius mu-
tatis aliquantum ei disciplinae adiecerunt. Esse autem chirurgus de-
bet adolescens, aut certe adolescentiae propior, manu strenua, stabili,
nec unquam intremiscente, eaq; non minus sinistra, quam dextra
promptus: acie oculorum acris: claraq; animo intrepidus, immiseri-
cors sic, ut sanari uelit eum quem accipit, non ut clamore eius mo-
tus, uel magis quam res desiderat: properet, uel minus quam necesse
est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex uagitibus alteri-
us affectus oriatur. Potest autem requiri: quid huic parti proprie uen-
dicandum sit: quia uulnerum quoq; ulcerumq; multorum curationes,
quas alibi executus sum: chirurgi sibi uendicant. ego eundem quidē
hominem posse omnia ista praestare concipio. atque ubi se diuise-

LIBER

runt, eum laudo, qui quàm plurimū perçipit. Ipse autē huic parti, ea reliquit: in quibus vulnus facit medicus: non accipit: & in quibus nulneribus, ulceribus'ue plus perfici manu, quàm medicamento credo. tū quicquid ad ossa pertinet: quæ deinceps exequi aggrediar, dilatisq; in aliud uolumen ossibus, in hoc cætera explicabo: præpositisq; his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent: transibo.

De luxatis. Cap. I.

1 Vixata igitur in quacunq; parte corporis sunt, quàm primum sic curari debent, ut qua dolor est, eà scalpello cutis crebro incidatur: detergaturq; eodem aduerso profluens sanguis. quod si paulo tardius subuenitur, iamq; etiam rubor est, qua rubet corpus, si tumor quoq; accessit, quacunq; is est, id optimum auxilium est. tum super danda reprimentia sunt, maximeq; lana succida ex aceto, & oleo. quod si lenior is casus est: possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoq; maxime ex sarmentis. si is non est, quilibet alius ex aceto uel etiā ex aqua coactus.

De his, quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, & curanda sunt. Cap. II.

2 Erum hoc quidem promptum est. in his autem negotium maius est, quæ per se uicio intus orto intumescunt, & ad suppurationem spectant. ea omnia genera abscessum esse aliàs proposui, medicamentaq; eis idonea executus sum. nunc superest ut dicam in hisdem, quæ manu fieri debeant. ergo priusquam indurescant: cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet: quæ quicquid illuc male, corruptaq; materiæ coijt: extrahat, idq; iterū, tertioq; recte fit, donec omne inditum inflammationis excidat. neq; tamen sis non est nihil cucurbitula agere. interdum enim sed raro quicquid abscedit, uelamento suo includitur. id antiqui tunicam nominabant. Meges quia tunica omnis nervosa est: dicit non nasci sub eo uicio nervum: quo caro consumeretur, sed subiecto iam uetustiore pure callum circumdari. quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet. neq; ulla res prohibet, etiam si callus est: tamen quia cingit: tunicam nominari. tum pure quoq; maturior hæc interdum esse cōsuevit. ideoq; quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutauit. ergo sine id inci-

dit, siue iam durities est: in hac auxilij nihil est: & ut alijs scrip-
sit uel auertenda concurrens eò materia, uel digerenda, uel ad maturi-
tatem perducenda est. si priora contigerunt, nihil præter ea necesse
est. si pus maturuit, in alis quidem, & in inguinibus raro secū
dum est. item ubicunq; mediocris abscessus est. item quotiens in sum-
ma cute, uel etiam carne uitiū est: nisi festinare curantis imbecilli-
tas cogit. satisq; est cataplasmata efficere, ut per se pus aperiatur:
nam ferè sine cicatrice potest esse is locus: qui expertus ferrum non
est, si autem altius malum est, considerari debet neuosus ne is lo-
cus sit: an non sit. nam si sine neruis est, cunctis ferramento ape-
riri debet. cuius hæc gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus eno-
candū patet: paruaq; postea cicatrix fit. at si nerui iuxta sunt: ignis
alienum est: ne uel distendantur hi, uel membrum debilitent. necessa-
ria uero opera scalpelli est. sed cætera etiam subcruda aperiri pos-
sunt. inter neruos uero ultima expectanda maturitas est: quæ cutem
extenuat: eiq; pus iungit: quo propius reperiatur. itemq; alia rectam
plagam desiderant in carne: quia ferè uehementer cutem extenuat.
tota ea super pus excidenda est. semper autem, ubi scalpellus admove-
tur, id agendum est, ut quàm minimæ, & quàm paucissimæ plagæ
sint. cum eo tamen, ut necessitati succurramus, & in modo & in nu-
mero. nam maiores sinus latius, interdum etiam duabus aut pluri-
bus lineis incidendi sunt. dandaq; opera ut inuis sinus exitum ha-
beat, ne quis humor intus subsidat, qui proxima & adhuc sana ro-
dendo sinuet. est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit:
nam ubi post longos morbos totus corporis habitus uitiatus est, lateq;
se sinus diffudit, & in eo pars cutis pallet: scire licet eam iam emor-
tuam esse, & inutilem futuram. ideoq; excidere commodius est. ma-
xime si circa articulos maiores id euenit, cubantemq; ægrum flu-
ens aluus exhaurit: neq; per alimenta quicquam corpori accedit. sed
excidi ita debet, ut plagæ ad similitudinem myrtei folij fiat, quo fa-
cilis sanescat. idq; perpetuum est. ubicunq; medicus ex quacunque
causa autem excidit, pure effuso in alis, uel inguinibus, linamento opus
non est. sponsa ex uino imponenda est. in cæteris partibus si æque
ea linamenta superuacua sunt: purgationis causa paulum mellis in-
fundendum, dein glutinantia super danda. si illa necessaria sunt:
super ea quoq; similiter dari sponsa eodem modo ex uino expressa
debet. quando autem linamenti opus sit: quando nō sit: aliàs dictum
est. cætera eadem incisa suppuratione facienda sunt. quæ ubi per me-
dicamenta rupta est, facienda esse proposui.

LIBER

De bonis, malis'ue signis exlucetorum.

Cap. III.

Rotinus autem quantum curatio efficiat, quantumq; aut spe
 P rari, aut timeri debeat: ex quibusdam signis intelligi po-
 test: fereq; hisdem, quæ in uulneribus exposita sunt. nam
 bona signa sunt: somnum capere: facile spirare: siti non confici: cibum
 non fœdare, si febricula fuit, ea uacare: itemq; habere pus albū, leue,
 nō fœdi odoris. Mala sunt, uigilia, spiritus grauitas: sitis: cibi fœditiū:
 febris: pus nigrum, aut feculentum & fœdi odoris. Item procedente
 curatione eruptio sanguinis, aut si antequam sinus carne impleatur,
 oræ carnosæ fiunt: illa quoq; ipsa carne hebetē nec firma deficere tū-
 men animam uel ipsa curatione uel postea: pessimum omnium est. quā
 etiam morbus ipse siue subito solutus est: dein suppuratio exorta est,
 siue effuso pure permanet non iniuste terret. Est q; inter causas timo-
 ris: si sensus in uulnere rodentiū non est: sed ut hæc ipsa fortuna huc
 illuc ne discernit: sic medici partum est: eniti ad reperiendam sanita-
 tem. ergo quotiens ulcus resiliuerit: eluere id: si reprimendus humor ui-
 debitur: uino ex aqua pluuiatili mixto, uel aqua in qua lenticula
 cocta sit, debebit. si purgandum erit, nullo, rursusq; imponere eadē.
 ubi iam repressus uidebitur humor ulcusq; purum erit, produci car-
 nem conueniet et foueri uulnus pari portione uini ac mellis, superq;
 imponi spongia ex uino & rosa tincta. per quæ cum cito producta-
 tur: plus tamen, ut aliās quoq; dixi, uictus ratio eō confert. id est solū
 tis iam febribus, & cibi cupiditate reddita: balneum rarium. cotidia-
 na, sed lenis gestatio, cibi, potionesq; corpori reficiendo. apteq; omnia
 quæ per medicamenta suppuratione quoq; rupta sequuntur sed quia
 magno malo uix sine ferro uideri licet: in hūc locū reseruata sunt.

De fistulis. Cap. IIII.

Duersus fistulas quoq; si altius penetrant ut ad ultimas de-
 a mitti collirium non possit, si tortuosæ sunt, si multiplices,
 maius in manu quā in medicamentis præsidium est: mi-
 nusq; operæ est: si sub cute transuersæ feruntur, quā si rectæ intus
 tendunt. igitur si sub cute transuersa fistula est: demitti specillum de-
 bet, supraq; id ea inadi, si flexus reperiuntur, hi quoq; simul specil-
 lo & ferro persequendi sunt. idemq; faciendum, si plures se quasi ra-
 muli ostendunt. ubi ad fines fistulæ uentum est, excidendum ex toto
 callus est, superq; sibilæ dandæ: & medicamentum quo glutinetur:

at si recta subter tendit, ubi quo, maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis iniicienda est, et aequae glutinantia medicamenta super danda sunt. aut si corruptius ulcus, quod interdum osse uitiato fit, ubi id quoque curatum est: pus mouetia. solent autem inter costas fistulae subter exire. quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte decidenda, et eximenda est, nequid intus corruptum relinquatur. solent, ubi costas transierunt, septum id, quod transuersum a superioribus uisceribus intestina discernit: uiolare. quod intelligi et ex loco, et ex magnitudine doloris potest: et quia nonnunquam spiritus eo, cum humore quasi bulla intus prorumpit, maximèque si hunc ore ille continuit. in eo medicamentum locus nullus est. in ceteris uero quae circa costas sanabilia sunt: pingua medicamenta inimica sunt. ceteris, quae ad uulnera accommodantur, uti licet. optime tamen siata linimenta, uel si purgandum aliquid uidetur, in melle tincta imponuntur. uentri nullum os subest: sed ibi perniciosae admodum fistulae fiunt, adeo ut sostratus insanabiles esse crediderit. id non ex toto ita se habere usus ostendit. et quidem quod maxime mirum uideri potest: tutior fistula est contra iecur, et lienem, et uentriculum, quam contra intestina, non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locum faciat. cuius experimento moti quidam auctores parum modum rei cognouerunt. nam uentre sepe etiam telo perforatur, prolapsaque intestina conduntur, et oras uulneris suturae comprehendunt. quod quemadmodum fiat mox indicabo. itaque etiam ubi tenuis fistula abdomen perfrangit: excidere eam licet, suturaque oras coniungere. si uero ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna uis, utique ab interiore parte sui non potest, qua quasi membrana quaedam finit abdomen: quam *τεπίτονον* graeci uocant. ergo ubi aliquis ingredi ac moueri coepit: rumpitur illa sutura, atque intestina soluntur. quo fit ut pereundum homini sit. sed non omni modo res ea desperationem habet. ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

De ani fistulis.

Propriam etiamnum animaduersionem desiderant ea, quae in ano sunt. in has demisso specillo ad ultimum eius caput incidi cutis debet: dein nouo foramine specillum educi lino sequente: quod in aliam eius partem ob id ipsum perforatum coniectum sit. ibi linumprehendendum, uinciendumque cum altero capite est, ut laxa autem, quae super fistulam est, teneat. idque linum esse debet

LIBER

crudum & duplex, triplex'ue, sic tortum ut unitas facta sit. Interim autem licet negotia agere, ambulare, lauare, cibū capere perinde atq; sanissimo. tantummodo id līnum bis die saluo nodo ducendum est sic, ut subeat fistulam pars, quæ superior fuerit. neq; committendum est ut id līnum putrescat. sed tertio quoq; die nodus resoluendus est, et ad caput alterum, recens līnum alligandum est, eductoq; uetere, id in fistula cum simili nodo relinquendū. sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est: incidit, simulq; & id sanescit, quod à līno relicū est, & id quod ab eo mordetur: inciditur. hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est. qui festinat, astringere cutem līno debet, quo celerius fecerit, noctruq; penicillo tenuia quædam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur: quod extenditur: sed hæc dolorem mouent. adiungitur celeritati sicut tormento quoque: si et līnum, & id quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinitur ex ijs, quibus callum exedi potui. poterit tamen fieri ut ad scalpelli curationem etiam illò loci ueniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est. igitur in hæc genera demisso specillo duabus lineis incidenda cutis est: ut media inter eas habentula tenuis admodum eiciatur, ne protinus ora coeant: sitq; locus aliquis linamentis: quæ quàm paucissima super iniicienda sunt, omniaq; eodem modo faciendæ, qui in abscessibus positus est. si uero ab uno ore plures sinus erunt: recta fistula scalpello erit incidenda, ab eo cæteræ, quæ iam patebunt līno excipiendæ. si intus aliqua procedet: quo ferrum tuto peruenire non poterit: collirium demittendum erit. cibus autem in omnibus eiusmodi casibus, siue manu, siue medicamentis agatur: dari debet humidus. potio liberalis, diuq; aqua ubi iam caro increscit. tum demum & balneis raris utendum erit, & cibis corpus implentibus.

De telis è corpore extrahendis. Cap. V.

¶ Ela quoq; quæ illata corporibus intus hæserunt: magno negotio sepe eiciuntur. suntq; quædam difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus in quas illa penetrarunt. omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua uenit, aut ab ea, in qua tetendit. illic uiam, qua redeat: ipsum sibi facit. hic à scalpello accipit. nam contra mucronē atro inciditur. sed si non alte telū insedit, et in summa carne est, aut, certe magnas uenas, et loca neruosa non transit, nihil melius est: quàm qua uenit id euellere. si uero plus est p quod telo reuertendū quàm quod perrupendum est: iamq; uenas, neruosq; id transit: commodius est aperire quod superest, eaq; extrahere. nam & propius petitur, et tutius euellitur, et in maiore

membro si medium mucro trāsīt, facilius sanescit, quod peruium est.
 quia utrinq; medicamento fouetur: sed si retro telum recipiendum est:
 amplianda scalpello plaga est: quo facilius id sequatur: quoq; minor
 orietur inflammatio, quæ maior fit: si ab illo ipso telo dum redit,
 corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur: laxius esse
 debet, quàm ut telo postea transeunte amplietur. Summa autem utraq;
 parte ita habenda cura est, ne nervus, ne vena maior, ne arteria inci-
 datur. quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso
 est, abducendumq; scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum exime-
 dum est: tum quoq; eodem modo, et eadē cura habita, ne sub eo, qđ
 eximitur, aliquid eorum laedatur: quæ tuenda esse proposui. Hæc cō-
 munia sunt: propria quædam in singulis telorum generibus subijciē-
 da sunt: quæ protinus subiiciam: nihil tam facile in corpore quàm sa-
 gitta conditur, eademq; altissime insedit. hæc autem eueniunt, et quia
 magna vi fertur illa, et quia ipsa in angusto est. sæpius itaq; ab al-
 tera parte, quàm ex qua uenit, recipienda est: præcipueq; quia ferē
 spiculis cingitur, quæ magis laniant, si retro, q̄ si contra trahuntur:
 sed inde aperta uia cæro diduci debet ferramento ad similitudinem
 facto græcæ litteræ †. Deinde ubi apparuit: si mucro, si harundo in-
 heret propellenda est, donec ab altera parte apprehendi et extra-
 hi possit: si iam illa decidit, solumq; intus ferrum est, mucro uel digi-
 tis apprehendi, uel forfice, atq; ita educi debet: neq; alia ratio extra-
 hendi est, ubi ab ea parte qua uenit, euelli magis placuit: nam am-
 pliatio uulnere aut harundo, si inest, euellenda est, aut si ea non est,
 ferrum ipsum: quod si spicula apparuerunt, eaq; breuia et tenuia
 sunt: forfice ibi comminui debent, uacuumq; ab his telum educi, si ea
 maiora, ualentioraq; sunt, fissis scriptorijs calamus cōtegenda: ac ne-
 quid lacerent, sic euellenda sunt. Et in sagittis quidem hæc obserua-
 tio est. Latum uero telum si conditum est, ab altera parte educi nō ex-
 pedit, ne ingenti uulnere, ipsi quoq; ingens uulnus adijciamus. euellē-
 dum est ergo genere quodam ferramenti, quod diocleum græci gra-
 phiscum uocant: quoniam auctorem Dioclen habet: quem inter pri-
 scos, maximosq; medicos fuisse iam posui. Lamina uel ferrea, uel aenea
 etiam ab altero capite duos utrinq; deorsum conuersos uncōs habet:
 ab altero duplicata alteribus, leuiterq; extrema in eam partem in-
 clinata, quæ sinuata est: insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perfo-
 rata est: hæc iuxta telum transuersa demittitur. deinde ubi ad imum
 mucronem uentum est: paulum torquetur, ut telum foramine suo exci-
 piat. cum in cauo mucro est, illico duo digiti subiecti partis alterius
 unās simul et ferramentum id extrahunt, et telum. Tertium genus

LIBER

telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute integrum intus insedit. in omnibus his latius vulnus aperiendum, idque quod inest, ea qua uenit, forfice extrahendum est. Accedit uero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum uel ossi inhaesit, uel in articulo se inter duo ossa demersit: in osse usque eo mouendum est, donec is locus laxetur, qui macronem momordit: Et tum uel manu, uel forfice telum extrahendum est: quae ratio in dentibus quoque eiciendis est. Et uix unquam ita telum non sequitur. sed si morabitur, excuti quoque ictum aliquo ferramento poterit. Vltimum est, ubi non euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoque foramine ad speciem littere + contra telum os excidere sic, ut linea quae diducuntur, ad telum spectent. eo facto id necesse est labet, et facile auferatur. Inter duo uero ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenis uel deliganda, et per has in diuersas partes diducenda sunt, ut nervos distendant. quibus exte-
tis laxius inter ossa spacium est, ut sine difficultate telum recipiatur. illud uidendum est, sicut in alijs locis posui, ne quis nervus, aut uena, aut arteria a telo laedatur: dum id extra itur: eadem scilicet ratione quae supra posita est. at si uenenato quoque telo quis ictus est: huiusdem omnibus si fieri potest etiam festinantius actis adijcenda curatio est: quae uel epoto ueneno, uel a serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius extracto telo medicina non alia est, quam quae esset si corpore icto nihil inhaesisset. de qua satis alio loco dictum est.

De ganglijs, et meliceride, et atheromate, et steatomate
capitis tuberculis. Caput VI.

h Accuenire in qualibet parte corporis possunt. reliqua cer-
tas sedes habent: de quibus dicam orsus a capite. in hoc mul-
ta, uariaque tubercula oriuntur: ganglia, meliceridas, et athe-
romata nominant: alijsque etiam nunc uocabulis quaedam alij discer-
nunt, quibus ego steatomata quoque adijciam. quae quauis et in cerui-
ce, et in alij, et in lateribus oriri solent: per se tamen non posui, cum
omnia ista mediocres differentias habeant: ac nec periculo terreant,
neque diuerso genere curentur. Omnia autem ista et ex paruo inci-
piunt, et diu paulatimque increscunt: et tunica sua includuntur: quae-
dam ex his dura, ac renitentia: quaedam mollia, cudentiaque sunt, quae-
dam spacio nudantur: quaedam tecti capillo suo permanent: feretque
sine dolore sunt. quid intus habeat, ut coniectura praesagiri potest, sic
ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest. maxime tamen in his
quae renitentur, aut lapillis quaedam similia, aut concreti, conferti que

pili reperiuntur. In his uero quæ cedunt, aut melli simile aliquid, aut tenui pulcritudine, aut quasi rasæ cartilagini, aut carni hebeti, et cruentæ: quibus aliqui colores esse consuerunt fereq; ganglia reperiuntur. atheromati subest quasi tenuis pulcritudine. meliceridi liquidior humor: ideoq; pressum circumfluit. steatomati pingue quiddam, idq; latissime patere consuevit, resoluitq; totam cutem superpositam sic, ut ea labet, cum in cæteris sit astrictior. omnia derasa ante si capillis continguntur, per medium oportet incidere: sed steatomatis tunica quæq; secunda est, ut effundatur quicquid intus coit: quia non facile à cute subiecta carne ea separatur: in cæteris ipsa tunica inuoluta seruanda est. Protinus autem alba, et intenta se ostendit. tum scalpelli manubriolo diducenda à cute, et carne est: eijciendaq; cum eo quod intus tenet. si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus inhaesit, ne is lœdatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. ubi tota exempta est, committenda ora, fibulaq; his iniicienda, et super medicamentum glutinans dandum est. ubi uel tota tunica, uel aliquid ex ea relictum est: pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum uicijs quæ scalpello, et manu curantur. Cap. VII.

Ed ut hæc neq; genere uicij, neq; ratione curationis inter se multum distant sic, in oculis quæ manum postulant, et ipsa diuersa sunt, et aliter, aliterq; curantur. igitur in superioribus palpebris uesicæ nasci solent pingues, grauesq; quæ uix attollere oculos sinunt: leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Ferè uero in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atq; ita cute intenta, scalpello transversam lineam incidere, suspensa leuiter manu, ne uesica ipsa uulneretur: et ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat: tum digitis eam apprehendere oportet, et euellere: facile autem sequitur. deim super unguis collirio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi super inunguntur. paucissimisq; diebus cicatrix la inducitur. molestus est ubi incisa uesica est. Effundit enim humor: neq; postea quia tenuis admodum est, potest colligi: si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

De crithæ tuberculo palpebrarum.

Ne eadem palpebra super pilorum locum tuberculū paruum nascitur, quod à similitudine ordeï à grecis *upion* nominatur tunica quiddam quod difficulter maturescit cōprehensum est. id uel calido pane, uel cera subide assefacta foueri oportet

LIBER

sic ne nimis is calor sit: sed facile ea parte sustineatur. hac enim ratione sepe discutitur: interdum concoquitur: si pus se ostendit, scalpello dividi debet, & quicquid intus humoris est, exprimere. Eodem deinde uapore postea quoque foueri, & super inungi, donec ad sanitatem perveniat.

De chala^zia palpebrarum.

Lia quoque quaedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur: sed neque utique figurae eiusdem, & mobilia simul, atque digito huc uel illuc impelluntur: ideoque ea χαλα^zia vocantur. haec incidi debent: si sub cute sunt ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiori. dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt: ac si intus plaga est: inungendum primo lenibus: deinde acrioribus. si extra, super dandum emplastrum, quo id glutinetur.

De ungue oculorum, quod *μepύριον* à grecis vocatur.

Unguis uero, quod *μepύριον* greci vocant: est membrana nervosa oriens ab angulo, quae nonnunquam ad pupillam quoque pervenit, eique officit. saepius à narium, interdum etiam à temporum parte nascitur. hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur: si inueteravit, iamque ei crassitudo quoque accessit: excidi debet. Post abstinentiam uero unius diei, uel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, uel sic aduersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. quidam si in sinistro oculo uicium est, aduersum. si in dextro: resupinum collocari uolunt. alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico: sed ab hoc: si ille aduersus est, inferiorem, si supinus: superiorem. tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recurvato subijcere extremo ungui debet, eumque infingere, atque eam quoque palpebram tradere alteri, ipse hamulo apprehenso lenare unguem, eumque acu trajcere linum trahente: deinde acum ponere: lini duo capita apprehendere, & per ea erecto ungue si qua parte oculo inhaeret manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum ueniat: deinde inuicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. duplex enim periculum est: ne uel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum uix ullam recipiat curationem, uel ex angulo quoque arumcula alscidatur, quae si uehementius unguis ducitur, sequitur. Ideoque decipit: ac si alscissa est, patescit foramen: per quod postea semper humor descendit *πύριον*

*radā græci vocant. Verus ergo anguli finis utiq; noscendus est, qui
 ubi satis constitit, non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus
 est: deinde excidenda ea membranula, ne quid ex angulo lædatur.
 Eo deinde ex melle linamentum super dādum est: supraq; linteolum,
 & aut spongia, aut lana succida, proximisq; diebus diducendus quo
 tidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebræ glutinentur. siquidem
 id quoq; tertium periculum accedit: eodemq; modo linamentum im-
 ponendum, ac nouissime inungendum collirio, quo ulcera ad cicatri-
 cem perducuntur. sed ea curatio uerna esse debet, aut certe ante hye-
 mem: de qua re ad plura loca pertinate semel dixisse satis erit. nam
 duo genera curationum sunt. alia, in quibus eligere tempus non licet,
 sed utendum est eo, quod incidit, sicut in vulneribus, & in fistulis.
 alia in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum, & facile
 est: sicut euenit in ijs, quæ & tarde crescunt, & dolore non cruci-
 ant: in his uer expectandum est. aut si quid magis pressit, melior ta-
 men autumnus uel æstas, quam hyems est. atq; is ipse medius, iam fra-
 ctis æstatibus, nondum ortis frigidibus. quo magis autem necessaria
 pars erit quæ tractabitur, hoc quoq; maiori periculo subiecta est. et
 sæpe quæ maior plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio serua-
 bitur.*

De enchanti tuberculo.

X curatione uero unguis ut dixi, uida nascuntur: quæ ipsa alijs quoq; de causis oriri solent. interdum enim fit in angulo, parum ungue exco, uel aliter tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur, & Xarvis græce nominatur. excidi hamulo, & circumcidi debet, hic quoq; diligenter temperata manu, ne quid ex ipso abscedat. tum exiguum linamentum respergendum est uel cædria, uel atramento sutorio: inq; eum angulum ductis palpebris inferendum: supraq; eodẽ modo deligandum. proximisq; diebus similiter nutriendum tantum, ut primis aqua egelida, uel etiam frigida foveatur.

De ancyloblepharo oculorum vicio.

Interdum inter se palpebræ coalescunt: apeririq; non potest
oculus: cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebræ cum
albo oculi coherescant: scilicet cum in utroq; fuit ulcus ne-
gligenter curatum: sanescendo enim quod diduci potuit, et debuit, glu-
tinabit: ἀμυλοβλήτωπος sub utroq; nicio græci vocant. Palpebræ tan-
tum inter se coherētes non difficulter diducuntur, sed interdum fru-

Анжелі Сорт.

P

LIBER

stra: nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet: quia bene res saepius cedit. igitur aduersum specillum inferendum, diducendæq; eò palpebræ sunt, deinde exigua penicilla interponenda, donec exulæratio eius loci finiatur. at ubi albo ipsius oculi palpebra inhæsit: Heraclides tarentinus auctor est, aduerso scalpello subsecare magnam moderatione, ut neq; ex oculo, neq; ex palpebra quicquam abscidatur. ac si necesse est, ex palpebra potius. post hæc inungatur oculus medicamentis, quibus aspritudo curatur: quotidieq; palpebra uertatur, non solum ut ulceri medicamentum inducatur, sed etiam ne rursus inhaereat, ipsiq; etiam præcipiatur, ut sæpe eā duobus digitis attollat. ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoq; multatentasse, neq; unq̃ profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhæserit, memoriæ prodit.

De ægylopa fistula oculorum.

Etiam num in angulo, qui naribus propior est, ex aliquo uicio quasi parua fistula aperitur, per quam pituita assidue defillat. αἰνῶπις græci uocāt: idq; assidue male habet oculum: nonnunquam etiam exeso osse usq; ad nares penetrat, idq; interdum naturam carcinomatis habet. ubi intentæ uenæ et recuruatæ sunt: color pallet: cutis dura est, et leui tactu irritatur: inflātionemq; in eas partes, quæ coniunctæ sunt: euocat. ex his eos, qui quasi carcinoma habent, curare periculosum est. nam mortem quoq; ea res maturat. eos uero quibus ad neres tendit, superuacuum. neq; enim sanescunt. at quibus id in angulo est: potest adhiberi curatio, cum eo ne ignotum sit, esse difficilem: quantoq; angulo propius id foramen est, tanto difficilior est. quoniam per angustum est in quo uersari manus possit. recenti tamen remedium facilius est. sed hamulo summum eius foraminis excipiendum: deinde totum id cauium, sicut in fistulis dixi, usq; ad os excidendum, oculoq; et cæteris iunctis partibus bene obiectis, os ferramento adurendum est uehementius. quod si iam carie uexatum est, quo crassior his squama, accedat, quidam adurētia imponunt, ut atramentum sutorium, uel chalcididem, uel æruginem rasam: quod et tardius et non idem facit. osse adusto curatio sequitur eadem, quæ in cæteris usis.

De pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Pili uero, qui in palpebris sunt duabus de causis oculum irritare consueverunt. nam modo palpebræ superioris summa cutis relaxatur et procidit. quo fit ut eius pili ad ipsum oculum con-

uerantur: quia non simul cartilago quæq; se remisit. modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcreſcit, qui protinus intus ad oculum tendit. curationes, hæ sunt. ſi pili nati ſunt qui non debuerunt: tenuis acus ferrea ad ſimilitudinem hæſtæ lata in ignem coniicienda eſt. deinde candens ſublata palpebra ſic, ut eius permiſſi pili in conſpectum curantis ueniant, ſub ipsis pilorum radiabus ab angulo immittenda eſt, ut ea tertiam partem palpebræ tranſueat. deinde iterum, tertioq; uſq; ad alterum angulum: quo fit ut omnes pilorum radices aduſtæ emoriantur. tum ſuperimponendum medicamentum eſt, quod inflammationem prohibeat. atq; ubi cruſtæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. facillime autem id genus ſaneſcit. quidam autem acui tranſuxta pilos in exteriorẽ partem palpebræ oportere, eamq; tranſmitti duplicem capillum muliebrẽ ducentem, atq; ubi acus tranſiit, in ipsis capilli ſinum, qua duplicatur, pilum eſſe coniiciendum, et per eum in ſuperiorem palpebræ partem attrahendum, ibiq; corpori agglutinandum, et imponendum medicamentum, quo foramen quoq; glutinetur. ſic enim fore ut his pilus in exteriorẽ partem poſtea ſpectet. id primum fieri non poteſt niſi in pilo longiore, cum ferre breues eo loco naſcantur. deinde ſi plures pili ſunt, neceſſe eſt longum tormentum: cum totiens acus tranſuet, magnam inflammationẽ moueat. Noniſſime cum humor aliquis ibi ſubſit, oculo et ante per pilos, et tum per palpebræ foramina affecto, uix fieri poſſit ut gluten quo uinctus eſt pilus, nõ reſoluatur. eoq; fit ut is, eò unde ut abductus eſt: redeat ea uero curatio, quæ palpebræ laxioris ab omnibus frequentatur, nihil habet dubij. ſiquidem oportet conſpecto oculo mediam palpebræ cutem, ſiue ea ſuperior, ſiue inferior eſt: apprehẽdere digitis, ac leuare. tum conſiderare quantulo detracto futurum ſit, ut naturaliter ſe habeat. ſiquidem hic quoq; duo pericula circumſtant. ſi nimium fuerit exaſum, ne contegi oculus non poſſit. ſi parũ, ne nihil actum ſit, et fruſtra ſectus aliquis ſit. qua deinde incidendum uidebitur, per duas lineas atramento notandum eſt ſic, ut de interiorẽ, quæ pilos continet et propiore ei linea aliquid relinquatur, quod apprehendere acis poſtea poſſit. his conſtitutis ſcalpellus adhibendus eſt. et ſi ſuperior palpebra eſt: ante ſi inferior, poſtea propius ipsis pilis incidendum. initiumq; faciendum in ſiniſtro oculo, ab eo angulo, qui tempore in dextro, ab eo qui naribus propior eſt, idq; qd inter duas lineas eſt. excidendum. deinde oræ uulneris inter ſe ſimplicia futura committendæ, operiendusq; oculus eſt, et ſi parum palpebra deſcendet, laxanda utiq; ſi nimium, aut aſtringenda, aut etiam rurfus tenuis habennula ab ulteriore ora excidenda. ubi ſecta eſt, aliæ

LIBER

sutura adiicienda, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. idq; si levis inclinatio est, etiam solum satis tuctur. inferior palpebra eo non eget. his factis spongia ex aqua frigida expressa super deliganda est. postero die glutinans emplastrum iniiciendum. quarto sutura tollenda est: Et collirio, quod inflammationes reprimat, superinungendum.

De lagophthalmo oculorum.

Nonnunquam autem nimium sub hac curatione excisa cute evenit ut oculus non contegatur. idq; interdum etiam alia de causa fit: *λαγόφθαλμος* græci appellant. in quo si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest. si exiguum, mideri licet: paulum infra supercilium cutis incidenda est, lunata figura cornibus eius deorsum spectantibus. altitudo esse plagæ usq; ad cartilagineam debet, ipsa illa nihil læsa. nam si ea incisa est, palpebra concidit: neq; attolli postea potest. cute igitur tantum diducta sit, ut paulum in ima oculi ora descendat: hiantem scilicet super plagam, in quam linamentum coniiciendum est: quod et coniungi diductam cutem prohibeat: Et in medio carunculam ciet: quæ ubi eum locum implevit, postea recte oculus operitur.

De ectropio.

Superioris autem palpebræ vitium est, quod parum descendit, ideoq; oculus non contegitur: sic inferioris, quod parum sursum attollitur, sed pendet, et hiat, neq; potest cum superiore committi. atq; id quoq; evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute: *ἐκτροπίον* græci vocant. si ex mala curatione est, eadem ratio medicinæ est, quæ supra posita est: plagæ tantum cornua ad maxillas non ad oculum convertenda sunt. si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum. at quarto die vapore aquæ calidæ foveandum, inungendumq; medicamentis ad cicatricem perducentibus.

De staphylomate oculi.

Hæc ferè circa oculum in angulis, palpebræq; incidere consuevit. in ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, et si-

milis figura adino fit. unde id *σφύλωμα* græci uocant. curatio duplex est. altera ad ipsas radices per medium transuere, ac duo lina ducente. deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore astringere inter se: quæ paulatim secundo id excidunt. altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere: deinde spodium, aut admiam inficere. utrolibet autem facto album oui lana excipiendum & imponendum, posteaq; uapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis ungendus est.

De clauis oculorum.

Clauis autem uocantur, callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figura similitudine est. hos ad imam radicem perforare ac commodissimum est, infraq; eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

De natura oculorum, & eorum suffusione.

Suffusionis iam alijs feci mentionem, quia cum recens indit, medicamentis quoq; sepe discutitur: sed ubi uetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. de qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. cuius cognitio cum ad plura loca pertineat, tum uel præcipue ad hunc pertinet. is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior à græcis *νεπαρωιδὲς* uocatur. ea, qua parte alba est satis crassa: pupillæ loco extenuatur. huic interior adiuncta est media parte: qua pupilla est: modico foramine concava, circa tenas ulteriores partibus ipsa quoq; plenior. quæ *χορωιδὲς* à græcis nominatur. hæ duæ tunice cum interiora oculi cingant: rursus sub his coeunt: extenuataq; & in unum coactæ per foramen quod inter ossa est: ad mēbra nam cerebri perueniunt, eoq; inhærescunt. sub his autem, qua parte pupilla est, locus nactus est. deinde infra rursus tenuissima tunica quam Herophilus *ἀπαχοειδὴς* nominauit. Ea media subsidit, eoq; continuo continet quiddam, quod à nitri similitudine *ὕαλοειδὲς* græci uocant. id neq; liquidum, neq; aridum est: sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color uel niger est, uel cæsius, cum summa tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiore parte membranis la includit. sub his gutta humoris est oui albo similis, à qua uidendi facultas proficiat, *μυσκαλλοειδὲς* à græcis nominatur. igitur uel ex morbo, uel ex ictu concreuit humor sub duabus tunicis, qua locum nactum esse proposui: isq; paulatim indurecens interiori potentie se opponit. uicijq; eius plures species sunt: quædam sanabiles: quædam

Aurelij Cor.

p ij

LIBER

quæ curationem non admittunt. nam si exigua suffusio est, si immobilis: colorem uero habet marinæ aquæ, uel ferri nitentis, & à latere sensum aliquem fulgoris relinquit spes super est. si magna est, si nigra pars oculi amissa naturali figura in aliam uertit, si suffusioni color ceruleus est, aut auro similis, si labat, & hac, atq; illac mouetur, uix unquam succurritur. ferè uero peior est: quo ex grauiore morbo, maioribus ne capitis doloribus, uel ictu uehementiore orta est. neq; idonea curatio, si senilis ætas est, quæ sine nouo uicio tamen acie hebetem habet. at ne puerilis quidem, sed inter hæc media ætas. oculus quoq; curationi neq; exiguus, neq; conatus, satis oportunus est, atq; ipsius suffusionis quædam maturitas est. expectandum igitur est donec iam non fluere, sed durities quædam concreuisse uideatur. ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet: pridie ab omnibus abstinere. post hæc in aduerso sedili collocandus est loco lucido, lumine aduerso sic: ut contra medicus paulo altius sede at. à posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, & immobile id præstet. nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. quin etiam ipse oculus qui curabitur: immobilior faciendus est, super alterum lana imposita & deligata. curari uero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. tum acus admouenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaq; demittenda: sed recta est per summas duas tunicas medio loco inter nigrum oculi, & angulum temporis propiorem è regione mediæ suffusionis, sic ne quæ uena lædatur. neque tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur, ad quem cum uentum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest: quia prementi nihil renititur. ubi eò uentum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est, leuiterq; ibi uerti, & paulatim eà deducere infra regionem pupillæ debet. ubi deinde eam transit, uehementius imprimi, ut inferiori parti insidat. si hæsit, curatio expleta est. si subinde redit, eadē acu magis conadenda, & in plures partes dissipanda est: quæ singulæ & facilius conduntur, & minus late offiunt. post hæc educenda acus recta est, imponendumq; est lana molli exceptum oui album, & supra: quod inflammationem coerceat: atque ita desiniciendum. post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorum inunctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primum liquido, ne maxillæ laborene, deinde inflammatione finita tali, qualis in uulneribus propositus est. quibus, ut aqua quoq; diutius bibant, necessario accedit.

d E pituita quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus
medicamentis agendum est, iam explicui. nunc ad ea ueni-
am: quae curationem ex manu postulant. animaduertimus
autem quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore te-
nuis madere, quae res asperitudinem continuat, ex leuibus momentis in-
flammationes et lippitudines excitat, totam denique uitam hominis in-
festat. idque in quibusdam nulla ope adiuuari potest, in quibusdam sa-
nabile est. quod primum discrimen est nosse oportet, ut alteri succur-
ratur, alteri manus non iniiciatur. ac primum supernacua curatio
est in his, qui ab infantibus id uicium habent, quia necessario mar su-
rum est usque ad mortis diem: deinde non necessario etiam in his, qui
bus non multa, sed acris pituita est. siquidem manu nihil adiuuatur.
medicamentis et uictus ratione, quae crassiores pituitam reddit, ad
sanitatem peruenimus. lata etiam capita uix medicinae patent. tum in-
terest uenae pituitam emittant: quae inter caluariam et cutem sunt,
an quae inter membranam cerebri et caluariam. superiores ferè
per tempora oculos rigant: inferiores per eas membranas, quae ab oculis
ad cerebrum tendunt. potest autem adhiberi remedium his: quae su-
pra os fluunt, non potest his, quae sub osse. ac ne his quidem succurri-
tur, quibus pituita utrinque descendit. quia lenata altera parte nihilo-
minus altera infestat. quid sit autem hoc ratione cognoscitur. raso ca-
pite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspèditur, à super
alijs usque ad uerticem illini debent. si siccus oculi esse coeperunt, appa-
ret per eas uenas, quae sub cute sunt, irrigari. si nihilominus madent,
manifestum est sub osse descendere. si est humor, sed leuior, duplex ui-
cium est. plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur: quos superiores
uenae exerceant, ideoque pluribus etiam opitulari licet. idque non in
græcia tantummodo, sed in alijs quoque gentibus celebre est, adeo ut nul-
la medicinae pars magis per nationes quoque exposita sit. reperi in
græcia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent, duabus in occi-
pitis rectis: una super eas transversa, deinde duabus super aures, una
inter eas item transversa, tribus inter uerticem et frontem rectis. re-
perti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora didicerent: cogni-
tisque ex motu maxillarum musculorum inijs, leuiter super eos cutem
inciderent. inductisque per retusos hamos oris infererent linamen-
ta, ut neque inter se cutis antiqui fines committerentur, et in medio
atro incretceret, quae uenas ex quibus humor ad oculos transiret,
astringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à

media aure ad mediam alteram aurem: deinde à naribus ad uerticem. tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguine fuso os ibidem adusserunt. nihilominus autem: et in temporibus & inter frontem atq; caluariam eminentibus uenis idem cadens ferrum admovent. frequens curatio est uenas in temporibus adurere, quæ ferè quidem in eiusmodi malo timent, sed tamen ut inflentur, magisq; se ostendant. cernix ante modice deliganda est, tenuibusq; ferramentis & reclusis uenæ adurendæ, donec in oculis pituitæ cursus conquiescat. id enim signum est quasi ex cæcatorum itinerum per quæ humor ferebatur. ualentior tamen medicina est: ubi tenues conditæq; uenæ, ideoq; legi non possunt. eodem modo cernice deligata: retentoq; ab ipso spiritu, quo magis uenæ prodeant: atramento notare eas contra tempora et inter uerticem ac frontem: deinde cernice resoluta quæ notæ sunt uenas incidere & sanguinem mittere. ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem timide, ne subiecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem uero et uerticem, uehementer, ut sic squama ab osse recedat. efficacior tamè etiam num est asporum curatio, qui uerticem usq; ad os adurunt sic, ut squamam remittat. sed nihil melius est quam quod in gallia quoq; comata sit. ubi uenas in temporibus et in superiore capitis parte legunt. adustæ quomodo curanda sint iam explicui. nunc illud adijcio, neq; ut crustæ decidant: neq; ut ulcus impleatur adustis uenis esse properandum. ne uel sanguis erumpat, uel cito pus supprimatur, cum per hoc scitescere eas partes opus sit: per illud exhauriri opus non sit. si quando tamen sanguis eruperit, infricanda medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ne adurant. quemadmodum autem uenæ deligendæ sint: quidq; lectis his faciendum sit, cum uenero ad crurum uarices dicam.

De aurium morbis, qui manu & scalpello curantur. Cap. VIII.

Et ut oculi multiplicem curationem etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt: quæ in hac medicinae parte tractentur. solet tamen euenire uel à primo natali die protinus, uel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, ideoq; audiendi usus careat. quod ubi incidit: specillo tentandum est, alte ne id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. nam si alte est: prementi non cedit. si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur uernorum, & ex ea mortis periculum sit. hoc facile curatur. nam qua cauum esse debet, uel medicamen

tum

tum aliquod imponendum est ex adurentibus, uel candente ferro aper-
riendum, uel etiam scalpello incidendum. cumq; id patefactum, &
iam ulcus purum est: coniicienda cō pinna est illita medicamento cicat-
ricem inducente, circaq; idem medicamentum dandum, ut cutis circa
pinnam sanescat: quo fit ut ea remota postea facultas audiendi sit: at
ubi aures in uiro putæ perforatæ sunt, & offendunt, trahere id ca-
uū celeriter candente acu satis est, ut leniter eius ora exulcerentur, aut
etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde impo-
nere id quod purget, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem
inducat. quod si magnū id foramen est, sicut solet esse in his, qui maio-
ra pondera auribus gesserunt: incidere quod superest ad extremum
oportet, supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac
medicamentum, quo id glutinetur, imponere. tertium est: si quid ibi
curti est, sarcire. quæ res cum in labris quoq; & naribus fieri pos-
sit: eandem autem rationem habeat, simul explicanda est.

*Curta in auribus, labrisq; ac naribus, quomodo sarciri &
curari possint. Cap. IX.*

Uita igitur in his tribus, ac si qua parua parua sunt: cura-
ri possunt: si qua maiora sunt, aut non recipiunt curationem
aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora
ante fuerint. atq; in aure quidem & naribus deformitas sola time-
ri potest. in labris uero si nimium contracta sunt, usus quoq; necessa-
rii iactura fit. quia minus facile & cibis assumitur, & sermo expli-
catur. neq; enim creatur ibi corpus: sed ex vicino adducitur: quod in
leui mutatione & nihil eripere, & fallere oculum potest: in magna
non potest: neq; senile autem corpus, neq; quod mali habitus est, neq;
in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinæ idoneum est: quia
nusquam celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur. ratio curatio-
nis eiusmodi est. id quod curatum est in quadratum redigere. ab in-
terioribus eius angulis lineas transuersas incidere, quæ ceteriore par-
tem ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea quæ sic resoluimus, in
unum adducere: si nō satis iunguntur, ultra lineas, quas ante fecimus,
alias duas lunatas, & ad plagam conuersas immittere, quibus sum-
ma tantum cutis diducatur. sic enim fit ut facilius quod adducitur, se-
qui possit: quod non ui cogendum est, sed ita adducendum, ut ex facili
subsequatur, & demissum non multum recedat. interdum autem ab
altera parte cutis haud omnino adducta, deformem quem reliquit lo-
cum reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta ha-

LIBER

benda est. ergo neq; ex imis auribus, neq; ex medio naso imis uenarum partibus, neq; ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. utrinq; autem petemus: si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris deerit. quæ tamen interdum etiam duobus locis curata esse consuerunt. sed eadem ratio curandi est. si cartilago in eo quod incisum est, eminet: excidenda est. neque enim aut glutinatur, aut acututo traicitur. neq; longe tamen excidi debet: ne inter duas oras liberæ cutis, utrinq; coitus puris fieri possit. tum iunctæ oræ inter se suenda sunt utrinq; ante apprehensa, et quæ priores lineæ sunt: ea quoq; suturæ iniiciendæ sunt. sicutis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. in ultiores uero lunatasq; plagas linamentum dandum est, ut caro increescens uulnus impleat, summæq; cura quod ita sutum est, tum esse apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. ergo etiam tertio quoq; die fouendum erit uapore aquæ calidæ: rursusq; idem medicamentum iniiciendum, fereq; septimo die glutinatum est. tum suturæ eximi, et ulcus ad sanitatem perducere debent.

De polypi curatione per ferrum. Cap. X.

Polypum uero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari iam alias posui. ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spathe facto resolueri ab osse oportet adhibita diligentia, ne infra cartilago lædatur, in qua difficilis curatio est. ubi abscissus est, unco ferramento extrahendus est. tum implicitum linamentum, uel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis suppressitur: eoq; nares leniter implendæ. sanguine suppresso, linamento ulculum purgandum est. ubi purum est, eo pinna eodem modo quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

De ozæna. Cap. XI.

Id autem uitium, quod ὀζæνα à græcis uocatur, si medicamenti non cederet, quemadmodum manus curandum esset, apud magnos chirurgos non reperi. Credo quia res raro ad sanitatem satis proficit: cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. apud quosdam tamē positum est uel sutilem fistulam, uel eodem scriptorium calamus in narem esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum

esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse ærugine et melle. ubi purus est: lycto ad sanitatem perducendum. vel na rem incidendam esse ab ima parte ad os, ut et conspici locus possit, et facilius candens ferramentum admoeri. tum sui na rem debere, et adustum quidem ulcus eadem ratione curari. suturam uero illini vel spuma argenti vel alio glutinante.

De ore uicijs, quæ manu et ferro curantur.

Cap. XII.

De dentibus.

In ore quoque quedam manu curantur. ubi in primis dentes nonnunquam mouentur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter ginguarum arescentium uicium. oportet in utrolibet candens ferramentum ginguis admoeri, ut leuiter attingat, non ut insadat. adustæ ginguæ melle illinendæ, et melle eluendæ sunt. ut pura ulcera esse ceperunt, arida medicamenta infricanda sunt ex his quæ reprimunt. si uero dens dolores mouet, eximique eum, quia medicamenta nihil adiuvant, placuit, circumradi debet, ut gingua ab eo resoluatur. tum is concutiendus est. eaque facienda donec bene moueatur. nam dens hærens cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco mouetur. idque etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora oculis uel cõcutere. tum si fieri potest manu, si minus, forfice dens excipiendus. ac si exesus est, ante id foramen, uel linamento, uel bene accommodato plumbo replendum est ne sub forfice confringatur: recta uero forfex ducenda est, ne inflexis radicibus: os earum, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. neque ideo nullum eius rei periculum est, utique in dentibus breuibus, qui ferè longiores radices, habent. sæpe enim forfex cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os ginguæprehendit et frangit. protinus autem ubi plus sanguinis profluit, scire licet aliquid ex osse fractum esse. ergo specillo conquirenda est testis, quæ recessit et uolsella protrahenda est. si non sequitur, inadi gingua debet, donec labans ossis testis recipiatur. quod si fractum statim non est, indurescat extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. sed imponendum calidum ex farina et fice cataplasma est, donec ibi pus moueatur. tum incidendi gingua debet. pus quoque multum profluens ossis fracti nota est. itaque etiam tum id extrahi conuenit. nonnunquam etiam eo læso, fistula fit quæ eradi debet. Dens autem scaber, qua parte niger est, radedus est, illinendusque rose flore contrito, cui galle quarta pars et altera myrrhæ sit adiecta. continendumque ore crebro uinum meracum. atque

LIBER

in eo casu uelandum caput, ambulatione multa, frictione capitis: cibo non acri utendum est. at si ex ictu uel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene haerent, uinciendi sunt. continendaq; ore reprimenda, ut uinum in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens nascitur, quam prior excidat, is qui cadere debuit circum purgandus, et euellendus est. is qui natus est in locum prioris quotidie digito adurgendus, donec ad iustam magnitudinem perueniat. quotienscumq; dente excepto radix relicta est, protinus ea quoq; ad id facta forfice, quam *ῥιζοτομος* graeci uocant: eximenda est. Tonsillas autem quae post inflammationes induruerunt: *αμυγδαλές* autem graecis appellantur: cum sub leui tunica sint, oportet digito circum radere et euellere: si ne sic quidem resoluntur, hamulo excipere, et scalpello excidere: tum ulcus aceto eluere, et illinere uulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

De uua.

Va si cum inflammatione descendit, doloriq; est, et sub rubicundi coloris: praecidi sine periculo non potest. solet enim multum sanguinem effundere. itaq; melius est his uti, quae alias proposita sunt. si uero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra iustum modum a pituita deducta est, et est tenuis, acuta, alba, praecidi debet. itemq; si ima, liuida et crassa, summa, tenuis est. neq; quicquam commodius est quam uolsella prehendere, sub eaq; quod uolumus, excidere. neq; enim ullum periculum est, ne plus minusue praecidatur: cum liceat tantum infra uolsellam relinquere: quantum inutile esse manifestum est: idq; praecidere quo longior uua est, quam esse naturaliter debet. post curationem eadem facienda sunt, quae in tonsillis proxime posui.

De lingua.

Inguua uero quibusdam cum subiecta parte a primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidem possunt. horum extrema lingua uolsella prehenda est, sub eaq; membrana incidenda magna cura habita, ne uenae quae iuxta sunt: uolentur, et profusione sanguinis noceant. reliqua curatio uulneris in prioribus posita est: et pleriq; quidem, ubi consanuerunt, loquuntur. ego autem cognoui qui sucisa lingua, cum abunde super dentes eam promerret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. adeo in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod se qui conuenit.

Sub lingua quoque interdum aliquid abscedit, quod ferè consistit in tunica: doloresque magnos mouet. quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis usque ad tunicam excidenda est: deinde utrinque orae hanculis excipiendae, et tunica undique circumdata liberanda est, magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua maior uena incidatur.

De labris.

Iabra autem saepe finduntur, eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur: qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat: sed has, si in summo sunt, medicamentis curare commodius est, quae ad ulcera oris fiunt. si uero altius descenderunt, necessarium est tenui ferramento adurere: quod spatula simile quasi transcurrere, non imprimi debet. postea facienda eadem sunt, quae in auribus adusis exposita sunt.

De ceruicis uicijs, et curatione. Cap. XIII.

In ceruice inter cutem, et asperam arteriam tumor incre-
ascit: *βρογχολαν* graeci uocant. quo modo caro hebes, modo humor aliquis melli, aquae uel similis includitur: interdum etiam minutis ossibus pili immixti, ex quibus quicquid est quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica exeditur. quo facto siue humor est, profluit: siue quid densius, deinde digitis educitur: tum ulcus sub linamentis sanescit: sed scapellae curatio breuior est. Medio tumore una linea inciditur usque ad tunicam: deinde uiciosus sinus ab integro corpore digito separatur: totusque cum uelamento suo eximitur. tum aceto, cui uel salem, uel nitrum aliquis adiecit, eluitur. oraeque una sutura iunguntur: caeteraque eadem quae in alijs futuris super injiciuntur. Leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia: linamentisque id curandum est caeteris praeuentibus.

De umbilici uicijs. Cap. XIII.

Sunt etiam circa umbilicum plura uicia, de quibus propter raritatem inter auctores parum constat. uerisimile est autem id à quoque praetermissum, quod ipse non cognouerit: à nullo, id quod

non uiderat fictum commune omnibus est, umbilicum indecore pro-
munere. causæ requiruntur. meges tres has posuit. modo intestinū eò ir-
rumpere. modo omentum. modo humorem. Sostratus nihil de omento
dixit. duobus hisdem adiecit, carnem ibi interdum increſcere, eamq;
modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque
omenti mentionem omisit. sed eadem tria causatus spiritum quoq; in-
terdum eò dixit irrumpere. Heron omnibus his quatuor positis, &
omenti mentionem habuit, & eius quod simul & omentum & intesti-
num habuerit. quid autem horum sit, his indicij cognoscitur. ubi in-
testinum prolapsum est, tumor neque durus neque mollis est omni fri-
gore comminuitur, non solum sub omni calore, sed etiam retento spiri-
tu crescit. sonat interdum, atq; ubi resupinatus est aliquis delapso in-
testino ipse desidit. ubi uero omentum est, cætera similia sunt, tumor
mollior & ab una parte latus extenuatum in uentrem est. si quis ap-
prehendit: elabatur. ubi utrunque est: inditia quoque mixta sunt, &
inter utrunque mollities. at caro durior est, semperq; etiam resupina-
to corpore tumet, prementiq; non cedit, prioribus facile cedentibus. si
uiciosa est easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. humor
autem si premitur: circumfluit. at spiritus pressus cedit, sed protinus re-
dit resupinato quoq; corpore tumorem in eadem figura tenet. ex his
id, quod ex spiritu uicium est, medicinam non admittit. caro quoq; car-
cinomati similis cum periculo tractatur. itaq; omittenda est. sana
excidi debet, idq; uulnus linamentis curari. humorem quidam uel
inciso summo tumore effundunt, & uulnus hisdem linamentis curant.
in reliquis uariæ sententiæ sunt. ac resupinandum quidem corpus
esse res ipsa testatur, ut in uterum, siue intestinum, siue omentum est,
delabatur. sinus uero umbilici tum uacius à quibusdam duabus re-
gulis exceptus est, uehementerq; earum capitibus deligatis ibi emori-
tur. à quibusdam id uicium acu tractatur duo lina ducente. deinde
utriusq; lini duobus capitibus diuersæ partes astringuntur. quod in
una quoq; oculi fit. nam sic id quod supra uinculum est, moritur.
adiecerunt quidam, ut antequam uincarent: summum una linea in-
ciderent, exciderentq; quo facilius digito demisso, quod illuc irrupis-
set, depellerent. tum deinde uinxerunt. sed abunde est, iubere spiri-
tum continere, ut tumor quantus maximus esse potest, se ostendat.
tum imam basim eius atramento notare, resupinatoq; homine, digi-
tis tumorem cum premere, ut si quid delapsum non est: manu cogi-
tur. post hæc umbilicum attrahere, & qua nota atramenti est lino
uehementer astringere. deinde partem superiorem aut medicamenti
aut ferro adurere donec emoriatur. atq; ut cætera uisita uulnus nutri-

re: idq; non solum ubi intestinum uel omentum, uel utrumque est, sed etiam ubi humor est: optime proficit: sed ante quædam uisenda sunt, ne quod ex uinculo periculum sit: nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est, sed à septimo ferè anis ad quartumdecimum. deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est. at quod mali habitus est, quodq; papulas, impetignes, similiaq; habet idoneum non est. leuibus quoq; tumoribus facile subuenitur. at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni et autumnale et hibernum uitandum est. uer idoneum maxime est. ac prima æstas non aliena est. præter hæc abstinere pri die debet. neq; id satis est. sed alius quoq; ei ducenda est, quo facilius omnia quæ excesserunt, intra aluum consident.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.
Caput quintumdecimum.

Quam his qui hydropici sunt emitti oportere alijs dixi. nunc quemadmodum id fiat dicendum est. quidam autem sub umbilico ferè quattuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato facere consueverunt. quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso. quia quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit. ferramentum autem demittitur: magna cura habita ne qua uena inadat. id tale esse debet, ut ferè tertiam digiti partem latitudo nucronis impleat. demittendumq; ita est: ut membranam quoque transeat: qua caro ab interiore parte finitur: eò tum plumbea aut ænea fistula coniicienda est, uel recuruatis in exteriorem partem labris, uel in media circum surgente, quadã mora ne tota intus delabi possit. huius ea pars quæ intra paulo longior esse debet, quàm quæ extra, ut ultra ulteriorem membranam procedat, per hanc effundendus humor est. atq; ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso linteolo fistula est, et in uulnere, si id uestum non est: relinquenda. deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquæ uestigium appareat. quidam tamen etiam non ustra cute protinus fistulam recipiunt, et super uulnus spongram expressam deligunt. deinde postero die rursus fistulam demittunt: quod recens uulnus paulum ductum patitur, ut si quid humoris superest, emittatur: idq; bis ita fecisse contenti sunt.

n Onnunquam autem uenter ictu aliquo perforatur: sequi-
 turq; ut intestina euoluantur. quod ubi incidit, protinus con-
 siderandum est, an integra ea sint, deinde an his color suus
 maneat. si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse iam
 retuli. latius intestinum sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod
 dubia spes, certa desperatione si potior. interdum enim glutinatur. tū
 si utrumlibet intestinum liuidum, aut pallidum, aut nigrum est, qui-
 bus illud quoq; necessario accedit, ut sensu careat: medicina omnis ina-
 nis est. si uero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione suc-
 currendum est. Momento enim alienantur externo, & insueto spiritu
 circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. & si
 angustus uulnus est, quā ut intestina commodē refundantur, in-
 dendum est donec satis pateat. Ac si iam sciciora intestina sunt, perlu-
 enda aqua sunt: cui paulum admodum olei sit adiectum. tum mini-
 ster oras uulneris leuiter diducere manibus suis, uel etiam duobus
 hamis membranæ interiori iniectis debet. medicus priora semper in-
 testina quæ posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singulorū
 locum seruet: repositis omnibus, leuiter homo concutiendus est. quo fit
 ut per se singula intestina in suas sedes diducantur: & inibi considat.
 his conditis omentum quoq; considerandum est: ex quo si quid iam
 nigri, & emortui est, forficē excidi debet. si quid integrum est, leuiter
 super intestina diduci. futura autem neq; summæ cutis, neq; interioris
 membranæ per se satis proficit, sed utriusq;. & quidem duobus linis
 uincienda est spissior quā alibi, quia & rumpi facilius motu uen-
 tris potest, & non æque magnis inflammationibus pars ea exposita
 est. igitur in duas acis fila coniicienda, eaq; duabus manibus tenenda:
 & prius interiori membranæ futura iniicienda est sic, ut sinistra
 manus in dexteriore ora, dextra in sinisteriore à principio uulne-
 ris orsa, ab interiori parte in exteriorem aciem immittat. quo fit, ut
 ab intestinis ea pars semper aciem longe sit, quæ retusa est: semel
 utraq; parte traiecta permutandæ acis inter manus sunt, ut ea sit in
 dextra, quæ fuit in sinistra: ea ueniat in sinistram, quam dextra con-
 tinuit. iterumq; eodem modo per oras immittendæ sunt. Atq; ita ter-
 tio, et quarto: deinæpsq; permutatis inter manus acibus includenda
 plaga. post hæc eadem fila, eademq; acis ad cutem transferendæ.
 similiq; ratione ei quoq; parti utraq; futura iniicienda semper ab in-
 teriore parte acibus uenientibus semper inter manus traiectis. dein
 glutinantia iniicienda, quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex
 aceto

aceto impressam accedere debere manifestus est, quàm ut semper dicendum sit. impositis his leuiter deligari uenter debet.

De interiore parte abdominis rupta, & qua ratione curanda sit. Cap. XVII.

i Nterdum tamen uel ex ictu aliquo, uel retento diutius spiritu, uel sub graui fæce interior abdominis membrana superiore cute integra rumpitur. quod fæminis quoque ex utero sæpe euenire consuevit, sitque præcipue circa ilia. sequitur autem cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intentaculis indecore intumescat. atque id quoque aliter ab alijs curatur. quidam enim per acum duobus lineis ad imam basin immisissis, sic utrinque deuinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in uina positum est, ut quicquid super uinculum est, emoriatur. quidam medium tumorem excidunt ad similitudinem myrtæi folij. quod semper eodem modo seruandum esse iam posui, & tum oras sutura iungunt. commodissimum est autem resupinato corpore, experiri manu qua parte is tumor maxime cedat: quia necesse est ea parte rupta membrana sit, quaque integra est, ea magis obnitatur. tum qua rupta uidebitur, immittenda scalpello duæ lineæ sunt: ut exciso medio interior membrana utrinque recentem plagam habeat. quia quod uetus est: sutura non coit loco patefacto. si qua parte membrana non nouam plagam, sed ueterem habet: tenuis excidenda habena est, quæ tantum ora eius exulceret. cætera, quæ ad suturæ reliquam curationem pertinent, supra comprehensa sunt.

De uaricibus uentris.

p Ræter hæc euenit, ut in quorundam uentribus uarices sint, quarum, quia nulla alia curatio est: quàm quæ in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus hanc quoque eò differo.

De testiculorum natura, & morbis eorum. Cap. XVIII.

u Enio autem ad ea: quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent. quæ quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. igitur testiculi simile quidam medullis habent. nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent. dolent autem in ictibus & inflammationibus tunica, quibus hi continentur. dependent uero ab inguinibus per singulos nervos quos uelut *uasi pæ* græci nominant: cum quorum utroque binæ descendunt

Aurelij Cor.

q

et uenae, et arteriae. haec autem tunica continguntur tenui, nervosa, si-
 ne sanguine alba, quae ἐλασποειδής à grecis nominatur. super ea ua-
 lentior tunica est: quae interiori uehementer ima parte inhaeret, δὲ π-
 ρον greci uocant. Multae deinde membranulae uenas et arterias, eosque
 nervos comprehendunt: atque inter duas quoque tunicas superioribus par-
 tibus leues, paruaeque sunt. haecenus propria utriusque testiculo et ue-
 lamenta, et auxilia sunt. communis deinde utriusque, omnibusque interio-
 ribus sinus est, qui iam conspicitur à nobis, δὲ χέρον greci, scrotum no-
 stri uocant, usque ab ima parte medijs tunicis leuiter innexus est, à supe-
 riore tantum circumdatus est. sub hoc igitur plura uicia esse consue-
 runt: quae modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui,
 modo his integris fiunt. siquidem interdum uel ex morbo primum
 inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur. uel ex ictu aliquo
 protinus rumpitur tunica, quae diducere ab inferioribus partibus in-
 testina debuit. tum pondere eo deuoluitur, aut omentum, aut etiam in-
 testinum. atque ibi reperta uia, paulatim, aut ab inguinibus inferiores
 quoque partes nisum subinde nervosas tunicas, et ob id eius rei patien-
 tes diducit ἐντεροκοίαν, et ἐπιπλοκοίαν greci uocant, apud nos in-
 decorum, sed commune his herniae nomen est. deinde si descendit omē-
 tum, nunquam in scroto tumor tollitur. siue in media fuit, siue corpus huc il-
 luc uel conuersum, aut aliquo modo colloatum. itemque si retentus est spi-
 ritus, non magnopere increscit. tactu uero inaequalis est, et mollis, et
 lubricus. at si intestinum quoque descendit, humor his sine inflamma-
 tione modo minuitur, modo increscit. estque ferè sine dolore, et cum
 conquiescit aliquis aut iacet, interdum ex toto desinit, interdum sic di-
 uiditur, ut in scroto exiguae reliquiae maneant. at si clamore et facie-
 tate, et si sub aliquo pondere is homo nixus est, crescit: frigore omni
 contrahitur: calore diffunditur. estque tum scrotum, et rotundum, et
 tactu leue: idque quod subest: lubricum est, si pressum est, ad inguen re-
 uertitur, demissumque iterum cum quodam quasi murmure deuoluitur.
 et id quidem in lenioribus malis euenit. nonnunquam autem stercore
 accepto natus, tumet, retroque compelli non potest: affertque tum dolore,
 et scroto, et inguinibus, et ab abdomine: nonnunquam stomachus quoque
 affectus, primum ruffam bilem per os redit, deinde uiridem, qui-
 busdam etiam nigram. integris uero membranis interdum eam par-
 tem humor dstringit. atque eius quoque species duae sunt: nam uel inter
 tunicas is increscit, uel in membranis quae ibi circūuenas et arteri-
 as sunt, ubi haec grauitate occultauerunt. ac ne ei quidem humori, qui
 inter tunicas est, una sedes est. nam modo inter summam et mediam,
 modo inter mediam et imam consistit: greci communi nomine quic-

quid est ὁ ὀνομαζόμενος appellatur. nostri ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hæc quoque sub eodem nomine, quo priora habent signa autem quædam communia sunt, quædam propria communia quibus humor apprehenditur. propria: quibus loci humorem subesse dicimus. si tumor est nunquam ex toto se remittens: sed interdum leuior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximèq; in pueris, hisq; molles est, si non nimis humor subest. at si his uehementer increuit, renititur sic, ut uter repletus, et arte astrictus. uenæ quoque in scroto instantur, et si digito pressimus, audit humor, circumfluensq; id quod non premitur: attollit, et tanquam in vitro cornu ue per scrotum apparet: usq; quantum in ipso est, sine dolore est. sedes autem eius sic apprehenditur: si inter summam, mediamq; tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertens subit. scrotum ipsius et albidius est, si ducitur, aut nihil, aut paruum intenditur. testiculus ea parte neq; visu, neq; tactu sentitur. at si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore edelitescat. præter hæc æque integris tunicis ramæ immascentur, ὁ ὀνομαζόμενος græci appellant. uenæ intumescunt, hæ quoque intortæ, conglomeratæq; ad superiorem partem, uel ipsum scrotum implent, uel mediam tunicam, uel imam: interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculum, neruumq; eius increscunt. ex his ea quæ in ipso scroto sunt, oculis patent. hæ uero quæ nudæ, imæ ue tunica insident, ut magis conditæ, non æque quidem cernuntur, sed tamen etiam uisui subiectæ sunt, præterquam quod et tumoris aliud est pro uenarum magnitudine et modo, et id prementi magis renititur, ac per ipsos uenarum toros inæquale est, et qua parte id est, testiculus magis iusto dependet. cum uero etiam super ipsum testiculum, neruumq; eius id malum increuit, aliquanto longius testiculus ipse descendit, minorq; altero fit, ut pote alimento amisso. Raro sed aliquando citro quoque inter tunicas increscit, ὁ ὀνομαζόμενος græci uocant. interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque affert, et nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguinæ atq; ilia peruenit: partesq; hæ intumescunt. neruus, ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulq; indurescit super hæc, inguen quoque nonnunquam varices implent: βοῦβο ὀνομαζόμενος appellatur.

De testiculorum curationibus communibus, et primo de inasione, et curatione inguinis, uel scroti. Caput. XIX.

h Is cognitis de curatione dicendum est, in qua quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. prius de com-

LIBER

munibus dictam. loquar autem nunc de his, quæ scapellum desiderant: nam quæ uel sanari non possint, uel aliter nutriri debeant, dicendum erit simul cum ad species singulas uenero. inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. in utraq; curatione homo ante tri-
 duum bibere aquam pridie: abstinere etiam à cibo debet, ipso autem die collocari supinus, deinde si inguen incidendum est, idq; iam pube contegitur, ante radendum est, & tum extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit: id incidendum sub imo uentre, qua cum abdomine tunica inferiores committuntur. aperiendum autem audacter est donec summa tunica, quæ ipse scroti est, incidatur: perueniaturq; ad eam, qua media est plaga facta. foramen deorsum uersus subest. in id demittendus est sinistræ manus digitus index, ut diductis interuenientibus membranulis simul laxet. minister autem sinistra manu comprehenso scroto sursum uersus eum debet extendere: & quàm maxime ab inguinibus abducere, primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas quæ super mediam tunicam sunt: si digito diducere non potest, scapello abscidat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ iungatur, digitoq; inde promatur, & super uentrem cum duabus suis tunicis collocetur. inde si qua uiciosa sunt, circuncidenda sunt. in quibus cum multæ uenæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores uero ante longiore lino deligandæ sunt, ne periculose sanguinem fundant. si in media tunica uexata erit, aut sub ea malum increuerit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. infra tamen non tota demenda est. nam quod ad basim testiculi uehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo nō potest. itaq; ibi relinquendum est. idem in ima quoq; tunica, si læsa est, faciendum est. sed non à summa inguinis plaga, uerum infra paulum ea abscidenda, ne læsa abdominis membrana inflammationes moueat. neq; tamen nimium ex ea sursum relinquendum est, ne postea sinuetur, & sedem eidem malo præstet. purgatus ita testiculus per ipsam plagam cum uenis, & arterijs, & neruo suo leuiter demittendus est, uidendumq; ne sanguis in scrotum descendat, ne ue concretus aliquo loco maneat. quæ ita fient, si uenis uinciendo medicus prospexerit. lina quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debebunt. quæ pure orto sine ullo dolore excidēt. ipsi autem plagæ iniiciendæ duæ fibulæ sunt, & insuper medicamentum, quo glutinentur. solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix maior & latior fiat. quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leuiter tantum ponenda sunt. supraq; ea quæ inflammationem repellant, idest ex aceto, uel lana succida, uel spongia. cætera eadem

eadem: quæ ubi pus moueri debet, adhibenda sunt. at cum infra inci-
di oportet, resupinato homine subiicienda sub scroto sinistra manus est,
deinde id uehementer apprehendendum & incidendum. si parum=
lum est quod nocet, modice: ut tertia pars integra ad sustinendum te-
sticulus infra relinquatur. si maius est, etiam amplius, ut paulum
tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit: integrum mane-
at. sed primo rectus scalpellus quàm leuissima manu teneri debet, do-
nec scrotum ipsum diducat. tum inclinandus mucro est, ut transversa
membrana secet, quæ inter summam, mediamq; tunicam sunt. at si
iudicium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet. si sub il-
la quoq; conditur, etiam illa incidenda est sic, ut tertia quoq; si illa ui-
cium tegit. ubicunq; repertum malum est, ministrum ab inferiore par-
te exprimere moderate scrotum oportet, medicum digito, manubriolo,
uel scalpello diductam inferiorem partem tunica extra collocare: de-
inde eam ferramento quo ad similitudinem curuum uocant, incide-
re sic, ut in eandem intrare duo digiti index & medius possint. his
deinde coniectis excipienda reliqua pars tunicae, & inter digitos scal-
pellus immittendus est: eximendumq; aut effundendum quicquid est
noxium: quancunq; autem tunicam quis uolauit, illam quoq; debet
excidere, ac mediam quidem, ut supra dixi, quàm altissime ab ingui-
ne, imam autem paulo infra. cæterum anteq; excidantur, hæ quoque
uinci lino summe debent, & eius lini capita extra plagam relin-
quenda sunt, sicut in alijs quoq; uenis, quæ id requisierint. eo facto te-
sticulus intus reponendus est, oraq; scroti suturis inter se committen-
dæ, neq; paucis, ne parum glutinentur, & longior fiat curatio, neque
multis, ne inflammationem augeant. atq; hic quoq; uidendum est, ne
quid in scroto sanguinis maneat. tum imponenda glutinantia sunt.
si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidue concretum ex
eo decidit, incidi subter id debet, purgatq; eo spongia acris aceto ma-
dens circumdari. deligatur autem uulnus omne, quod ex his causis fa-
ctum est. si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resoluen-
dum, sed his die tantum aceto irroranda lana uel spongia. si dolor
est: tertia die resoluendum, et ubi fibulae sunt, hæ incidendæ, ubi lina-
mentum id mutandum est, rosq; & uino madefaciendum id, quod
imponitur. si inflammatio increscat, adiucendum prioribus catapla-
sma ex lenticula & melle, uel ex malicorio, quod in austero uino co-
ctum sit, uel ex his mixtis. si sub his inflammatio non cõquirit post
diem quintum multa calida aqua uulnus fouendum, donec scrotum
ipsum & extenuetur & rugosius fiat. tum imponendum catapla-
sma ex triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. quæ ipsa si robu-

Aurelij Cor.

q iij

stus curatur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt. neq; dubium est quodcunq; initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quæ pus movent, imponenda sint. quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur. linamentumq; eatenus imponendum est, ut foramen tegat. inflammatione finita propter nervos priore cataplasmate, dein cerato utendum est. Hæc proprie ad eiusmodi vulnera pertinent. cætera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quæ in alio quoq; vulnerum genere præcepimus.

De intestini curatione.

Cap. XX.

h Is propositis ad singulas species veniendum est: ac si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experientia iunctura est. fascia eius rei causa fit: cui imo loco pile affuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subijciatur: deinde reliqua fasciæ pars arcu circumdatur. sub quo sæpe & intus compellitur intestinum: & inter se tunice glutinatur. rursus si ætas processit, multumq; intestini descendisse ex tumore magno patet, adiungunturq; dolor, & vomitus quæ ex stercore, & ex cruditate eo delapso ferè accidunt, scalpellum adhiberi sine perniciæ non posse manifestum est. levandum tantummodo malum, & per alias curationes extrahendum est. sanguis mitti ex brachio debet: deinde si vires patiuntur, imperanda tridui abstinencia est: si minus certe pro vi corporis quamlongissime. eodem vero tempore super habendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc & farina hordeacea cum resina iniicienda, & his demittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoq; adiectum sit: dandumq; aliquid cibi lenis calidi. quidam etiam aluum ducunt. id ducere aliquid in scrotum potest: educere ex eo non potest. per ea vero quæ supra scripta sunt, levato malo si quando aliàs dolor reverterit, eadem erunt faciendæ. sine dolore quoq; si multa intestina prolapsa sunt, secari superuacuum est: non quo excludi à scroto non possint, nisi tamen id inflammatio prohibuit: sed quo repulsa inguinibus immorentur: ibiq; tumorem excitent: atq; ita fiat mali non finis, sed mutatio. at in eo, quem scalpello curari oportebit, simul atq; ad mediam tunicam vulnus in inguine factum pervenerit, duobus hamulis ea iuncta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberat. neq; enim cum periculo læditur, quæ excidenda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. ubi deducta autem erit ab inguine, usq; ad testiculum incidi debet sic, ne his ipse læda-

tur: tum excidi. ferè tamen hanc curationem puerilis ætas & modicum malum recipit. sic uir robustus est, maiusq; id uicium est, extra hi testiculum non debet: sed in sua sede permanere. id hoc modo fit. inguen eadem ratione usq; ad mediã tunicam scalpello aperitur: eaq; tunica eodem modo duobus hamis excipitur sic, ut à ministro testiculus eatenus contineatur, ne per uulnus exeat: tum ea tunica deorsum uersus scalpello inciditur: sub eaq; index digitus sinistræ manus ad imum testiculum demittitur, eumq; ad plagam compellit: deinde dextre manus duo digiti pollex, atq; index uenam, & arteriam, & neruum, tunicamq; eorum à superiore tunica diducunt. quod si aliqua membranula prohibent, scalpello resoluntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. excisis quæ excidenda sunt, repositoq; testiculo ab ora quoq; eius uulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulo latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

De omenti curatione. Cap. XXI.

T si omentum descendit, eodẽ quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen, diducendæq; tunica sunt. considerandum autem est, maior ne is modus, an exiguus sit. nam quod paruulum est, super inguen in aluum uel digito, uel auerso specillo repellendum est. si plus est, sinere oportet dependere quantum ex utero prolapsum est: idq; adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur, & exadat. quidam hic quoq; duo lina acutius trahunt, binisq; singulorum capitibus diuersas partes astringunt. sub quo æque, sed tardius emoriatur. adiungitur tamen hic quoq; celeritati, si omentum super uinculum illinitur medicamentis, quæ sic exedunt ne erodant, omnia græci uocant. Fuerunt etiam qui omentum forfice præciderent: quod in paruulo nõ est necessarium. si maius est, potest profusionem sanguinis facere: si quidem omentum quoq; uenis quibusdam etiam maioribus illigatum est. neq; uero si disscisso uentre id prolapsum forfice præciditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius uel li non possit: inde huc exemplum transferendum est. uulnus autem curari. si relictum omentum est, futura debet. si id amplius fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est. si uero humor intus est, incidendum est: in pueris quidem inguen, nisi in his quoq; liquoris eius maior modus prohibet: in uiris uero, & ubicunq; multus humor subest scrotum. deinde si inguen inasum est, eo protrahitis tunicis humor effundi debet. si scrotum, & sub hoc protinus uicium est, nihil aliud quam humor est effundendus: abscedendæq; mē-

branae sunt, si quae cum continuerunt, deinde eluendum id ex aqua, quae uel sale adiectum, uel nitrum habeat. si sub media, immae tunicat: totae hae extra scrotum collocandae, excidendaeque sunt.

De ramicis curatione.

Cap. XXII.

Amex autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis: quae ipsis uenis insigantur: cum eo, ne amplius quam has urant, maximeque ubi inter se implicatae glomerantur, eo ferrum id admoendum est: tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est: utendumque eo uinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui. tertio die lenticula cum melle imponenda est. post eiectionis crustis ulcera melle purganda: rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. quibus uero super mediam tunicam uenae tumunt incidendum inguen est, atque tunicae promouenda, ab eaque uenae digito uel manabriolo scalpelli separanda. qua parte uero inharebunt: & ab superiore, et ab inferiore parte lino uincienda: tum sub ipsis uinculis praecidenda, reponendusque testiculus est. at ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, media excidi necesse est: deinde si duae, tres uel uenae tumunt, & ita pars aliqua obsidetur, ut maiore uicio uacet, idem faciendum, quod supra scriptum est, ut ab inguine & a testiculo deligatae uenae praecidantur: usque condatur. sin totum id ramex obsederit: per plagam demittendus digitus index erit: subiiciendusque uenis sic, ut paulatim protrahat aequi adducendo, donec is testiculus par alteri fiat. tum fibulae oris sic uincienda, ut simul eas quoque uenas comprehendant. id hoc modo fit. acus ab exteriori parte oram uulneris perforat. tum non per ipsam uenam, sed per membranam eius immittitur: per eamque in alteram oram compellitur. uenae uulnerari non debent, ne sanguinem fundant. membrana semper inter has uenas est. ac neque periculum affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. itaque etiam satis est duas fibulas esse. tum uenae quaecumque protractae sunt in ipsum inguen aduerso specillo comprehendi debent. soluendi fibulas tempus inflammatione finita, & purgato uulnere est, & una simul, & oras, & uenas cicatrix deuinciat. ubi uero inter imam tunicam et ipsum testiculum, neruumque eius ramex ortus est, una curatio est, quae totum testiculum abscidit. nam neque ad generationem quicquam is confert et omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. sed totum quoque inguen incidendum media tunica promouenda: atque excidenda est: idem in ima faciendum, neruusque ex quo testiculus dependet praecidendus. post id uenae

et arteriæ ad inguen liño deligandæ et infra uinculum abscondendæ sunt.

De carne, quæ inter tunicas testiculorum concreuit,
et de neruo indurato. Cap. XXIII.

Aro quoq; si quando inter tunicas concreuit: nihil dubij est,
quin eximenda sit: sed id ipso seroto inciso fieri commodius
est. at si neruus induruit, curari res neq; manu, neq; medi-
camento potest. Vrgent enim febres ardentes, et aut uirides, aut nigri
uomitibus, præter hæc ingens sitis et linguae aspritudo, ferèq; a die ter-
tio spumans bilis aluo cum rosione redditur. atq; neq; assumi facile co-
bus, neq; contineri potest, neq; multo post extremæ partes frigescent:
tremor oritur: manus sine ratione extenduntur. deinde in fronte fri-
gidus sudor, eumq; mors sequitur.

De ramice inguinis. Cap. XXIII.

Bi uero in ipso inguine ramex est, si tumor modicus est, se-
mel incidi, si maior, duabus lineis debet, ut medium exci-
datur: deinde non extracto testiculo: sicut intestinis quoque
prolapsis interdum fieri docui: colligendæ uenæ uinciendæq; ubi tuni-
cis inherebunt, et sub his modis præcidendæ sunt. neq; quicquam
noni curatio ulneris eius requirit.

Ad tegendam glandem colis si nuda est. Cap. XXV.

B his ad ea transeundum est, quæ in cole ipso fiunt: in quo
si glans nuda est, nullq; aliquis eam decoris causa tegere,
fieri potest, sed expeditius in puero quàm in uiro: in eo, cui
id naturale est, quàm in eo, cui quarundam gentium more circunci-
sus est, in eo cui glans parua iuxtaq; eam cutis, spatiosior uero ipse
coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, qui-
bus id naturale est, eiusmodi est. cutis circa glandem apprehenditur,
et extenditur, donec illam ipsam condat, ibiq; deligatur. deinde iuxta
pubem in orbem tergus inciditur: donec coles nudetur, magnaq; cura
saueatur ne uel urina iter, uel uenæ, quæ ibi sunt, incidantur. eo facto
cutis ad uinculum inclinatur, nudaturq; circa pubem uelut circulus:
eoq; linamenta dantur, ut caro increseat et id impleat, satisq; uela-
menti supra latitudo plagæ præstat. sed donec cicatrix sit, uinctum
esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. at in eo

LIBER

qui circumcissus est sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab inferiore cole est. non ita dolet, quia summo soluto deduci deorsum usque ad pubem manu potest. neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem. tum multa frigida aqua fouetur: emplastrumque circa datur, quod valentem inflammationem reprimat. proximisque diebus ut propè à fame victus est, ne forte eam partem sacietas excitet. ubi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube usque circum. super glandem autem aduerso emplastro imposito induci. sic enim fit, ut inferior pars glutinetur: superior ita sanescat, ne inhaereat.

Quomodo glans penis contacta aperiri possit.

Contra si glans ita contacta est, ut nudari non possit: quod uicium graeci *φίμωσις* appellant, aperienda est. quod hoc modo fit. Subter à summa ora cutis inciditur recta linea usque ad frenum: atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est sic, ut uertex eius ad frenum basis in tergo extremo sit. tum super danda linamenta sunt: aliaque medicamenta, quae ad sanitatem producant. necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiescere. nam ambulatio atterendo, ulcus sordidum reddit.

Infibulandi ratio.

Infibulare quoque adolescentulos, interdum uocis, interdum uoletudinis causa quidam consueverunt: eiusque haec ratio est. cutis quae super glandem est, extenditur: notaturque utrinque lateribus atramento qua perforatur: deinde remittitur. si super glandem notae reuertuntur, nimis apprehensum est, et ultra notari debet. si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulae est: tum qua notae sunt. cutis acu filum ducente transuitur: eiusque fili capita inter se deligantur: quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatriculae fiant. ubi haec confirmatae sunt, exempto filo fibula additur: quae quomelior, eo leuior est: sed hoc quidem saepius inter supernuacua, quam inter necessaria est.

De urinae reddendae difficultate, et de calculo, curationibusque eorum. Cap. XXVI.

Es uero interdum cogit emoliri manu urinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est: aut quia calculus, uel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. ac me-

diocris quoq; inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. idq; non in uiris tantummodo, sed in foeminis quoq; interdum necessarium est. ergo aene fistulae fiunt, quæ ut omni corpori ampliori, minoriq; sufficiant. ad mares tres, ad foeminas duæ medico habendæ sunt. ex uirilibus maxima decem et quinque est digitorum, media duodecim, minima nouem. ex mulieribus, maior nouem, minor sex. incuruas uero esse eas paulum, sed magis uiriles oportet, leuesq; admodum ac neq; nimis plenas, neq; nimis tenues. homo tum resupinus eo modo quo in curatione ani figuratur, super subsellum, aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra uero fistulam demittere in iter urinae debet. atq; ubi ad ceruicem uescicae uentum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam uescicam compellere, eamq; urina reddita recipere. Foemina breuius urinae similiter, et rectius iter habet. quod mamulae simile inter imas oras super naturale positum non minus sæpe auxilio eget. aliquanto minus difficultatis exigit. nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhaerescit. cum si fieri potest, oportet uellere, uel oriculario specillo, uel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. si id fieri non potuit, cutis extrema quam plurimum attrahenda, et condita glande lino uincienda est: deinde à latere recta plagæ coles incidendus, et calculus eximendus est. tum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat: et urina naturaliter profluat.

Quæ curatio calculosis adhibeatur.

Ubi uescicae uero, calculiq; facta mentio sit, locus ipse exigere uidetur ut subiiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. ad quam festinare cum præceps sit, nullo modo conuenit. ac neq; omni tempore, neq; in omni ætate, neq; in omni uicio id experiendum est: sed solo uere, in eo corpore quod iam nouē annos, nondum quatuordecim excessit: et si tantum mali subest, ut neq; medicamentis uinci possit, neq; etiam trahi posse uideatur, quo minus interposito aliquo spacio interimat. non quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat: sed quo sæpius utiq; in hoc fallat, in quo plura et genera, et tempora periculi sunt, quæ simul cum ipsa curatione proponantur. Igitur ubi ultima experiri statutum est, ante aliquot diebus uictu corpus præparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. ambulandi uero

LIBER

inter hac exercitatione utatur, quo magis calculus ad uesicæ cervicē descendat. quod an inaderit, digitis quoq; sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. ubi eius rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur. homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumq; cum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis cōprehendit, reductisq; eius cruribus ipsum quoq; iubet manibus ad suas poplites datis, eos quam maxime possit attrahere, simulq; ipse sic eos continet. quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo ualentes insidunt: quo & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atq; alter prout consedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulq; ipse poplites suos attrahit. siue autem unus, siue duo continent: super humeros eius suis pectoribus incumbunt. ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extensus, & in angustum compulsa uesica facilius calculus capi possit. Præter hæc etiam num à lateribus duo ualentes obijciuntur, qui circumstantes leuare uel unum, uel duos qui puerum continent non sinunt. Medicus deinde diligenter unguibus circumcisis atq; sinistra manu duos eius digitos indicem & medium: leniter prius unum, deinde alterum in anum eius demittit, dextræq; digitos super inum abdomen leniter imponit: ne si utriq; digiti circa calculum uehementer cōcurrerint, uesicam lædant. neq; uero fistinanter in hac re, ut in plerisque agendum est. sed ita ut quam maxime id tuto fiat. nam læsa uesica neruorum distentiones cum periculo mortis excitat. ac primum circa ceruicem queritur calculus. ibi repertus minore negotio expellitur. & ideo dixi ne curandum quidem: nisi cum in hoc inditijs suis cognitum est. si uero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam uesicam dantur, paulatimq; dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur. atque ubi repertus est calculus, qui necesse est in manus incidat, eò curiosius deducitur. quo minor, leniorq; est, ne effugiat, id est ne sæpius agitata uesica sit. ergo ultra calculum dextra semper manus eius opponitur, sinistrae digiti deorsum eum compellit donec ad ceruicem peruenitur. in quâ si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat. si planus sic, ut transversus sit. si quadratus, ut duobus angulis sedeat. si altera parte plenior sic, ut prius ea, qua tenuior sit, euadat. in rotundo nihil interesse ex ipsa figura patet, nisi si lenior altera parte est, ut ea antecadat. cum iâ eò uenit, ut incidi super uesicæ ceruicem iuxta anū cutis, plaga lunata usq; ad ceruicē uesicæ debeat cornibus ad coxas spectantibus

paulum: deinde ea parte, qua strictior ima plaga est etiam num sub
 cute altera transversa plaga facienda est, qua cervice aperiatur: donec
 urinae iter pateat sic, ut plaga paulo maior quam calculus sit. nam
 qui menis fistula, quam illo loco *χοριαδα* graeci uocant, parum patefa-
 ciunt: cum maiore eodem periculo reuoluntur: quia calculus iter, cum
 ui promittitur, facit: nisi accipit: idque etiam pernitiosius est, si figura quoque
 calculi, uel asperitudo aliquid eo contulit. ex quo et sanguinis profu-
 sio, et distentio neruorum fieri potest. quae si quis euasit, multo tamen
 patientiorem fistulam habiturus est rupta cervice, quam habuisset in-
 cisa. cum uero patefacta est, in conspectum calculus uenit, in cuius cor-
 pore nullum discrimen est. ipse si exiguus est, digitis ab altera parte
 propelli, ab altera protrahi potest. si maior: iniiciendus à superiore
 ei parte uncus est eius rei causa factus. is est ad extremum tenuis, in
 semicirculi specie reuolue latitudinis, ab exteriori parte laevis, qua cor-
 pori inungitur, ab interiori asper, qua calculum attingit. isque longior
 potius esse debet. nam breuis extrahendi uim habet. ubi iniectus est,
 in utrumque latus inclinandus est, ut appareat calculus, et teneatur,
 quia si apprehensus est, ille simul inclinatur: ideoque eo minimo opus
 est. ne cum adduci uncus coeperit, calculus intus effugiat, hic in oram
 uulneris incidat, eamque conuulneret. in qua re quod periculum esset,
 iam supra proposui. ubi satis teneri calculum patet, eodem penè mo-
 mento triplex motus adhibendus est in utrumque latus, deinde extra,
 sic tamen ut leniter id fiat, paulumque primo calculus attrahatur. quo
 facto attollendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, facili-
 usque illum producat. quod si aliquando à superiore parte calculus pa-
 rum commodè comprehendetur, à latere erit apprehendendus. haec
 est simplicissima curatio. sed uarietas rerum quasdam etiam num
 animaduersiones desiderat. sunt enim quidam non asperi tantum-
 modo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cervice
 sine ullo periculo eximuntur. in uescia uero non tuto uel hi conquirun-
 tur, uel attrahuntur. quoniam ubi illam conuulnerant, ex disten-
 tione neruorum mortem maturant, multoque magis si spina aliqua ue-
 sicæ inhaeret: eamque, cum duceretur, duplicauit. colligitur autem eo quod
 difficilius urina redditur, in cervice calculum esse: eo quod cruenta de-
 stillat, illum esse spinosum: maximeque id sub digitis quoque experiri-
 dum est, neque adhibenda manus, nisi id constiterit. ac tum quoque leniter
 intus digiti obijciendi, ne uolenter promouendo conuulnerent. tum
 in adedum. multi hic quoque scalpello usi sunt. Meget, quoniam is infir-
 mior est: potestque in aliqua prominentia incidere, in quoque super illam
 corpore: qua cunum subest non secare, sed relinquere, quod iterum

LIBER

incidi necesse sit, ferramentum fecit rectum in summa parte labrosum, in ima semicirculatum, acutumq; id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat: ut simul cum carne, siquid ex calculo prominebat: incideret. quo consequebatur, ut semel quantum satis esset, aperiret. quocunq; autem modo cervix ea parte facta est, leniter extrahi quod asperum est, debet: nulla propter festinationem vi admotā.

signa calculorum, uel harenosorum, uel mollium.

T calculus harenosus, & ante manifestus est: quoniam & urina quæ redditur, harenosa est, & in ipsa curatione, quoniam inter subiectos digitos neq; æque leniter renititur, & insuper dilatatur. item mollis calculus, & ex pluribus minutisq; sed inter se parum astrictis compositus indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamules. hos omnis leniter permutatis subinde digitorum uicibus sic oportet abducere, ne uesicam lædant, ne ue intus aliqua dissipatæ reliquie maneant. quæ postmodum curationi difficultatem faciant. quicquid autem ex his in conspectum uenit uel digitis, uel uincto eximendum est. at si plures calculi sunt, singuli protrahi debet, sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur. si quidem in uesica difficulter inuenitur. inuentusq; celeriter effugit: ita longa inquisitione uesica læditur: excitatq; inflammationes mortiferas, adeo ut quidam secti cum diu frustra q; per digitos uesica esset agitata, decesserint. quibus accedit etiam quod exiguus calculus ad plagam urina postea promouente excidit. si quando autem is maior non uidetur nisi rupta ceruice extrahi posse, findendus est. cuius reperiuntur Ammonius ob id *αἰδοπῶς* cognominatus est: id hoc modo fit. unguis iniicitur calculo sic, ut facile eum concussum quoq; teneat, ne is retro reuoluatur. tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ prima parte tenui, sed retusa, quod admodum calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam uesicam per ferramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

De calculis foeminarum.

Hæc uero curationes in foeminis quoq; similes sunt, de quibus tamen parum proprie quædam dicenda sunt. siquidem in his ubi paruulus calculus est, scalpellus superuacuuus est, quia is urinam in ceruicem non compellit: quæ & breuior q̃ in ma

ribus, & laxior est. ergo et per se sæpe excidit, & si in primo quod est angustus inhaeret, eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. at in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. sed uirgini subijci digiti tanquam masculo mulieri per naturalia eius debent. tum uirgini quidem sub ima sinisteriore ora. Mulieri uero inter urinae iter, & os pubis incidendum est sic, ut utroq; loco plaga transuersa sit, neq; terreri conuenit si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

Quæ curatio calculo euulso habenda sit.

Calculo euulso, si ualens corpus est, neq; magnopere uexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur: atq; ingredi quoq; eum paulum nō alienū est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. quod si per se nō destitit, rursus ne uis omnis intereat, suppressi debet. idq; protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. si quidem uis distentione neruorum periclitatur aliquis dum uestica eius agitur, sic alter motus excipitur remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis proficiat, ut occidat. quod ne incidat, desiderare his debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. sub quo & sanguis ferè conquiescit, et astringitur uestica, ideoq; minus inflammatur. quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & inguinibus, & coxis, & super pubem. ubi iam satis uel euocatus est sanguis, uel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxæ paulum excitentur: ac super ulcus imponendum est duplex, aut triplex linteolum aceto madens. deinde interpositis duabus horis in solum is aquæ calidæ resupinus demittendus est sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cætera uestimentis circumdata sint, manibus tantummodo, pedibusq; nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. ex quo sudor multus oriri solet, quo spongia subinde facile detergendum est: finisq; eius fō nenti est donec infirmando offendat: tum multo is oleo perungendus, inducendusq; hapsus lane mollis tepido oleo repletus: qui pubem & coxas & inguina & plagam ipsam contactam eodem ante se linteolo protegat, hisq; subinde oleo tepido madefaciendus est, ut neque frigus ad uesticam admittat, & neruos leniter molliat. quidam cataplasmatibus calefactis utuntur: ea plus pondere nocent, quæ uesticam urgendo uulnus irritant, q̄ calore proficiunt. ergo ne uinculum quidem ullum necessarium est: proximo die si spiritus diffusius redditur, si urina non excedit, si locus circa pubem mature intumuit. scire licet in uestica sanguinem concretum

LIBER

remansisse. igitur demissis eodem modo digitis leuiter pertractanda
 uestica est, et discutienda, si qua coierunt. quo fit ut per vulnus postea
 procedant. non alienum etiam est oriculario clystere acetum nitro
 mixtum per plagam in uesticam compellere. nam sic quoque discutiun-
 tur, si qua cruenta coierunt. eaque facere etiam primo die conuenit. si
 timemus ne quid intus sit: maximeque ubi ambulando id elicere imbe-
 cillitas prohibuit, cetera eadem facienda sunt, ut demittatur in solium:
 ut eodem modo panniculus eadem lana super iniiciatur: sed neque saepe,
 neque tandiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est, im-
 firmus, quam ualens: leui quam grauiore inflammatione affectus, is
 cuius corpus digeritur, quam his cuius astrictum est. inter haec uero
 si somnus est, et aequalis spiritus, et madens lingua, et sitis modica,
 et uenter imus, sed et mediocris est cum febre modica dolor, scire
 licet recte procedere curationem. atque in his inflammatio ferè quinto
 uel septimo die finitur. qua leuata solium superuacuum est. supini
 tantummodo vulnus aqua calida fouendum est, ut si quid urinae ro-
 det, abluatur. imponenda autem medicamenta sunt pus mouentia, et
 si purgandum ulcus uidebitur, melle linendum. id si rodet, rosa tempe-
 rabitur. huic curationi aptissimum uidetur euea^o p^o uau^o empla-
 strum. nam et seum habet ad pus mouendum, et mel ad ulcus re-
 purgandum: medulla etiam maximeque uitulina: quod in id ne fistula
 relinquatur, praecipue proficiat. linamenta uero tum super ulcus non
 sunt necessaria, super medicamentum ad id continendum recte impo-
 nuntur. at ubi ulcus purgatum est: puro linamento ad cicatricem per-
 ducendum est. quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, uari-
 a circa pericula oriuntur. quae praesagire protinus licet: si continua
 uigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis uehemens,
 si uenter imus tumet, si vulnus hiat, si transfluens urina id non ro-
 dit, si similiter ante tertium diem quaedam liuida excidunt, si is aut
 nihil, aut tarde respondet, si uehementes dolores sunt, si post die quin-
 tum magnae febres urgent, et fastidium cibi permanet, si cubare in
 uentrem iocundius est. nihil tamen peius est distentione nervorum, et
 ante nonum diem uomitus bilis. sed cum inflammationis sit metus,
 succurri, abstinentia modica et tempestiuis cibis, inter haec fomentis,
 de quibus supra scripsimus. oportet.

De cancro qui ex uestica nascitur, et qua curatione uti debeat.

Caput XXVII.

Proximus canceri metus est. is cognoscitur, si et per vulnus, et
 per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cumque eo quaedam a
 concreto

concreto sanguine non abhorrentia, tenuesq; carunculae lanulis simili-
les: præter hæc si oræ vulneris arida sunt: si dolent inguina: si febris
non defuit, eaq; in noctem augetur: si inordinati horrores accedunt.
Cōsiderandum autem est, in quam partem cancer is tendat, si ad co-
lem indurescat his locus et rubet, et tactu dolorem excitat, testicu-
liq; intumescunt. si in ipsam uesticam ani dolor sequitur, coxæ dure-
scent, non facile crura extendi possunt. at si in alterutrum latus oculis
id expositum est, paresq; utrinq; easdē notas sed minores habet. pri-
mum autem ad rem pertinet corpus recte iacere, ut superior pars
semper eadem sit in quam uicium fertur. ita si ad colem it, supinus
his collocari debet. si ad uesticam, in uentrem, si in latus, in id quod
integrius est. Deinde ubi uetum fuerit ad curationem, homo in aquā
demittetur: in qua marrubium decoctum sit, aut cypressus, aut myr-
tus, idemq; humor clystere intus adijcietur. tum super ponetur lenti-
cula cum malicorio mixta, quæ utraq; ex uino decocta sint, uel ru-
bus, aut oleæ folia eodem modo decocta, aliāq; medicamenta, quæ ad
cohibendos, purgandosq; caneros proposuimus. ex quibus si qua erūt
arida, per scriptorium calamum inspirabuntur. ubi stare cœperit cā-
cer, nullo vulnus elucetur. uitabiturq; eo tempore ceratum quod ad
recipiendum id malum corpus emollit, potius plumbum elotum cum
uino inungetur. super quæ idem linteolo illitum imponetur: sub qui-
bus perueniri ad sanitatem potest. cum eo tamen quod non ignoremus
orto cancro sepe affici sto machum, cui cum uesticā quoddam consor-
tium est: exq; eo fieri ut neq; retineatur cibus, neq; si quis retentus est,
concoquatur: neq; corpus alatur: ideoq; ne vulnus quidem aut pur-
gari, aut ali possit: quæ necessario mortem maturant. sed ut his suc-
curri nullo modo potest, sic à primo tamen diu tenenda ratio curatio-
nis est. in qua quædam observatio ad cibum quoq; potionemq; perti-
nens necessaria est: nam cibus inter principia non nisi humidus dari
debet. ubi ulcus purgatum est, ex media materia olera, et salsamen-
ta semper aliena sunt. potione opus est non modica: nam si parum
bibitur, accenditur vulnus, et uigilia urget, et uis corporis minui-
tur. si plus æquo assumitur, subinde uesticā impletur, eoq; irritatur.
non nisi aquam autem bibendam esse manifestus est, quā ut subin-
de dicendum sit. solet uero sub eiusmodi victu uenire ut alius non
reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua uel fœnum græcum, uel mal-
ua decocta sit. idem humor rosa mixtus in ipsum vulnus oriculario
clystere agendus est: ubi id rodit urina neq; purgari patitur. Fere ue-
ro primo per vulnus exit hæc, deinde eo sanescente diuiditur, et pars
per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur: quod in-

Aurelij Cor.

r

LIBER

terdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoque anno fit: neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut uehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ, magnæque caruncule, simulque nervosa aliqua exciderunt. sed ut uel nulla ibi fistula, uel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo cum iam ad cicatricem uulnus intendit, extētis iacere foemina, et cruribus oportet: nisi tamen molles, harenosi uel calculi fuerint. sub his enim tardius uescia purgatur. Ideoque diutius plagam patere necessarium est: et tum demum ubi iam nihil tale extra fertur, ad cicatricem perducere quod si antequam uescia purgata est: oræ se glutinarunt: dolorque, et inflammatio redierunt, uulnus digitis uel aduerso specillo diducendum est, ut torquentibus exitus detur: hisque effusum diutius pura urina descendat. tum demum quæ cicatricem inducant, imponenda sunt: extendique ut supra docui pedes quam maxime iuncti. quod si fistulæ metus ex his causis, quas proposui, subesse uidebitur, quo facilius claudatur ea, uel certe coaguletur, in anum quoque danda plumbea fistula est: extentisque cruribus foemina, talique inter se deligandi sunt, donec qualis futura est, cicatrix sit.

Si naturalia foeminarum concubitus non admittunt, quo modo curari conueniat. Cap. XXVIII.

T hoc quidem commune esse maribus, et foeminis potest: e proprie uero quedam ad foeminas pertinent, ut in primis: quod earum naturalia nonnunquam inter se glutinatis oris concubitus non admittunt. idque interdum euenit protinus in utero matris: interdum exulceratione in his partibus facta, et per malam curationem his oris sanescendo iunctis. si ex utero est, membrana ori uulnæ opposita est. si ex ulcere, caro id repleuit. oportet autem membranam duabus lineis inter se transversis incidere ad similitudinem litteræ X. magna cura habita ne urina iter uioletur. deinde undique eam membranam excidere: ac si caro increuit, necessarium est recta linea patefacere. tum ab ora, uel uulsella, uel hamo apprehensam tanquam habenulam excidere: et intus implicatum in longitudinem limentum, ῥήγιονον græci uocant, in aceto tinctum demittere: superaque succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die soluere ulcus, et sicut alia ulcera curare. cumque iam ad sanitatem tendet, plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamque intus dare. supraque idem medicamentum inijcere, donec ad cicatricem plagi perueniat.

Qua curatione partus emortuus ex utero excutitur. Cap. XXIX.

Si concipit autem aliqua si iam propè maturus partus in-
 tus emortuus est, neq; excludere per se potest, adhibenda cu-
 ratio est, quæ numerari inter difficillimas potest. nam et
 summam prudentiam, moderationemq; desiderat: et maximum pe-
 riculum affert. sed ante omnia uulvæ natura mirabilis, cum in mul-
 tis alijs, tum in hac re quoq; facile cognoscitur. oportet autem ante o-
 mnia resupinam mulierem transverso lecto sic collocare, ut feminibus
 eius ipsius ilia comprimantur. quo fit ut et inus uenter in conspe-
 ctu medici sit: et infans ad os uulvæ compellatur: quæ emortuo par-
 tu id comprimit: ex intervallo uero paulum dehiscere. hac occasione
 usus medicus unctæ manus indicem digitum primum debet infere-
 re, atq; ibi continere, donec iterum ad os aperiatur: rursusq; alterum
 digitum demittere debebit, et per easdē occasionēs alios, donec tota
 esse intus manus possit. ad cuius rei facultatem multum confert et
 magnitudo uulvæ, et uis nervorum eius, et corporis totius habitus,
 et mentis etiam robur: cum presertim intus nonnunq; etiā duæ ma-
 nus dari debeant. pertinet etiā ad rem quā validissimum esse inu-
 entrem, et extrema corporis, neq; dum inflammationem cepisse,
 sed recenti re protinus adhiberi medicinam. nam si corpus iam in-
 tumuit, neq; demitti manus, neq; educi infans nisi agerrime potest, se-
 quiturq; sæpe cum uomitu et cum tremore mortifera nervorum di-
 stentio. uerum intus emortuo corpori manus iniecta protinus habitū
 eius sentit. nam aut in caput, aut in pedes conuersum est, aut in trās-
 uersum iacet: ferè tamen sic, ut uel manus eius, uel pes in propinquo
 sit. Medici uero propositum est, ut eum manu dirigat uel in manus,
 uel etiam in pedes. si forte aliter compositus est, ac si nihil aliud est,
 manus uel pes apprehensus, corpus rectius reddit: nam manus in ca-
 put, pes in pedes eum conuertet. tum si caput proximum est, demitti
 debet unctus undiq; levis acuminis brevis, qui uel oculo, uel auri, uel
 ori, interdum etiam fronti recte iniicitur, deinde attractus infantem
 educit: neq; tamen quolibet his tempore extrahi debet. nam si com-
 presso uulvæ ore id tentatum est, nō emittente eo infans abrupitur:
 et uncti acumen in ipsum os uulvæ delabitur: sequiturq; nervorum
 distentio, et ingens periculum mortis. igitur compressa uulva, conge-
 scere. hiantē, leniter trahere oportet: et per has occasionēs paulatim
 eum educere. trahere autē dextra manus unctum, sinistra intus pos-
 ta infantem ipsum: simulq; dirigere eum debet. solet etiam euenire,
 ut is infans humore distendatur: exq; eo profluat fœdi odoris sanies.

quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut effuso humore extenuetur. tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. nam uncus iniectus facile hebeti corpusculo eleuabitur. in quo quid periculi sit, supra positum. sed in pedes quoque conuersus infans non difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commode educitur. si uero transuersus est, neque dirigi potuit, uncus alie inijciendus, paulatimque attrahendus est. sub quo fere ceruix replicatur, retroque caput, ac reliquum corpus spectat. remedio est ceruix praecisa, ut separatim utraque pars auferatur, id unco fit, qui priori similis in interiorem tantum partem per totam aciem exacuiatur: tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia fere maiore parte extracta, caput in uacuum uuluum prolabitur, extrahi que sine summo periculo non potest: si tamen id incidit, super uentrem mulieris duplici panniculo iniecto, ualens homo non imperitus a sinistro latere eius debet assistere, et super inum uentrem eius duas manus imponere, alteraque alteram premere. quo fit ut illud caput ad os uuluae compellatur. idque eadem ratione quae supra posita est, unco extrahitur. at si pes alter iuxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid protractum est, paulatim abscidendum est: et si clunes os uuluae urgere coeperunt, iterum retro repellendae sunt. conquisitusque pes eius adducendus. aliaeque etiam num difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, concisus eximi debeat. quotiens autem infans protractus est, tradendus ministro est. is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas secundas uocat. quod uelamentum infantis intus fuit. hisque ultimis apprehensis uenas, membranasque omnes eadem ratione manu diducere a uulua, totumque illud extrahere. et si quid intus praeterea concreti sanguinis remanet, tum compressis in unum feminibus, illa conclauis collocanda est, modicum calorem sine ullo praestatu habente. super inum uentrem eius imponenda lana succida in aceto, et rosa tincta. reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, et in his uulneribus, quae in nervosis locis sunt, adhibeatur.

De ani uicijs, et eorum curatione. Cap. XXX.

Ni quoque uicia ubi medicamentis non uincuntur, manus auxilium desiderant. ergo si qua scissa in eo uetustate induruerunt, iamque callum habent, commodissimum est ducere alium: tum spongiam calidam admoovere, ut relaxentur illa, et foras prodeant. ubi in conspectu sunt, scalpello singula exadere, et ulcera remouere.

removere. deinde imponere linamentum molle, & super lintecolum illitum melle, locumq; eum molli lana implere & ita vincere altero die, deincepsq; cæteris lenibus medicamentis uti: quæ ad recentia eadē uicia necessaria esse aliàs proposui: & utiq; per primos dies sorbitionibus eum sustinere paulatim: deinde cibis adijcere aliquid generis tamen eius, quod eodem loco præceptum est. si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit incidendum est, ne anus ipse suppuret. neq; tamen ante properandum est. nam si cri dum incisum est, inflammationis multum accedit: & puris aliquanto amplius concitatur. his quoque uulneribus lenibus cibis, hisdemq; medicamentis opus est.

De condylomatum curatione.

Tubercula, quæ novæ uulvæ uicem appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur. alius ante omnia ducitur. tum uolsella tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. quod ubi factum est eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. tantummodo si quid increverit squama aeris coercendum est. ora etiam uenarum fundentia sanguinem sic tolluntur. ubi sanguini, qui effluit, sanies adijcitur: alius acrius ducitur, quo magis oræ promoveantur. eoq; fit, ut omnes uenæ, quasi capitula cōspiciantur. tum si capitulum exiguum est, basimq; tenuem habet, astrigendum lino paulum supra est, quam ubi cum ano committitur. imponenda spongia aqua calida est, donec id libeat. deinde aut ungue, aut scalpello supra nodum id exulcerandum est. quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur. interdum etiam urinae difficultas. si id maius est, & basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est: paulumq; supra basim incidendum: neq; relinquendum quicquam ex eo capitulo: neq; quicquam ex ano demendum est. quod consequitur his, qui neq; nimium, neq; parum hamos ducit. quæ incisum est, acus debet immitti: infraq; eam lino id capitulum alligari: si duo, triaue sunt, unum quodq; primum curandum est. si plura, non omnia simul, ne tempore eodem undiq; teneræ cicatrices sint. si sanguis profluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum. ungenda femina, & inguina, & quicquid iuxta ulcus est. ceratumq; super dandum est. farina ordeacea calida implendusq; is locus est. sic deligandus est. postero die is desidere in aqua calida debet: eodemq; cataplasmate foveri. ac bis die, & ante curationem, & post eam ceruices, ac femina liquido cerato perungenda sunt: tepidoq; is loco continendus. interpositis quinq; aut sex diebus oriculario specillo linamenta edu-

Aurelij Cor.

r iiij

LIBER

enda. si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. tum lenibus medicamentis hisdemq; quæ alibi posui, ulcera ad sanitatem perducenda. finito uicio quemadmodum agendum esset, iā aliās superius exposui.

De uaricum curatione. Cap. XXXI.

His ad crura proximus transitus est. in quibus orti uarices non difficili ratione tolluntur. huc autem et earum uenularum, quæ in capite nocent, et eorum uaricum, qui in uentre sunt, curationem distuli: quoniam ubiq; eadem est. igitur uena ois, quæ noxia est, aut adusta tabescit: aut manu exciditur. si recta est, si quantumuis transversa, tamen simplex: si modica est, melius aduritur. si curua est et uelut in orbes quosdam implicatur, pluresq; inter se inuoluuntur, utilius eximere est: adurendi ratio hæc est. cutis super inciditur. tum patefacta uena tenui, et reposito ferramento candente modice prænititur: uitaturq; ne plagæ ipsius oræ adurantur: quas reducere hamulis facile est. id interpositis ferè quaternis digitis per totum uaricem fit: et tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur: at exciditur hoc modo. cute eadem ratione super uenam incisa hamulo oræ excipiuntur: scalpelloq; undiq; à corpore uena diducitur: caueturq; ne inter hæc ipsa lædatur: eiq; repositus hamulus subiicitur, interpositoq; eodem ferè spacio. quod supra positum est, in eadē uena idem fit, quæ quo tendat, facile hamulo extento agnoscitur. ubi iam idem, quacumq; uarices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum uena præciditur: deinde qua proximus hamus est, attrahitur, et euellitur: ibi rursus absciditur. ac sic undiq; uaricibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur: et super emplastrum glutinans iniicitur.

Curatio digitorum coherentium. Cap. XXXII.

Si digiti uel in utero protinus, uel propter communē exulcerationem postea coheserunt, scalpello diducuntur. dein separatim uterq; non pingui emplastro circundatur. atq; ita per se uterq; sanescit. si uero sit ulcus in digito, posteaq; male indurata cicatrix circum eum reddit, primū malagma tentandum est. dein si id nihil prodest, quod et in ueteri cicatrice, et ubi nerui læsi sunt, euenire consuevit: uidere oportet nerui ne id uicium, an cutis sit. si nerui est, attingi non debet, neq; enim sanabile est. si cutis, tota cicatrix excidenda est: quæ ferè callosa efficit, ut extendi digitum non possit: tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

Angrena inter ungues, alasq; aut inguina nasci: Et siquādo medicamenta unciuntur, membrū præcidi oportere, alio loco mihi dictum est. sed id quoq; cū periculo summo fit: nam sæpe in ipso opere, uel profusione sanguinis, uel animæ defectu ne moriuntur. uerum hic quoq; nihil interest an satis uetum præsidium sit: quod unicum est. igitur inter sanam, uitiatamq; partem incidenda scalpello caro usq; ad os est sic, ut neq; contra ipsum articulum id fiat: Et potius ex sana parte aliquid excidatur, quā ex ægra relinquatur. ubi ad os uentum est, reducenda ab eo sana caro, Et circa os subsecunda est, ut ea quoq; parte aliquid os nudetur: dein id ferrula præcidendum est, quā proxime sanæ carni etiam inherenti. ac tum frons ossis, quā ferrula exasperauit, lenanda est, supraq; inducenda cutis, quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet ut quæ maxime undiq; os contegat. quo cutis inducta non fuerit id linamentis erit contegendum, Et super id spongia ex aceto deliganda. cætera postea sic faciēda, ut in mulneribus, in quibus pus moueri debet, præceptum est.

LIBER OCTAVVS.

De positi, Et figura totius humani corporis. Caput primum.

Vperest ea pars, quæ ad ossa pertinet. quæ quo facilius accipi possit, prius positus, figurasq; eorum indico. Igitur caluaria incipit ex interiore parte concaua, extrinsecus gibba, utrinq; leuis, Et quæ cerebri membranam contegit. Et quæ cute capillum gignente contegitur. eaq; simplex ab occipitio Et temporibus, duplex usque in uerticem à fronte est. ossaq; eius ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. interq; ea uenæ discurrunt, quas his alimentum subministrare credibile est. raro autem caluaria solida sine suturis est. locis tamen æstuosius facilius inuenitur. Et id caput firmissimum, atq; à dolore tutissimum est: ex cæteris, quo suturæ pauciores sunt, eo capitis uoletudo commodior est. neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem: fere tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. tertia ad aures per uerticem tendens, occipitium à summo capite diducit. quarta ab eodem uertice per medium caput ad frontem

r iiij

LIBER

procedit, eaq; modo sub imo capillo definit: modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. ex his ceterae quidem suturae in unguem committuntur. haec uero quae super aures transuersae sunt, totis oris paulatim extenuantur: atq; ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. crassissimum uero in capite os post aurem est, quia capillus ut uerisimile est, ob id ipsum non gignitur. sub his quoq; musculis, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatum positum est. at facies suturam habet maximam, quae a tempore incipiens per medios oculos, naresq; transuersa peruenit ad alterum tempus: in qua breues duae sub interioribus angulis deorsum spectant. et malarum quoq; in summa parte singulae transuersas suturas habent. a medijsq; naribus, aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum una procedit: aliaq; transuersa idem palatum secat. et suturae quidem in plurimis haec sunt. foramina autem intra caput maxima oculorum sunt: deinde narium, tum quae in auribus habemus: ex his quae oculorum sunt, recta, simpliciaq; ad cerebrum tendunt. narium duo foramina osse medio discernuntur. siquidem haec primum a supercilijs, angulisq; oculorum osse inchoantur ad tertiam ferè partem: deinde in cartilagine uersae quo propius ori descendunt, eo magis cartuncula quoq; molliuntur. sed et foramina quae a summis ad imas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera diuiduntur. aliaq; ex his ad fauces peruia spiritum et reddunt, et accipiunt: alia ad cerebrum tendunt. in ultima parte in multa, et tenuia foramina dissipantur, per quae sensus odoris nobis datur: in aure quoq; primo rectum, et simplex iter procedendo flexuosum fit. quod ipsum iuxta cerebrum in multa et tenuia foramina diducitur, per quae facultas audiendi est: iuxtaq; ea duo paruuli quasi sinus sunt. superq; eos finitur os: quod transuersum a genis tendens ab inferioribus ossibus sustinetur: iugale appellari potest ab eadem similitudine a qua id graeci ζυγώδες appellant. Maxilla uero est molle os, eaq; una est, cuius eadem et media, et etiam ima pars mentum est: a quo utrinq; procedit ad tempora: solaq; ea mouetur. nam malarum cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. uerum ipsius maxillae partes extremae quasi biuernes sunt. alter processus intra latior uertice ipso tenuatur: longiusq; procedens sub osse iugali subit: et super id temporum musculis illigatur. alter breuior, et rotundior, et in eo sinus qui iuxta foramina auris est, cardinis modo fit: ibiq; huc, et illuc se inclinans, maxillae facultate motus praestat. duriores osse dentes sunt. quorum pars maxillae, pars superiori ossi malarum haeret. ex his quaterni primi quia secant, τεμνινὸς à graecis nominantur. hi deinde

quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. ultra quos utrinque
 ferè maxillares quaterni sunt, præterq; in his, in quibus tres ultimi, q
 sero gigni solent: non increuerunt. ex his priores singulis radicibus,
 maxillares utiq; binis, quidam etiam ternis, quaternis ueniantur.
 Ferèq; longior radix breuiorem dentem edit: rectiq; dētis recta etiā
 radix, cui flexa est: exq; eadem radice in pueris nouus dēs subit:
 qui multo sæpius priorem expellit: interdum tamen supra, infra uē
 eum se ostendit. caput autē spina excipit. ea constat ex uertebis qua-
 tuor et uiginti. septem in ceruice sunt: duodecim ad costas. reliqua
 quinque sunt proxima costas. hæc teretes, breuesq; ab utroq; latere pro-
 cessus duos exigunt. mediæ perforatæ, qua spinæ medulla cerebro cō
 missa descendit. circa quoq; per duos processus tenuibus canis peruiæ,
 per quæ à membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. o-
 mnesq; uertebrae exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis
 processibus parum desidenti sinus habent: ab inferiore alios deor-
 sum uersus processus tenuibus, cuius peruiæ per quæ à membrana ce-
 rebri similes membranulæ deducuntur. omnesq; uertebrae exceptis
 tribus summis à superiore parte in ipsis processibus parum desiden-
 tis sinus habent: ab inferiore alios deorsum uersus processus exigunt.
 summa igitur protinus caput sustinet. per duos sinus receptis exiguis
 eius processibus. quo fit, ut caput sursum deorsum uersum tuberculis
 exasperetur: secunda superiori parti inferiore. qd ad arcum perti-
 net, pars summa angustiore orbe finitur. Itaq; superior summæ cir-
 cundata, in latera quoq; caput moueri sinit. tertia eodem modo secun-
 dam excipit: ex quo facili ceruicis mobilitas est. ac ne sustinere quidem
 caput posset, nisi utrinque recti, ualentesq; nervi collum continerent: quos
 ζεύοντες græci appellant. siquidem horum inter omnes flexus alter
 semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. iamq; uerte-
 bra tertia tubercula quæ inferiori inserantur, exigit. ceteræ proces-
 sibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur: ac per sinus
 quos utrinque habent, superiores accipiunt: multisq; nervis, et multa
 cartilagine continentur. ac sic uno flexu modico in promptum dato,
 ceteris negotijs homo, et rectus insistit: et aliquid ad necessaria ope-
 ra curuatur. infra ceruicem uero summa costa contra humeros sita
 est: inde undecim inferiores usq; ad immum pectus perueniunt: hæc
 primis partibus rotundæ, et leniter quasi capitulatæ uertebraarum
 transversis processibus ibi quoq; paulum insinuatæ inhaerent. inde
 patescunt: et in exteriorem partem recuruatæ, paulatim in cartilagi-
 nem degenerant. eaq; parte rursus in interiora leniter flexe commit-
 tuntur cum osse pectoris. quod ualens, et durum à faucibus incipit, ab

LIBER

utroq; latere lunatum, & à præcordijs iam ipsum quoq; cartilagine mollium terminatur. sub costis uero prioribus, quinq; quas vocat græci nominant, breues, tenuioresq; atq; ipsæ quoq; paulatim in cartilagine uersæ, extremis abdominis partibus inhaerescunt. imaq; ex his maiore iam parte nihil nisi cartilago est. rursus à ceruice duo lata ossa utrinq; ad scapulas tendunt. nostri scapula aperta, ὠμοπλάται græci nominant. ea in summis uerticibus sinuata, ab his triangula, paulatimq; lateſcentia ad spinam tendunt: & quo latiora quaq; parte sunt hoc hebetiora, acq; ipsa quoq; in imo cartilaginosa posteriore parte uelut innatae, quoniam nisi in summo nulli ossi inhaerescunt. ibi uero ualidis musculis, nervisq; constricta sunt. at à summa costa paulo interius quàm ubi ea media est, os excrescit: ibi quidē tenue, procedens uero quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius, latiusq; & paulatim in exteriora curuatum. quod propius, altera uerticis parte modice intumescens, sustinet ingulum. id autem ipsum recuruum, ac neque inter durissima ossa numerandum: altero capite in eo quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit, paulūq; motu brachij mouetur: & cum lato osse scapularum infra caput, eius nervis, & cartilagini connectitur. hinc humerus incipit extremis utrinq; capitibus tumidus, mollis, sine medulla cartilaginofus. medius teres, durus, medulloſus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem, anteriorem & posteriorem partem. prior autem pars est quæ à pectore est, posterior quæ ab scapulis, interior quæ ad latus tendit: exterior quæ ab eo recedit. quod ad omnes articulos pertinere in ulterioribus patebit. superius autem humeri caput rotundius quàm cetera ossa, de quibus adhuc dixi, uerticillatis scapularum ossibus paruo excessu inseritur: ac maiore parte ex transitu nervis deligatur. at inferius duos processus habet: inter quos quod medium est, magis etiā extremis partibus sinuatur. quæ res sedem brachio præstat: quod constat ex ossibus duobus. radius, quam νεῦνδα græci appellant, superior, breuiorq; & primo tenuior rotundo, & leniter cauo, capite exiguum humeri tuberculum recipit: atq; ibi nervis, & cartilagine continetur. cubitus inferior, longiorq; & primo plenior in summo capite, duobus quasi uerticibus extantibus in sinu humeri, quem inter duos processus eius esse proposui, se inserit. primo uero duobus radijs brachij ossa iuncta paulatim dirimuntur: rursusq; ad manū coeunt modo crassitudinis mutato: siquidem ibi radius plenior, cubitus admodū tenuis est. deim radius in caput cartilaginofum conſurgens, in uerticem eius sinuatur. cubitus rotundus in extremo, parte altera paulū procedit: ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet. plu-

rima ossa in cartilagine desinere: nullum articulum non sic finiri. neq; enim aut moveri posset, nisi leui inniteretur: aut cum carne, nervisq; coniung, nisi ea media quædam materia committeret. in manus uero prima palmæ pars ex multis, minutisq; ossibus constat, quorum numerus incertus est. sed oblonga omnia, & triangula structura quædam inter se connectuntur: cum inuicem superior alterius angulus, alterius planities sit: eoque fit ex his unius ossis paulum in interiora concavi species. uerum ex manu duo exigui processus in sinus radij coniunguntur. tum ex altera parte recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent, à quibus ipsi digiti oriuntur: qui ex ossibus terminis constant: omniumq; eadem ratio est. interius os in uerticem sinuat: recipitq; exterioris exiguum tuberculum, nerviq; ea continent, à quibus orti ungues indurescunt. ideoq; non ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent. ac superiores quidē partes sic ordinatæ sunt. ima uero spina in coxarū osse discedit, quod transuersum, longeq; ualentissimum uulnam, uesciam, rectum intestinum tuetur, idq; ab exteriori parte gibbū ad spinam, resupinatum à lateribus, idest in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus oritur os quod pectinem uocat. idq; super intestina sub pube transuersum uetrem firmat rectius in uiris: recuruat magis in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat. inde foemina oriuntur: quorum capita rotundiora etiam quā humerorum sunt, cum illa ex cæteris rotundissima sint. infra uero duo os processus à priore, & à posteriore parte habent. dein dura, et medullosa, & ab exteriori parte gibba habent: rursus ab inferioribus quoq; capitibus intumescunt: superiora in sinus coxæ sicut humeri in ea ossa, quæ scapularum sunt, coniunguntur. tum infra introitus leniter intendunt, quo æqualius superiora membra sustineant. atq; in eo inferiora quoq; capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint: quæ commissura osse paruo molli cartilagineo tegitur: patellam uocant. hæc super innatans, nec ulli ossi inhaerens, sed carne, et nervis deligata, pauloq; magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur ipsum autem crus est ex ossibus duobus. & enim per omnia femur humero, crus uero brachio simile est. adeo ut habitus quoq; & decus alterius ex altero cognoscatur. quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. uerum alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod ipsum quoque supra recte nominatur. id breuius, supraq; tenuius ad ipsos talos intumescit. alterum à priore parte positum, cui tibiæ nomen est, longius, & in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur: sicut cum humero cubitus. atq; ea quoq; ossa infra, supraq; coniun-

LIBER

Et media ut in brachio debiscunt. exapitur autē crus infra ossa ex
transuerso talorum, idq; ipsum super os calcis situm est, quod quadā
parte sinuatur: quadam excessus habet: & procedentia ex tulo reci-
pit: & in sinum eius inseritur. idq; sine medulla durum, magisq; in
posteriorem partem proiectum teretem ibi figuram representat. cæ-
tera ossa pedis ad eorum quæ in manu sunt similitudinem instructa
sunt. plantæ palmæ, digiti digitis, ungues unguibus respondent.

Ossa uiciata, & corrupta quibus signis cognoscantur: & qua ratio-
ne curentur. Cap. II.

Mane autem os ubi iniuria accessit, aut uiciatur, aut fin dicitur,
aut frangatur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur.
id quod uiciatum est, primo ferè pingue fit: deinde uel ni-
grum, uel cariosum: quæ super natis grauius ulceribus, aut fistulis:
hisq; uel longa uetustate, uel etiam cancro occupatis eueniunt. Opor-
tet autem ante omnia os nudare ulcere exciso: & si latius eius uicium
est, quàm ulcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os undiq; pa-
teat: tum id quod pingue est semel, iterum uel satis est admoto ferrame-
to adurere, ut ex eo statim secedat: aut eradere donec iā aliquid cruo-
ris ostendatur: quæ integrioris nota est. nam necesse est aridum sit id,
quod uiciatum est. idem in cartilagine quoq; læsa faciendum est. si-
quidem ea quoq; scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod re-
linquatur. deinde siue os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito re-
spargendum est. neque alia facienda sunt ubi caries, nigrities uel in
summo osse est. siquidem id uel paulo diutius eodem ferramento adu-
rendum, uel radendum est. qui radit hæc, audacter imprimere fer-
rumentum debet, ut & agat aliquid: & maturius desinat. finis est,
cum uel ad album os, uel ad solidum uentum est. albo finire ex nigri-
tie uitium, soliditate quadam ex carie manifestum est: accedere etiam
cruoris aliquid integro supra dictum est. si quando autem altius de-
scenderit, uirumlibet dubium est: in carie quidem expedita cognitio
est. specillum tenue in foramen demittitur. quod magis, minus uel in-
terando, uel in summo carium esse, uel altius descendisse testatur. nigri-
ties colligi quidem potest etiam ex dolore, & ex febre. quæ ubi
mediocria sunt, illa alte descendisse non potest: manifestior, tamen,
ad alta terebra fit. nam finis uicij est, ubi scobis nigra esse desijt.
igitur si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris fora-
minibus est: quæ altitudine uicium æquent. tum in ea foramina de-
mittenda candētia ferramenta sunt: donec inde sicum os ex toto fiat.
simul enim post hæc & resoluetur ab infriore osse quodcumq; uiciatū

est: & his sinus carne replebitur: & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. atque idem in carie quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. sed quod totum uicium, totum eximendum est. si inferior pars integra est, catenus quod corruptum est, excidi debet. item siue capitis, siue pectoris os, siue costae cariæ est, inutilis uicio est: & excidendi necessitas est. neque audiendi sunt qui osse nudato diem tertium expectant, ut tunc excidant. ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. itaque quantum fieri potest eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum: et omni uicio liberandum est. longeque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia uix etiam si recte cessit, curatio uera sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur, & de modiolis, & terebra feramentis ad id paratis. Cap. III.

Exciditur uero os duobus modis: si paruum est, quod læsum est, modiolis, quem *χοιρίδιον* greci uocant. si spaciosus, terebris. utriusque rationem proponam. Modiolus feramentum concavum, teres est imus oris ferratum, per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duo genera sunt: alterum simile ei quo fabri utuntur. alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit: atque iterum ab alio principio paulo minus quam equaliter sursum procedit. si uicium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. & si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clauum recipiat, ut eo insistente circumactus modiolus delabi non possit. deinde is habena quasi terebra conuertitur. estque quidam premendi modus, ut & foretur, & circumagatur. quia si leuiter imprimatur, parum proficit. si grauiter, non mouetur. neque alienum est instillare paulum rose uel lactis, quo magis lubrico circumagatur. quod ipsum tamen si copiosius est, aciem feramenti hebetat. at ubi iam iter modiolis pressum est, medius clauus educitur: & ille per se agitur. deinde cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur. at si latius uicium est, quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. ea foramen fit in ipso sine uiciosi ossis atque integri: deinde alterum non ita longe. tertiumque donec totus is locus, qui excidendus est, his cauis cinctus sit. atque ibi quoque quatenus terebra agenda sit, scobis significat. tunc excisarius scalper ab altero foramine ad alterum malleolo ada-

LIBER

etus: id quod inter utrunque medium est, excidit: ac sic ambitus similis
 ei fit, qui in angustiore orbem modiolio imprimitur. utro modo ue-
 ro id circumductum est, idem excoforius scalper in osse corrupto pla-
 nus summam quanque testam laesit, donec integrum os relinquatur.
 Vix unquam nigrities integrum, caries per totum os perrumpit: ma-
 ximeque ubi uitiata caluaria est. Id quoque signi specillo significatur, qui
 depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet: et ob id
 renitens aliquid inuenit, et madens exit. si peruium inuenit, altius
 descendens inter os, et membranam nihil oppositum inuenit: educa-
 turque sians, non quo non subsit aliqua vitiosa sanies, sed quoniam
 ibi, ut in latiore sede diffusa sit. Siue autem nigrities, quam terebra
 detexit: siue caries, quam specillum ostendit, os transit: modiolio quidem
 usus fere superuacuum est: quia latius pateat necesse est, quod iam alte
 processit. terebra uero ea, quam secundo loco posui utendum, eaque ne
 nimis incalascit, subinde in aquam frigidam demittenda est. sed tum
 maiore cura agendum est: cum iam aut simplex os dimidium perfo-
 ratum est: aut in duplici, superius illud, spacium ipsum, hoc sanguis
 significat. ergo tum lentius ducenda habena: suspendaque magis sini-
 stra manus est, et saepius attollenda: et foraminis altitudo conside-
 randa: ut quandocumque os perrumpitur sentiamus: neque periclitemur,
 ne mucrone cerebri membrana laedatur: ex quo graues inflammatio-
 nes cum periculo mortis oriuntur. factis foraminibus eodem modo me-
 dia saepe, sed multo circumspectius excidenda sunt: ne forte angulus
 scalpri eandem membranam uiolet: donec fiat aditus, per quam me-
 branae custos immitatur: *μνηστρούσαντες* graeci uocant. lamina enea
 est firma, paulum resina, ab exteriori parte laevis, quae demissa est,
 ut exterior pars eius cerebro propior sit. subinde ei subiicitur quod
 scalpro discutiendum est. ac si excipit eius angulum, ultra transire
 non patitur: eoque et audacius, et tutius scalprum malleolo subinde
 medicus ferit, donec excisum undique os eadem lamina leuetur: tollique
 sine ulla noxa cerebri potest. Vbi totum os eiectum est, circum raden-
 da, leuandaque sunt ora: et si quid scobis membranae insedit, colligen-
 dum. ubi superiori parte sublata, inferior relicta est, non ora tantum,
 sed os quoque totum lauandum est: ut sine noxa postea cutis increseat.
 quae aspero osse innascens protinus non sanitatem, sed novos dolores
 mouet. patefacto cerebro qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fra-
 cta ossa perueniero. si basis aliqua seruata est, superimponenda sunt
 medicamenta non pingua, quae recentibus uulneribus accommodan-
 tur: supraque imponenda lana succida oleo, atque aceto madens. ubi ie-
 pus processit, ab ipso ore caro increscit, eaque factum manu sinum co-

plet. si quod etiam os adustum est, à parte sana recedit: subitq; inter integram atq; emortuam partem caruncula: quæ quod abscissit, expellat. eaq; ferè quia testa tenuis, et angusta est: squama, idest lepis à græcis nominatur. Potest etiam euenire, ut ex ictu neq; findatur os, neq; perfringatur: sed summum tamè collidatur, exaspereturq; quod ubi incidit, radi, et lauari satis est. hæc quauis maxime fiunt in capite, tamen cæteris quoq; ossibus communia sunt: ut ubicunq; idem incidet, eodem remedio sit utendum atq; cum ea fracta, fissa, forata, collisa sunt: quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. de quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

De caluariæ curatione.

Cap. IIIT.

Citur ubi ea pertusa, protinus requirendum est, num bilis homo conuerit: num oculi eius obæcati sint: num obmutuerit: num per nares, aures uel sanguis ei effluerit: num coniderit: num sine sensu quasi dormiens iacuerit. hæc enim non nisi ossè fracto eueniunt. atq; ubi inciderunt, scire licet necessariam, sed difficilem curationem esse. si uero etiam torpor accessit, si mens non constat, si neruorum uel resolutio, uel distentio secuta est: uerisimile est etiam cerebri membranam esse uiolatam: eoq; in angusto magis spes est. at si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari an os fractum sit. et protinus considerandum est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit. et hoc ipso leni, an aspero, mediocri, an uastiore: uehementer, an leniter. quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei resutisse credibile est. sed nihil tamen melius est, quàm certiore id nota explorare. ergo qua plaga est, demitti specillum oportet, neq; nimis tenue, neq; acutum: ne cum in quosdam sinus naturales incidet, opinionem fracti ossis frustra faciat: neq; nimis plenum, ne paruule rimulæ fallant. ubi specillum ad os uenit, nihil nisi lene, et lubricum occurrit: integrum id uideri potest. si quid asperi est, utique quasuture non sint, fractum os esse testatur. à futuris se deceptum esse Hippocrates memoriæ prodidit more scilicet magnorū uirorū, et si duca magnarū rerum habentium. nam leuia ingenia, quia nihil habent: nihil sibi detrahunt. magno ingenio, multaq; nihilominus habituro conuenit etiā simplex ueri erroris confessio, præcipueq; in eo misterio quod utilitatis causa posteris traditur. ne qui deapiatur eadē rōne, qua quis ante deceptus est. sed hæc quidem alioquin memoria magi professoris uti interponeremus effect. potest aut futura eo no-

LIBER

mine fallere. quæ æque aspera est, ut aliquis hanc esset, etiam si rimma est, existimet eo loco, quo subesse hanc uerisimile est. ergo eo nomine decipi non oportet: sed os aperire tutissimum est. nam neque utique certa sedes ut supra posui, futurarum est: et potest idem, et natura liter commissum, et ictu fissum esse: iuxta uero aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit uehementior, quamuis specillo nihil inueniatur: tamen aperire commodius est. at si ne tum quidem rimma manifesta est, inducendum super os attramentum scriptorium est: deinde scalpro id detrahendum. nigritiem enim continet si quid fissum est. solet etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, et os altera fiderit. itaque si grauiter aliquis percussus est, si mala inditia subsecuta sunt, neque ea parte qua cutis discussa est, rimma reperitur: non incommodum est parte altera considerare, nunquis locus mollior sit, et tumeat: eumque aperire. si quidem ibi fissum os reperietur. nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiam si frustra detecta est. os fractum nisi suaturum est, grauibz inflammationibus affici: difficiliusque postea tractatur. raro, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem totum integrum maneat: intus uero ex ictu uena aliqua in cerebri membrana rupta, aliquid sanguinis mittat. isque ibi concretus magnos dolores moueat: oculos quibus obæcet. sed ferè contra id dolor est, et eo loco cute incisa pallidum os reperitur. ideoque id quoque os excidendum est. quacumque autem de causa curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid læsum est, in conspectu sit. in quo ipso uidendum est, nequid, ex ipsa membranula, quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur. si quidem hæc scalpro, te rebris, ue lacerata uehementes febres cum inflammationibus excitat. itaque eam commodius est ex toto ab osse diduci. plagam, si ex uulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. si manu facta est, ea ferè commodissima est, quæ duabus transversis lineis litteræ X. figuram accipit: ut deinde à singulis procedentibus lingulis cutis subsequatur. inter quæ si sanguis fertur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus est: occupandusque obiectis linamentis. et caput altius excitandum. neque id uicium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, affert: sed ibi quoque nihil tutius fit. In omni uero fisso, fracto, ue osse protinus antiquiores medici ad ferramenta ueniebant: quibus id exciderent. sed multo melius est, ante emplastra experiri, quæ caluariæ causa componuntur: eorumque aliquid oportet ex aceto molitum per se super fissum, fractum, ue os imponere. deinde super id aliquanto latius quam uulnus est, eodem medicamento illitum linteolū, et præterea suadam lanam aceto tinctam. tunc uulnus deligare, et quotidie

quotidie resolvere, similiterq; curare usq; ad diem quintum. à sexto die etiam uapore aquæ calidæ per spongiam fouere. cætera ex eadem facere. quod si caruncula increscere cæperit, et febricula, aut soluta erit, aut leuior et cupiditas abi reuerterit, satisq; somni accedet: in eodem medicamento erit perseverandum. Proecedente deinde tempore emolliendum id emplastrum adiecto cerato ex rosa factò, quò facilius carnem producat. nam per se reprimendi uim habet. hac ratione sepe rimæ callo quodam implètur, estq; ea, ossis uelut cicatrix. et latius fracta ossa, si quæ inter se non cohærebant, eodem callo glutinantur: estq; aliquanto melius uelamentum cerebro, quàm caro quæ exciso osse increscit. si uero sub prima curatione febris intenditur, breuesq; somni, et idem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet: neq; alitur: et in ceruicibus glandulæ oriuntur: magni dolores sunt: ubiq; super hæc fastidium increscit: tum demum ad manum, scalprumq; ueniendum est. duo uero sub ictu caluariæ pericula sunt, ne uel findatur, uel medium desinat: si fissum est, possunt oræ esse compresæ: uel quia altera super alteram excessit: uel etiam quia uehementer rursus se commiserunt. ex quo euenit ut humor ad membranam quidem descendat, exitum uero non habeat: ac sic eam irriter, et graues inflammationes moueat. ubi medium desedit, eandem cerebri membranam os urget. interdum etiam ex fractura quibusdã uelut aculeis pungentibus: his ita succurrendum est, ut tamen quamminimè ex osse dematur. ergo si ora alteri infedit, satis est id quod eminet plano scalpro excidere. quo sublato iam rimæ hiat quantum curationi satis est. at si oræ inter se comprimuntur, à latere eius interposito digiti spacio, terebra foramen faciendum est: ab eoque scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem. C. litteræ, sicut uertex eius à foramine basis ad rimas it: quod si rimæ longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: et ita nihil latens in eo esse concitum est: abundeq; exitus datur intus lædentibus. ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est. sed siue totum perfractum est, et ab alio ex toto recessit, siue circumpositæ caluariæ inhæret, exigua parte ab eo quod naturaliter se habet, scalpro diuidendum est. deinde in eo quod desedit, iuxta rimam quam fecimus, foramina addenda sunt. si in angusto noxa est, duo. si latius patet, tria, septaq; eorum excidenda: et tum scalper utrinque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum faciat: imaq; pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. deinde si qua labent, et ex facili remoueri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt, maximeq; ea quæ acuta membranam infestant: si id ex facili fieri non po-

Aurelij Cor.

f

est: subiicienda lamina est, quam custodem eius membranae esse pro-
positum: et super eam quicquid spinosum est, et intus eminet, excide-
dum est, eadem lamina quicquid deorsum infedit, attollendum. hoc
genus curationis efficit, ut qua parte fracto ossa tamen inhaerent, soli-
dentur. qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamenti
tempore excidant. spatiumque inter haec satis illi magnum ad extra-
hendam sanem relinquatur: plusque in osse propugnaculi cerebrum
habeat, quam habiturum fuit eo exciso. his factis ea membrana acri
aceto respergenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibe-
atur: siue intus concretus cruor remanet, discutatur. tum idem me-
dicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollium ipsi mem-
branae imponendum est. caeteraque eodem modo facienda sunt, quae ad
linteolum illitum, et lanam succidam pertinent. collocandusque is loco
in tepido: et curandum quotidie vulnus, bis etiam aestate. quod si me-
brana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepi-
da si usque eo tumebit, ut super ossa quoque emineat: coerebit eam bene
erita lentacula, uel folia uitis contrita, et cum recenti uel butyro, uel
adipe anserino mixta, ceruixque molliri debebit liquido cerato ex iri-
no facto. at si parum pura membrana uidebitur par modus eius em-
plastri, et mellis miscendus erit, idque superinfundendum, eiusque con-
tinendi causa unum, aut alterum linamentum iniiciendum, et super
linteolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. ubi plus pura mem-
brana est, eadem ratione adiciendum emplastro ceratum, ut carne
producat. quod ad abstinentiam uero et primos, ultioresque cibos, po-
tionesque pertinet. eadem quae in uulneribus praecipitur, seruanda sunt:
eo magis, quo periculosius haec pars afficitur. quin etiam cum iam non
solum sustineri, sed aliis quoque apparebunt: tamen erunt uitanda
quae cumque mandenda sunt. item fumus, et quicquid excitat sternuta-
mentum spem uero certam facium membrana mobilis ac sui coloris,
atro increfcescens rubicunda, facili motus maxillae, atque ceruicis. mala
signa sunt. membrana immobilis nigra, uel liuida, uel aliter coloris
corrupti, dementia, acris uomitus, nervorum uel resolutio, uel disten-
tio: atro liuida, maxillarum rigor, atque ceruicis. caeteraque quae ad so-
mnium, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent: eadem quae
in caeteris uulneribus, uel salutaria, uel mortifera sunt: ubi bene res-
cedit, inapit ab ipsa membrana, uel si os eo loco duplex est, inde
quoque atro increfcescere: eaque id, quod inter ossa natum est, replet. non
nunquam etiam super caluariam excrescit. quod si incidit, insper-
genda squama aeris est, ut id reprimat, cohibeatque, ea carni superda-
do quae ad cicatricem perducant. omnibusque ea locis commode induca-

tur, excepta frontis ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est. ibi enim vix fieri potest, ut non per omnem ætatem sit exulceratio, quæ lintolo medicamentum habente contingenda sit: illa utiq; capite fracto seruanda sunt: ut donec iam valida cicatrix eris soluenda, uidentur frequens balneum, maior uini modus.

De narium fracturum curatione. Cap. V.

Naribus uero et os, et cartilago frangi solet, et quidem modo aduersa, modo à latere: si aduersa fracta sunt, alterum uel ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. si à latere os fractum est. is locus cauus est. si cartilago, in altera partem nares declinantur. quicquid in cartilaginem incidit, exciandū leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinq; compressis. deinde in longitudinem implicata linamenta et molli pellicula circumdata, circumfutaq; intus adijcienda sunt. aut eodem modo composita, aliquid ex arido penicillo. aut grandis pinna gummi, uel fabrilis glutine illita, et molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilaginem non sinat. sed si aduersa ea fracta est, æqualiter utraq; naris implenda est. si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua natus iacet, ab altera tenuius in id quod inferitur. extrinsecus autem circumdanda habena est mollis media illita mixtis inter se simula, et turis fuligine. eaq; ultra aures ducenda, et fronti duobus capitibus agglutinanda est. id enim corpori quasi gluten inhaerescat: et cum induruit nares commodè continet sin quod intus inditum est, lœdit: sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excitata nares eadem tantummodo habena continendæ sunt. deinde post quatuordecim dies id ipsum demendum est. resoluitur autem aqua calida: eaq; tum is locus quotidie fouendus est. sin os fractum est, id quoq; digitis in suam sedem reponendum est. atq; ubi aduersum, ut dictum est, utraq; naris implenda est. ubi à latere, ea inquam os impulsum est. imponendūq; ceratum, et paulo uehementius deligandum est: quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increscit. à tertio die fouendum id aqua calida est: tantūq; magis, quanto propius esse sanitati debet. quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda: imponendaq; extrinsecus eadem habena, et super eam ceratum, neq; ultra fascia adhibenda est. at si quod fragmentum undique resolutum cum cæteris non glutinabitur, intelligitur quidem ex humore, qui multus ex ulnere fertur: uol fella uero extrahetur. finis

LIBER

tisq; inflammationibus imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quæ leniter reprimunt. peius est ubi aut ossi, aut cartilagini fractæ cutis quoq; vulnus accessit. id admodum raro fit: si incidit, illa quidem nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. cuti uero super imponendum emplastrum aliquod ex his, quæ recentibus vulneribus accommodata sunt: sed insuper nullo uinculo deligandum est.

De aurium fracturæ curatione. Cap. VI.

In aure quoq; interdum rumpitur cartilago. quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum est. sæpe enim suppurationem prohibet, & aurem confirmat. illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quod cartilagine ipsam glutinari, circa tamen carnem incrementum, solidariq; eum locum. itaq; si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinq; sinitur. nunc autem de ea dico, quæ cute ita frangitur. in ea uero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis: & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est. deinde utendum est medicamento leniter suppressante, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat. tum imponendum linteolū cum emplastro sic, ut pingue omnis nitetur: & à parte posteriore lana mollis auri subiicienda est: quæ, quod est inter hanc & caput, compleat. tum ea leniter deligenda est: & à tertio die uapore, ut in naribus posui, fouenda. atq; in his quoq; generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fractæ curatione, deq; quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. Cap. VII.

A his ad maxillam uenturus indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os modo rectum ut lignum in longitudinem finditur: modo frangitur transversum: interdum obliquum, atq; id ipsum nonnunquam retusa habet capita: nonnunquam acuta. quod genus pessimum est: quia neq; facile committuntur, quæ nulli retuso inuicuntur, & carnem vulnerant: interdum neruum quoque, aut musculum: quin etiam aliquando plura fragmenta à fragmento fiunt. sed in alijs quidem ossibus ex toto sæpe fragmentum à fragmento recedit. Maxilla uero semper aliqua parte, etiam uexata ossa inter se coherent. igitur in primis digitis duobus utrinq; prementibus, & ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem compellenda sunt. deinde

inde si trasuersa maxilla fracta est, sub qua casu ferè dēs super proximum dentem excedit: ubi ea in suam sedem collocata est: duo proximi dentes, aut si hi labant, posteriores inter se seta deligandi sunt. id in alio genere fracturæ supernacuum est. cetera eadem facienda sunt. nam linteolum duplex madens uino, et oleo super iniiciendum cum eadem similia, et eadem turis fuligine est. deinde aut fasciata, aut mollis habena media in longitudinem inosa, ut utrinque montum complectatur, et inde capita eius supra caput adducta ibi deligantur. illud quoque ad omnia ossa pertinens dictum erit: sciamus primum esse necessariam: deinde à die tertio humidum cibum, sublata inflammatione paulo plenior: eumque qui carnem alat, per omne tempus uinum esse alienum. deinde tertio die resolui debere: foueri que per spongiam uapore aquæ calidæ: eademque quæ primo fuerunt super dari. item die quinto fieri, et donec inflammatio finiatur: quæ uel octauo die, uel septimo ferè resoluitur. ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. neque id esse soluendum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæque ossa conseruntur, transierint. fere uero intra quartumdecimum et unum et uigesimalium diem sanescunt maxilla, malæ, iugulum, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta. inter uigesimalium et trigesimalium diem crura, brachiaque: inter septimum et uigesimalium et quadragesimum humeri, et femina. sed in maxilla illud quoque adiiciendum est, quod humidus abusus diu assumendus est. atque etiam cum tempus processit, in lagano, similibusque alijs perseuerandum, donec ex toto maxillam callus firmarit. item utique primis diebus habendum silentium.

De iuguli fracti curatione. Cap. VIII.

Iugulum uero si transversum fractum est, nonnunquam per se rursus recte coit: et nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. nonnunquam uero, maximeque ubi motum est, elabitur ferèque id quod à pectore, sub id quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. cuius ea ratio est, quod per se non mouetur: sed cum humeri motu consentit. itaque eo subsistente sub id humerus angitur. raro uero ad modum in priorem partem iugulum inclinatur: adeo ut magni professores nunquam se uidisse memorie mandarent. sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est. uerum ut dissimilis uterque casus est, sic quædam dissimilia requirit. ubi ad scapulas iugulum tendit, simul dextra manu planè propellendus in posteriorem partem humerus est, et illud in priorem attrahendum. ubi ad

Aurelij Cor.

§ ii

pectus conuersum est: ipsum quidem retro dandum: humerus autem in priorem partem adducendus est. ac si is inferior est, non id quod à pectore est, deprimendum est, quia immobile est: sed humerus ipse attollendus. si casu superior est, id quod à pectore est: implendum lana: & humerus ad pectus deligendus est. si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem uulnerant, præcidenda sunt. tunc retusa ossa cõmittenda sunt. si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est in uino, & oleo tinctum. si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemq; intus incerato, ne fasciæ diducatur. quæ iugulo composito circumdanda est sæpius, potius quàm ualentius. quod ipsum quoq; in omnibus ossibus fractis perpetuum est. à dextro uero iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram: à sinistro ad dextram: rursumq; sub ala sua fasciari debet. post hæc si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus. si in partem priorem, ad ceruicem deligandum est. supinusq; homo collocandus: cæteraq; eadem facienda, quæ supra comprehensa sunt. sunt uero plura ossa ferè immobilia uel dura, uel cartilaginosa, quæ uel franguntur: uel forantur: uel colliduntur: uel finduntur. ut malæ, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina costarum, os tali, calx, manus, planta. horum omnium eadem curatio est, si supra uulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. quo sanescente rimas quoq; ossis, aut si quod ferrumen est, callus implet. si cutis integra est, & os læsum esse ex dolore colligimus: nihil aliud, quàm quiescendum: imponendumq; ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

De costarum fracturarum curatione. Cap. IX.

Proprie tamen quædam de costa dicenda sunt: quia iuxta uiscera est: grauioribusq; periculis is locus expositus est. hæc quoq; igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rara est, lædatur: interdum fit, ut eâ totum is casus perruperit. si tota fracta nõ est, nec sanguis expuitur: nec febricula sequitur: nec quicquam suppurat, nisi admodum rare, nec dolor magnus est: tactu tamen is locus leniter indolescit: abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, facere: & à media fasciæ incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. ab uno uero & uigesimo die quo utiq; os esse debet glutinatum, id agendum. cibis uberioribus est utendum, ut corpus quamplenissimû fiat: quo melius os uestiat. quod illo loco tenerû, adhuc iniuriæ sub tenui cute ex=

positum est. per omne autem tempus curationis vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus uehementior corporis, fumus, puluis: et quicquid uel tussim, uel sternutamentum mouet. ne spiritum quidem magnopere continere expedit. at si tota costa perfracta est, casus asperior est. nam et graues inflammationes, et febris, et suppuratio, et saepe uitae periculum sequitur: et sanguis spuitur. ergo si uires patiuntur ab eo brachio, quod super eam astitam est, sanguis mittendus est. si non patiuntur, alius tamen sine ullo acri ducenda est: diutiusque inedia pugnandum. panis uero ante septimum diem non assumendus: sed una sorbitione uiuendum: imponendumque ei loco ceratum ex lino factum: cui cocta quoque resina adiecta sit: aut Polyarchi malagma, aut panacis ex uino, et rosa, et oleo: superque imponenda lana succida, mollis, et duae fasciae a medijs orsa, minimisque astrictae. Multo uero magis omnia uitanda, quae supra posui, adeo ut ne spiritus quidem saepius mouendus sit. quod si tussis insistat, ad id potio sumenda erit, uel ex tryxagone, uel ex ruta, uel ex herba stychia de, uel ex cuminio, et pipere. Grauioribus uero doloribus urgentibus cataplasma imponi quoque conueniet, uel ex lolio, uel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. et id quidem interdum superiacebit. noctu uero idem aut ceratum, aut malagma, aut pannus: quia potest cataplasma decidere. ergo quotidie quaeque resoluetur, donec iam cerato, aut malagmate possimus esse contenti. et decem quidem diebus extenuabitur fane corpus. ab undecimo uero alii incipit. ideoque etiam laxior quamprimum fasciae circumligabitur: fereque ea curatione ad quadragesimum diem perueniet: quae si modus erit suppurationis, plus malagma quam ceratum ad digerendum proficiet. si suppuratio uicerit neque per quae superscripta sunt discuti potuerit, omnis mora uitanda erit, ne os infra uicietur. sed qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perueniat: idque effundendum. si nusquam caput se ostendit: ubi maxime pus subit, sic intelligimus: creta amolia totum locum illinimus, et si curari patiemur. quo loco maxime humor in ea perseverauit, ibi pus proximum erit: eaque uti debet. si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum: demittendum erit linamentum, aut aliquid ex penicillo. quod summum lino sit deuinctum ut facile educatur. reliqua eadem, quae in ceteris adustis facienda sunt. ubi purum erit ulcus, aliud corpus debet, ne tabes perniciosa futura id malum subsequatur. nonnunquam etiam leuius ipso osse affecto et inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam mucosus similis intus coit: mollescitque contra tactum, in qua simili uisione utendum est.

LIBER

De spinæ curatione.

In spina quoque est quod proprie notemus. nam si id quod ex uertebra excedit, aliquo modo fractum est: locus quidē concavus fit: punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. quo fit ut homo in interiorem partem subinde nitatur. hæc noscendæ rei causa sunt. medicamentis uero hisdem opus est: quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fracturâ, uel emulсорum, communibus curationibus. Cap. X.

Imiles rursus ex magna parte casus curationes quæ sunt humeris, & femoribus: communia etiam quædam humeris, brachijs, femoribus, cruribus, digitis. siquidem ea minime periculose media franguntur. quò propior fractura capiti uel superiori uel inferiori est: eò prior est. nam & maiores dolores affert: & difficilius curatur. ea maxime tolerabilis est simplex, transversa. peior ubi fragmenta, atque ubi obliqua. pessimum ubi eadem acuta. nonnunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius excidunt: aliudque super aliud effertur. idque ante omnia cōsiderari debet. & sunt notæ certæ. si suis sedibus mota, resima, punctioque sensum representant, tactu inæqualia sunt. si uero non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit, ubi loco suo non sunt: membrum id altero latere brevius est: & muscoli eius tument. ergo si hoc depressum est, protinus id membrum oportet extendere. nam nervi, musculique intenti per ossa contrahuntur: neque in suum locum veniunt: nisi illos per uim aliquis intendit. rursus si primis diebus id obmissum est, inflammatio oritur: sub qua & difficile, & periculose uis nervis adhibetur. nam distentio nervorum uel cæcer sequitur: uel certum, ut mitissime alatur, pus. itaque si ante reposita ossa non sunt, postea reponenda sunt. intendere autem digitum, uel aliud quoque membrum: si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest, cum alteram partem dextra, alteram sinistra prehendit. ualentius membrum duobus eget: qui in diuersa contendunt. si firmiores nervi sunt, ut in uiris robustis, maximeque eorum feminibus, & cruribus euenit: habent quoque uel linteis fascijs utrinque capita articularum deliganda, & per plures in diuersa ducenda sunt. ubi paulo longius quam naturaliter esse debet membrum uis fecit. tunc ædemum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt: inditumque ossi repositi est dolor sublatus. & membrum alteri parti æquatum inuoluendum duplicibus triplicis panni, & in uino, & oleo tinctis:

quos lintheos esse commodius est. ferè uero his sex opus est. prima bre-
uissima adhibenda, quæ circa fracturam ter uoluta sursum uersum
feratur, & quasi in coclea serpat: satisq; est eam ter hoc quoq; modo
circuire. altera dimidio longiore, eaq; qua parte os eminet, ab ea si to-
tum æquale est, undelibet super fracturam debet incipere priori
aduersa: deorsum tendere, atq; iterum de fractura reuersa in superio-
re parte ultra priorem fasciam desinere. super has iniiciendum latio-
re lintheo ceratum est, quod eas contineat. ac si qua parte os eminet,
triplex ea pannus obijciendus eodem uino & oleo madens. hæc ter-
tia fasciæ comprehendenda sunt: quartaq; sic, ut semper insequens
priori aduersa sit: & tertia tantum inferiore parte tres in superio-
re faciant: quia satius est sæpius circuire, quàm adstringi. siquidem
id quod adstrictum est, alienatur: & cancro opportunè est: articulum
autem quamminime uincire opus est. sed si iuxta hunc os fractum est,
neesse est. deligatum uero membrum in diem tertium continendum
est. eaq; iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit: non
tamen laxa uisa sit: secundo laxior: tertio iam penè resoluta. ergo tunc
rursum id membrum deligandum: adijciendaq; prioribus quinta fas-
ciæ est: iterumq; quinto resoluendum est: & sexta fasciæ inuoluen-
dum sic, ut tertia & quinta infra cetera supra finiantur. quotiens-
cunq; autem soluitur membrum, calida aqua fouendum est. sed si iux-
ta articulum fractura est: diu instillandum uinum est. exigua par-
te olei adiecta, eademq; omnia facienda donec adeo inflammatio sol-
uatur: uel leuius quoq; quàm ex consuetudine id membrum fiat. quod
si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet. tum facillime ossa tra-
ctantur. rursus ergo si parum commissa sunt, committi debent. si qua
fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt. deinde eodem mo-
do membrum deligandum, ferulæq; super accomodanda sunt: quæ fi-
scæ, circumpositæq; ossa in sua sede contineant: & in quam partem
fractura inclinat, ab ea laxior, ualentiorq; ferula imponenda est.
easq; omnes citra articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant: nec
ultra astringi, quàm ut ossa contineant, & cum spatio laxentur: tertio
quoq; die paulum habentis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus do-
lor est, sic manere donec duæ partes eius temporis quod quoq; os cõ-
seruet, compleantur: postea leuius aqua calida fouere: quia primo di-
geri materiam opus est: tum euocari. ergo cerato quoq; liquido id ple-
niter est unguendum: perfricandaq; summa cutis est: laxiusq; id deli-
gandum est. tertio quoq; die soluendum sic, ut remota calida aqua ce-
tera eadem fiant. tantummodo singulæ fasciæ quotiens resolutæ fue-
rint subrahantur.

De fracti humeri curatione.

Baec communia sunt illa propria. siquidem humerus fractus non sic, ut membrum aliud intenditur. sed homo collatur alto sedili: medicus autem humilior aduersus: una fasciā brachium amplexa ex ceruice ipsius, qui laesus est, id su sineat. altera ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum. Tertia iuncto imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capitibus eius inter se iunctis: deinde ab occipitio ipsius minister sub ea fasciā, quam secundo loco posui: correpto si dexter humerus ducendus est dextro: si sinister, sinistro brachio demissum inter femina eius, qui curatur, baculum tenet. nudicus super eam fasciā de qua tertio loco dixi, planā inijcit dextram: si sinister, sinistram, si dexter humerus sumatur. simulque alteram fasciā minister attollit: alteram premit medicus. quod fit ut leniter humerus extendatur: fasciis uero, si medium aut imum os fractum est, breuioribus opus est: si summum, longioribus. ut ab eo sub altera quoque ala perfectus, et scapulas porrigantur. protinus uero brachium cum deligatur, sic inclinandum est, id quod afficit, ut ante fascias quoque sic figurandum sit, ne postea suspensum aliter aliter cum deligabatur, humerum inclinet. brachioque suspensio ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est. per quod fit, ut minime moueatur: ideoque effa sic se habent, ut aliquis composuit. cum ad ferulas uentum est, extrinsecus esse earum longissimae debent, à lacerto breuiores: sed sub ala breuissimae. saepiusque eae resoluendae sunt, ubi in uicinia cubiti humerus fractus est: ne ibi nervi rigeant. et inutile brachium efficiant. quotiens solutae sunt, fractura manu continenda: cubitus aqua calida fouendus, et molli cerato perficiendus: ferulaque uel omnino non imponenda contra eminentia cubiti: uel aliquāto breuiores sunt.

De brachij fracti curatione.

T si brachium fractum est, in primis considerandum est
a alterum os, an utrumque comminutum sit: non quo alia in eiusmodi casu curatio admouenda: sed primum ut ualentius extendatur, si utrumque os fractum est: quia neesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque intendente. deinde ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant: si neutrum alteri auxilio est. nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis, ferulisque est. deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato: siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit: idque inuolutum scutella commodissime excipitur: quae latitudine ipsi brachio perangu

his capitibus collo inijciuntur: atq; ita commode brachium ex ceruice suspendum est. idq; paulum supra cubiti alterius regionē pendere oportet. quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id uinciēdo alienum est. sit enim brachium immobile. ac si nihil aliud quam dolori occursum est, idem qui fuit eius usus est.

De crurum femorumq; fractorum curatione.

IN crure æque ad rem pertinet alterum saltem os integrum manere: commune uero ei femorq; est. quod ubi deligatum est, in canalem coniiciendum est. is canalis & inferiori parte foramina habet: per quæ si quis humor exarserit, descendat: & a planta moram, quæ simul & sustineat eam: et delabi non patiatur: & a lateribus cana, perq; loris datis mora quidem, crus, femurq; ut collocatum est, detineat. esse etiam is debet a planta si crus fractum est, circa popliteum. si femur, usq; ad coxam. si iuxta superius caput femoris sic, ut ipsa quoq; ei coxa sit. neq; tamen ignorari oportet si femur fractum est, fieri breuius: quia nunquam in antiquum statum reuertitur: summisq; digitis postea cruris eius insisti. sed multa tamē femori debilitas est: ubi fortunæ negligentia quoq; accessit.

De fracti digiti curatione.

Digitum satis est ad unum firculum post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; confractos pertinentia.

His proprie ad singula membra pertinentibus, rursus illa cōmunia sunt. primis diebus fames: deinde tum cū iam increscere callū oportet, liberalius alimentum. longa a uino abstinentia: fomentum aquæ calidæ. dū inflammatio est, liberale. cum ea desit, modicum. tum etiam longior ulterioribus et liquido cerato membris, et mollis tamen unctio. neq; protinus exercendū id membrum: sed ad antiquos usus reducendum est. grauius aliquanto est, cum ossis fractura & carnis quoq; uulnus accessit: maximeq; si id musculi femoris, aut humeri senserunt. nam & inflammationes multo grauiores, & propiores caneros habent. ac femur qdem si ossa inter se cesserunt, ferè præcidi necesse est. humerus uero quoq; in periculum uenit: sed facilius conseruatur. quibus periculis etiam magis id expositum: quod iuxta ipsos articulos ictum est. curiosius igitur agendum est: et musculus qdem per mediam plagam transversus præcidendus. sanguis uero, si parū fluxit, mittendus. corpus media extenuandum: ac reliqua qdem

LIBER

membra lentius intendenda: et lenius in his ossa in suam sedem reponenda sunt. his uero neq; intendi nervos, neq; ossa tractari satis expedit. ipsiq; homini permittendum est, ut sic ea collocata habeat: quæ admodum minime lædunt. Omnibus autem his uulneribus imponendum primo linamentum est uino madens: cui rosæ paulum admodum adiectum sit. cætera eadem deligenda fascijs sunt, aliquanto quàm uulnus latioribus, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset. quanto facilius et alienari, et occupari cancro uulnus potest numero potius fasciarum id agendum est: ut laxæ quoq; æque contineant. quod in femore, humeroq; sic fiet, si ossa forte recte concurrerint. sin aliter se habebunt, eatenus circumdari fasciâ debet, ut impositum medicamentum contineat. cætera eadem quæ supra scripsi: faciendâ sunt: præterquam quod neq; ferulus, neq; canalibus, inter quæ uulnus sanescere non potest. sed pluribus tantummodo, et latioribus fascijs opus est: ingerendumq; subinde in eas est calidum oleum, et unum: magisq; in primo, fame utendo uulnus calida aqua fouendum: friguq; omni ratione uitandum: et transeundum ad medicamenta, quæ puri mouendo sunt: maiorq; uulneri quàm ossi cura agenda. ergo quotidie soluendum, nutriendumq; est. inter quæ si quod paruulum fragmentum ossis eminet, id si reuersum est, in suam sedem dandum: si acutū, ante acumen eius longius est præcidendum: si breuius limandum: et utrinq; scalpro limandum. tum ipsum recondendum est. ac si id minus facere non potest, uolsella, quali fabri utuntur, iniicienda est. recte se habenti capiti ab ea parte, qua sima est: ut ea parte qua cebra est, eminent os in suam sedem compellat. si id maius est, membranulisq; cinguntur, sinere oportet ea sub medicamentis resolui: idq; os, ubi iam nudatum est, abscondere: quod maturius scilicet faciendum est: potestq; ea ratione et os coire: et uulnus sanescere. illud suo tempore: hoc prout se habet. nonnunquam etiam in magno uulnere euenit ut fragmenta quædam uelut emoriantur: neq; cum cæteris coeant. quod hic quoq; ex modo fluentis humoris colligitur. quod magis necessarium est, sæpius ulcus soluere, atq; nutrire. sequitur uero in id os per se post aliquot dies excidit: cum tam misera antea conditio uulneris sit. tamen id interdum maius, diutiusq; facies. sepe enim integra cutis, osse alrumpitur: protinusq; prurigo, et dolor oritur. quæ soluere, si accidit, maturius oportet: et fouere aqua per astatem frigida: per hyemem egelida: deinde ceratum myrtum imponere. interdum fractura quibusdam uelut aculeis carnem uexat: quo à prurigo, et punctionibus cognito, aperire id melius, eoq; aculeos præcidere necesse habet. Reliqua uero curatio in utroque hoc casu eadem

est: quæ ubi ictus protinus intulit puro iam ulcere. cibus hic quoque
utendum est carnem producentibus: si breuius adhuc membrum est,
et ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quam leuissimi generis inter
ea demitti debet sic, ut capite paulum supra ulcus emineat: isq; quo-
tidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. tum
paxillus remouendus, uulnus sanandum est: cicatrix inducitur fouenda
frigida aqua est, in qua myrtus, hederæ, aliæ uel similes uerbenæ sint:
illinendumq; medicamentum, quod siccet: et magis etiam hic quie-
scendum, donec id membrum confirmetur. si quando uero ossa non co-
ferbuerunt, quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt: in aperto deinde cura-
tio est: possunt enim coire. si uetustas occupauit, membrum extenden-
dum est, ut aliquid lædatur. ossa inter se manu diuidenda, ut concur-
rendo exasperentur, ut siquid pingue est, eradatur: totumq; id quasi
recens fiat. magna tamen cura habita, ne nervi, musculi uel lædantur.
tunc uino fouendum est, in quo malicorium decoctum sit: imponen-
dumq; id ipsum oui albo mixtum. tertio die resoluendum, fouendūq;
aqua, in qua uerbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. quinto die
idem faciendum, feruleq; circumdandæ. cætera et ante, et post eadē
facienda, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se
ossa conferuere: eoq; et breuius membrum, et indecorum fit: et si
capita acutiora sunt, assidue punctiones sentiuntur. ob quam causam
frangi rursus ossa, et dirigi debent. id hoc modo fit. calida aqua mul-
ta membrum id fouetur: et ex cerato liquido perfricatur: intendi-
turq; et inter hæc medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo ma-
nibus ea diducit: compellitq; id quod eminet in suam sedem. et si pa-
rum ualuit, ab ea parte in qua os se inclinât, inuolutam lanâ regulâ
obiicit. atq; ita deligando assuescere iterum uetustæ sedi cogit. nonnum-
quam autem recte quidem ossa cœperunt. superincreuit uero nimius
callus: ideoq; locus intumuit. quod ubi incidit, diu, leuiterq; id mem-
brum perfricandum est ex oleo, et sale, et nitro: multumq; aqua ca-
lida salsa fouendum: et imponendum malagma quod digerat: astri-
ctiusq; alligandum: oleribusq; et prætere auomitu utendum. per quæ
cum carne callus quoq; extenuatur. confertq; aliqd de sinapi quod cū
ficus in alterum par membrum impositum, donec id paulum erodat,
eoq; euocet materiam. ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordi-
nem uitæ reuertendum est.

De luxatis ossibus.

Cap. XI.

De fractis quidem ossibus hæcenus dictum sit. mouetur autem
ea sedibus suis duobus modis. nā modo quæ iuncta sunt

LIBER

inter se dehiscunt: ut cum latum scapularum os ab humero recedit: & in brachio radius à cubito. & in crure tibia à sura: interdum à saltu: calcis os à talo: quod raro tamen fit. modo articuli suis sedibus excidunt. ante de prioribus dicam. quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus canus est: depressusq; digitus sinum inuenit. deinde grauis inflammatio oritur: atq; in talis præcipua. siquidē febres quoq; & caneros, & nervorum uel distentiones uel rigores, qui caput scapulis annectunt: mouere consuevit. quorum uitandorum causa facienda eadem sunt, quæ in ossibus mollibus læsis aliquid ubi incidit protinus his locis proposita sunt: ut dolor, tumorq; per ea tollantur. nam diducta ossa nunquam rursus inter se iunguntur. & ut aliquid decoris eo loco sit, nihil usus admittitur. maxilla uero & uertebra, oēsque articuli cum ualidis nervis comprehendantur: excidunt aut ui expulsi, aut aliquo casu nervis, uel ruptis uel infirmatis: faciliusq; in pueris & adolescentulis quàm in robustioribus: hiq; elabuntur in priorem, & in exteriorem partem, quidam omnibus modis, quidam certis: suntq; quædam communia omnium signa: quædam propria sunt cuiusq; siquidem semper ea parte tumor est, in qua os prorumpit. ea sinus, à qua recessit. & hæc quidem in omnibus deprehenduntur, alia uero si in singulis. quæ simul atq; de quoq; dicam, proponenda erunt. sed ut excidere omnes articuli non possunt, sic non omnes reponuntur. caput enim nonnunquam compellitur: neq; in spina uertebra, neq; ea maxilla, quæ utraq; parte prolapsa anteq̃ reponeretur, inflammationem mouit. rursus qui nervorum uicio prolapsi sunt, compulsi quoq; in suas sedes iterum excidunt. at quibus in pueritia exciderunt, neq; reposita sunt: minusq; cæteri crescunt. omniumq; quæ loco suo nō sunt: atro ea increfcit: magisq; in proximo membro, q̃ in ulteriore. ut puta si humerus loco suo nō est, maior in eo ipso fit, quàm in brachio: maior in hoc quàm in manus arte. tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior, aut minor usus eius mēbri relinquitur: quoq; in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur. quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendū est. si illa occupauit, dum conquiescat. tunc lacessendum est. ubi finis est, tentandum est in his membris quæ id patiuntur multum autem eò cōfert & corporis, et nervorum habitus. nam si corpus tenue, si humidum est, si nerui infirmi, expeditius os reponitur. sed & primo facilius excidit: & postea minus fideliter continetur. quæ contraria his sunt, melius continēt. sed id quod expulsū est, difficulter admittunt. oportet autem ipsam inflammationem lenare, super succida lana ex aceto imposita. à cibo si ualentioris articuli casus est, triduo: interdum

etiam quinq; diebus abstinere debet. bibere aquā calidā dū sitim finiat. curiosiusq; hæc facere his ossibus motis, quæ ualidis, plenisq; musculis continentur. si uero etiam febris accessu, multo magis deinde ex die quinto fouere aqua calida: remotaq; lana ceratū imponere ex cyprino factum, nitro quoq; adiecto, donec omnis inflammatio finiat. tunc in frictionem ei membro adhibere: citis uti bonus: uti uino modicū: iamq; ad usus quoq; suos id membrum promouere: quia motus ut in dolore pestifer, sic aliās saluberrimus corpori est. hæc cōmunia sunt, nunc de singulis dicam.

De maxillæ luxatæ curatione. Cap. XII.

m Axilla in priorem partem propellitur: sed modo altera parte, modo utraq; si alteram in contrariam partem, modo utraq; ipsa mentumq; inclinatur: dentes paribus non respondent: sed sub his qui secant canini sunt. At si utraq; totum mentum in exteriorem partem promouetur: inferioresq; dentes longius quàm superiores excedunt: intentiq; super muscoli apparent: primo quoq; tempore homo in sedili collocandus est sic, ut minister à posteriore parte caput eius contineat uel sic, ut iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem, & caput eius scorteo puluino duro, eoque caput per ministrum urgeatur, quo sit immobilius. tunc medici digiti pollices limbolis, uel fascijs ne dilabantur inuoluti in os eius coniungendi: cæteri extrinsecus admouendi sunt. ubi uehementer maxilla apprehensa est, si una parte prociat: concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. tunc simul & caput apprehendendum, & exatato mēto maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est sic, ut omnia penè uno momento fiant. si in utraq; parte prolapsa est, eodem omnia facienda, sed æqualiter retro maxilla agenda est. reposito osse si cum dolore oculorum, & ceruicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. cum omnibus uero quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibis conueniat, tum his præcipue, adeo ut sermo quoq; frequenti motu oris per neros lædat.

De capite luxato. Cap. XIII.

e Apud duobus processibus in duos sinus summæ uertebæ demissis super ceruicem contineri in prima parte proposui. hi processus interdū in posteriore partē exadū: quo fit ut neri sub occipino extēdatur: mētū pectori agglutinetur, neq; bibere is,

LIBER

neq; loqui possit: interdum sine uoluntate semen emittit, quibus celerime mors superuenit. ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio eius rei ulla sit, sed ut res inditijs cognoscatur: & non putans sibi medicum de fuisse si qui sic aliquem perdidissent.

De spina luxata. Cap. XIII.

Idem casus manet eos, quorum in spina uertebra exciderit. id enim non potest fieri, nisi ex medulla quæ per medium, & duabus membranulis, quæ per duos à lateribus processus feruntur: & nervis, qui continent ruptis. Excidunt autem & in posteriore partem, & in priorem, & supra septum transversum, et infra. si in utraq; partem exciderit, à posteriore parte uel tumor, uel sinus oritur. si super septum id incidit, manus resolvuntur: nomitus, aut distentio nervorum insequitur: spiritus, difficulter movetur: dolor urget: & aures obtusæ sunt. si sub septo, fœmina resolvuntur: urina supprimitur: interdum etiam sine uoluntate prorupit. ex eiusmodi casibus ut tardius quam ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. nam quod Hippocrates dixit uertebra in exteriorem partem prolapsa, primum hominem collocandum esse, & extendendum: tum calce aliquem super ipsum debere consistere: id intus impellere: in his accipiendum est, quæ paulum excesserunt: non in his, quæ toto loco motæ sunt. nonnunquam enim nervorum imbecillitas efficit, ut quantum non exciderit uertebra, paulum tamen in priorem partem promineat: id non ingulat, sed ab interiore parte non contingit quidem posse: ab exteriore, si propulsum est, plerumq; iterum redit: nisi quod admodum rarum est: uis nervis restituta est.

De humero luxato. Cap. XV.

Humerus autem modo in alam excidit, modo in partem priorem: si in alam delapsus est, et uictus cubitus recedit ab latere, rursum iuxta eiusdem partis aurē cum humero porrigi non potest: longiusq; altero id brachium est. si in priorem partem summum quidem brachium extenditur, minus tamen quam naturaliter, diffialiusq; in priorem partem q̃ in posteriorem cubitus porrigitur. Igitur si in alam humerus excidit, & uel puerile adhuc est corpus, uel molle certe, & imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili: & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput late scapularum ossibus leniter reducat alteri ut brachium extendat, ipsum

dat, ipsum posteriore parte residentem renum sub ala eius coire: si-
mulq; & ille os & altera manus brachium eius ad latus impellere.
At si vastus corpus, nerviue robustiores sunt, necessaria est spatula li-
gnea: & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, longitudine ab
ala ad digitos pervenit. in qua summa capitulum est rotundum &
leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri pos-
sit. in ea bina foramina tribus locis sunt inter se spacio distantibus,
inq; ea lora mollia coniunguntur. eaq; spatha fascia involuta quo mi-
nus tactu lædat ad alam à brachio dirigatur sic, ut caput eius sum-
mæ alæ subijciatur. deinde loris suis ad brachium deligatur: uno lo-
co paulum infra humeri caput, altero paulum supra cubitum, tertio
supra manum. cui rei protinus inter ualla tunc quoq; foraminum
aptata sunt. sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum
trahitur, ita alte ut consistere homo ipse non possit. simulq; in alteram
partem corpus demittitur: in alteram brachium intenditur. eoq; fit
ut capite ligni caput humeri impulsus in suam sedem modo cum so-
no, modo sine hoc compellatur. multas alias esse rationes scire facile
est uno Hippocrate lecto, sed non alia magis usu comprobata est. at
si in priorem partem humerus exadit, supinus homo collocandus est:
fasciaq; aut habena media ala circumdanda est: capitaq; eius post ca-
put hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumq; ut
ille habenam, hic brachium extendat. deinde medicus caput quidem
hominis sinistra debet repellere: dextra uero cubitum cum humero
attollere: & os in suam sedem compellere. faciliusq; id in hoc casu,
quam in priore reuertitur. reposito humero lana alæ subijcienda est.
si interiore parte os fuit, ut ei opponatur. si in priore parte, ut tamen
commodius deligatur: tum fascia primū sub ala obuoluta, caput eius
debet comprehendere: deinde profectus ad alteram alam: ab eaq;
ad scapulas: rursusq; ad eiusdem humeri caput tendere. sæpiusq; ad
eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. uinctus hac ratio-
ne humerus commodius continetur: si adductus ad latus sit. ad id
quoq; fascia deligatur.

De cubiti luxati curatione. Cap. XVI.

IN cubito autem tria coire: ossa humeri, & radij, & cubiti
ipsum ex his, quæ prima parte huius uoluminis posita sunt,
intelligi potuit. sed cubitus qui innexus humero est, ab hoc
exadit. radius qui adiunctus est, interdum trahitur: interdum sub-
sit. in omnes uero quatuor partes exadere cubitus potest. sed si in

Aurelij Cor:

priorem prolapsus est, extensum brachium est: neque recuruatur. si in posteriorem, brachium curuum est, neque extenditur: breuiusque altero est. interdum febrem, uomitumque bilis mouet. si in exteriorem, interiorem uel brachium porrectum est, sed paulum in eam partem a qua os recessit recuruatum, quicquid incidit, reponendi ratio una est. neque in cubito tantum est: sed in omnibus quoque membris longis, quae per articulum longa testa iunguntur. utrumque membrum in diuersas partes extendere donec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout nervi ualent: aut ossa huc, illuc uel sederunt. ac modo manibus solis utendum est: modo quaedam alia adhibenda. ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus: interdum etiam habenis iniectis satis est. deinde rotundum aliquid a lateri parte ponendum est. et super id repente cubitus ad humerum impellendus est. at in alijs casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere: quae fracto cubito supraposita est, et tum ossa reponere. reliqua curatio eadem est, quae in omnibus. celerius tantum et saepius id resoluendum est: multoque magis aqua calida fouendum: diutius ex oleo, et nitro ac sale perfricandum. in cubito enim celerius quam in ullo alio articulo, siue extra remansit, siue intus reuertit, callus arcundatur: usque si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

De manu luxata. Cap. XVII.

Manus quoque in omnis quatuor partes prolabitur: si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium: id est aut ad pollicem, aut ad minimum digitum conuertitur. reponi non difficillime potest. super durum locum et renitentem ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet sic, ut prona sit. si in posteriorem partem os excidit, supina: si in priorem, si in interiorem, exteriorem uel in latus. ubi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. at his, quae in priorem, posteriorem uel partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid: idque supra prominens os manu urgendum est: per quod uis adiecta facilius in suam sedem compellit.

De palma. Cap. XVIII.

In palma quoque ossa interdum suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. in latus enim

moueri paribus offibus oppositis non possunt: signum id solum est, quod omnium commune est. tumor ab ea parte, in quam os uenit: si-
nus ab ea à qua recessit. sed sine intento digito, tantummodo bene pres-
sum os in suam sedem reuertitur.

De digitis. Cap. XIX.

In digitis totidem ferè casus, eademq; signa sunt: quæ in
manibus. sed in his extendendis non æque in opus est, cum
et articuli breviores, et nervi minus ualidi sint. super me-
sam tantummodo intendi debent, qui uel in priorem uel in postero-
rem partem excederunt. tum iam palma compelli: atq; id quod in la-
tus elapsum est, digitis restitui.

De femore. Cap. XX.

Vm de his dixerim: de his quoq; quæ in cruribus sunt, ui-
deri possum dixisse. siquidem etiam in hoc casu quædam
similitudo est femori, et humero, et tibia, et cubito, pedi
et manui: quædam tamen separatim quoq; de his dicenda sunt. femur
in omnes quatuor partes promouetur, sæpius in interiorem, deinde
in exteriorem, raro admodum in priorem, aut posteriorem. si in in-
teriorem partem prolapsum est crus, longius altero, et uisius est. ex-
tra enim pes ultimus spectat. si in exteriorem, breuius, et arctius fit,
et intus inclinatur. Calx ingressu terræ non contingit, sed plura ma-
meliusq; id crus superius corpus quam in priore casu fert, minusq;
baculo eget. si in priorem crus extensum est, implicariq; non potest, al-
teri cruri ad calcem par est sed in planta minus in priorem par-
tem inclinatur: dolorq; in hoc casu præcipuus est: et maxime uri-
na supprimitur. ubi cum dolore inflammatio quieuit, non mode in-
greduntur totusq; eorum pes est. sed et si in posteriorem extendi
non potest crus, breuiusq; est, ubi consistit: calx quoque terram non
contingit. Magnum autem femori periculum est, ne uel difficulter re-
ponatur: uel repositum rursus exadat. quidam iterum semper exci-
dere contendunt. sed Hippocrates, et Diocles, et Philotimus, et Ni-
leus, et Heraclides Tarentinus, clari admodum authores, ex toto se
restituisse numoriæ prodiderunt. neque tot genera machinameto-
rum quoque ad extendendum in hoc casu femur Hippocrates, An-
dreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoque
quidam repperissent, si id frustra esset. sed ut hæc falsa opinio est:
sic illud uerum est. cum ibi ualentissimi nervi, musculiq; sint,
si suum robur habent, uix admittere: si non habent, pericula

LIBER

non contineri. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi. si ualidius, melius adducunt, qui easdem habenas ad ualida bacula deligunt: tumq; eorum fustium in eas partes oppositæ mire obiecerint: superioresq; ad se utraq; manus traxerint: etiamnum ualentius intenditur membrum super scannū, cui ab utraq; parte axes sunt: ad quos habenæ illæ deligantur. qui ut in torcularibus conuersi, rūpere quoq; si quis perseuerauerit: non solum extendere nervos, & musculos possunt. collocandus autem homo super id scannum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus sic, ut semp ea pars superior sit, in quam os prolapsū est: ea etiam inferior, à qua recessit. nervis extensis si in priorem os uenit, rotundum aliquid super inguen ponendum subitoq; super id genu adducendum est eodem modo, eademq; de causa, quæ idē in brachio fit: protinusq; si complicari femur potest, intus est. In cæteris uero casibus, ubi ossa per uim paulum inter se recesserunt, medicus debet id quod eminet retro cogere: minister contra inde coxā propellere. posito osse nihil aliud noui curatio requirit, quàm ut diutius his in lecto detineatur: ne si motum adhuc nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

De genu. Cap. XXI.

g Enu uero & in anteriorem, & in posteriorem, & in posteriorem partem excidere notissimum est: in priorē nō prolabi pleriq; scripserunt. potestq; id uero proximum esse, cū inde opposita patella, ipsa quoq; caput tibiæ contineat. Meget tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memoriæ prodidit. in his casibus intendi nervi rationibus hisdem, quas in femore retuli possunt. & id quidem quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo sup poplitem impoſito, adductoq; eo crure, reconditur. cætera uero manibus simul tum ossa in diuersas partes compelluntur.

De talo. Cap. XXII.

e Alus in omnes partes prolabitur ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in anteriorem partem conuertitur. ubi huic contrarius talus contrarium etiam signum extat. si in priorem partem erumpit à posteriore, latus nervus durus, & insanus est: minusq; is opus est. si in posteriorem lanx penē conditur, plaga maior fit. Reponitur autem his quoq; per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. & in hoc quoq; casu diutius in lectulo perseuerandum

perseuerandum est: ne his talus qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis ferendo oneri cedat: rursusq; prorumpat. calciamen-
tis quoq; humilioribus primo tempore utendum, ne iunctura talum
ipsum ledat.

De planta. Cap. XXIII.

Plantæ ossa hisdē modis quibus in manu prodeunt, his, his-
demq; conduntur. fascia tantumodo calcem quoq; debet com-
prehendere: ne cum mediam plantam, immumq; eius uinciri
necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat:
ideoq; suppuret.

De digitis. Cap. XXIII.

In digitis nihil ultra fieri debet: q̄ quod in his, qui sunt in
manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius,
aut summus canaliculo aliquo contineri. hæc facienda sunt
in his casibus ubi sine vulnere ossa exciderunt. hic quoq; & ingens
periculum est: & eo grauius quo maius membrum est: quo ue ualidio-
ribus nervis, aut musculus continetur. ideoq; humerus, femoribusq; ma-
ius mortis est: ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis ta-
men, nonnullum periculum est. eoq; maior in utroq; timor est, quo
propius uulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse: præ-
ter digitos, & plantas, et manus dixit. atq; in his quoq; diligenter ef-
se agendum, ne precipitent. Quidā brachia quoq; & crura repo-
suerunt: & ne cancri, distentionesq; neruorum orirentur, sub quibus
in eiusmodi casu fieret mors matura: sanguinem ex brachio mise-
runt. uerum ne digitus quidem, in quo minimum ut malum, sic etiā
periculum est, reponi debet ante inflammationem: aut postea cum iā
uetus res est. si quoq; reposito osse nervi distenduntur, rursus id proti-
nus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum uulnere loco
motum, neq; repositum est: sic iacere conuenit, ut maxime cubantem
iniyat, tantum ne moveatur: ne ue depēdeat. in omniq; tali morbo ma-
gnū ex longā fame præsidium est. deinde ex curatione eadem que
proposita est ubi ossibus fractis uulnus accessit: si nudum os eminet,
impedimento semper futurum est. id quod excedit, absidendum est:
imponendaq; super arida linamenta sunt, & medicamenta non pri-
guia, donec quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest, ueniat. nam &
debilitas sequitur: & tenuis cicatrix induatur: quæ necesse est, facile
noxæ postea pateat.

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Tay
depe
Huc
Firm
Mem
Vi se
Prim

B
Tum
vel
vntia
Tuleia
Ami
Caut
Indu
Sps
Prop
Prof
Si no
Sape
Sama
Si pri

P
Allia
Indue
Allia
Tritu

E S
Cany

P Hoebe salutiferum quod pangimus asserere carmen:
Inuentumq; tuum prompto comitare favore.
Tuq; potens artis, reduces qui tradere uitæ
Nosti: atq; in cælum manes reuocare sepultos.
Qui colis ægæū, qui pergama, quiq; epidaurum:
Qui quondam placida tectus sub pelle draconis

Tarpeias arces, atq; incluta templa petisti
Depellens tetros præsentî numine morbos
Huc ades: & quicquid cupido mihi sæpe rogatus
Firmasti, cunctum teneris expone papyris.
Membrorum series certo deducta tenore
Vt stet, & assimilis medicinae defluat ordo:
Principio celsa de corporis arce loquamur.

Capiti medendo.

BALSAMA si geminis instillans auribus addas,
Tum poteris alacrem capitis reparare vigorem.
Vel quæ septenis censentur gramina nodis
Vtiliter nectes: uel corno ex arbore sertum,
Euleium'ue potens una super aure locabis.
Aut illud mixto coctum clementer aceto
Cautè nare trahes: seu uisco lintea nexo
Induces fronti: seu trita gramina mentæ.
Spongia cum tepidis annexa liquoribus imbris
Profruit: aut hedera ex oleo decocta uetusto.
Profruit: aut cochleis frontem tractare minutis.
Si nocuit cerebro uiolentia solis aperto
Sæpe chelidonia ex acido perducta liquore
Sanauit: profunt & amica papauera somno.
Si prius in lento madesacta terantur oliuo.

Hemicraneo medendo.

PORTIO si capitis morbo tentetur acuto
Allia diuersam lana contexta per aurem
Inducta profunt: & eodem balsama pacto.
Allia uel ternis piperis terna addita granis
Trita limes: certam dabit hæc tibi cura salutem.

Porrigini depellendæ.

EST insensibilis morbus, sed noxius formæ
Cum caput immensa pexum porrigine ningit,

Q. SERENUS.

Q. SERENI

Copia farris uti frendentibus edita saxis:
Hanc poterit malve radix decocta levare.
Aut tu foeniculum, nitrumq; et sulphura viva
Contere. deinde caput permixtis ablue cunctis:
Furfuribus ne novis durum miscebis acetum,
Ut varios crines tali des unguine puros.
Prodest et tarda demptus testudine sanguis:
Et prodest cedro demissus ab arbore succus.
Desinet interea glomerari farrea nubes:
Cessabitq; grauis crebrae porriginis imber.

Capillo tingendo.

QV O S pudet ætatis longæ, quos sanctæ senectus
Offendit: cupiunt properos abscondere canos:
Et nigrum crinem fūco simulare dolo.
His prodest acri contrita cupressus aceto,
Vel frons lentis, vel tristia poma sabuci:
Lumbrici quoq; terrestres miscentur olivo:
Et iuvenem præstant rediuvino flore capillum.
Præterea niuem poterit depellere crinem
Rhesina ex facili cæra, viscoq; coacta:
Ad rutilam speciem nigros flavescere crines
Vngento cineris prædixit Tullius auctor.
Si prægnans artus captivi sororis edit,
Dicuntur fœtus nigrantia lumina fingi.
Phthiriasi arcendæ.

NOXIA corporibus quædam de corpore nostro
Progeniit natura uolens abrumperè somnos
Sensibus: et monitis uigiles intendere curas.
Sed quis non paveat pherecidis fata tragoedi,
Qui nimio sudore fluens animalia tetra
Eduxit: turpi miserum quæ morte tulerunt.
Sylla quoq; infelix tuli languore peresus
Corruit: et fædo se uidit ab agmine uinct.
Sæpius ergo decet mordax haurire sinapi:
Vel nitro, ac sale permixtis, acidoq; liquore
Laxatis, ut sint simul allia tangere corpus:
Aut lachrymis hederæ, aut succo perducere cedri.
Quin etiam furfur mixto medicatur aceto.
Vnda maris lentes capiti deducit iniquas:
Et quicquid crebri defendit silua capilli.

Prurigni,

Prurigni, papulis, & scabiei arcendis.

ILL OTVS sudor, uel copia nobilis escæ
Sæpe graui scabie correptos asperat artus.
Ergo lutum prodest membris adhibere frictis:
Quod facit ex asino siccatus corporis humor.
Nec pudeat tractare finum quem bucula fudit.
Stercoris ex porcæ cinerem confundito lymphis:
Sic pauidum corpus dextra parcente foueto.
Proderit ex oleo pulvis, quem congerit alte
Dulcibus ex latebris patiens formica laborum.
Conuenit hinc tepido liti tradere corpora soli.
Feruantes papulas oleo curato liquenti:
Aut acido baccho miscbis farra lupini:
Atq; hinc in calido percurres membra lauacro.
Pruritus autem salios lenat humor aceti:
Siue mari laudus sudor, cochleæq; minutæ:
Quarum contactu perimetur acerbæ libido.

Frenesi, ac capiti purgando.

EX uitio cerebri frenesis furiosa mouetur,
Amisissaq; refert frendens amentia uires:
Siue calens febris iactatos exedit artus:
Siue meri gustus, seu frigoris efficit aura.
Conuenit hic calidis pecudum pulmonibus apte
Tempora languentis medicæ redimire corona.
Illotis etiam lanus suffire memento:
Ceritum sæpe horrendi nudicantur odores:
Atq; ideo insanos etiam curarier est par.
Purgatur cerebrum mansa radice pyretri.
Vngitur & suavis, dederit quos parua sabucus,
Expressusq; hederæ mandatur naribus humor.
Aut mixtum rutæ crebro instillatur acetum.
Non semper præsens dolor est sanabilis: ergo
Cura magis prodest uenturis obuia morbis.

Fluori capillorum, & maculis capitis tollendis.

DEFLVIT expulsus morbo latitante capillus
Si raro lauitur: seu uis epotæ ucnem est:
Seu salamandra potens, nullisq; obnoxia flammis
Eximium capitis tactu deiecit honorem.
Nonnunq; uariant maculæ: paruisq; parumper
Orbis aspersum ducit noua uulnera tempus.

u ij

Q. SERENI

Vipereæ pellis cineres his addito rebus,
Roboreasue pilas, ursino'ue ungitio seuo:
Vel testudineo magis permulcto cruore.

Frigori sedando.

SAEPE ita peruadit uis frigoris, ac tenet artus,
Vt uix quæsito medicamine pulsa recedat.
Si ranam ex oleo decoxeris, abijce carnem:
Vugine membra foue: parili ratione ualebit
Vrticæ semen: perceptisq; frigora uincet:
Et ceruina potest mulcere medulla rigorem.
Decoctum raphani semen cum melle uorabis:
Sive fel ursinum tepesacta dilue lymphæ
Proderit hoc potu: seu cassis ostrea testis
Vsta dabit cinerem: qui pro sale sumptus in escis,
Decutiet gelidum tepesacto uertice uirus.
Nonnullus liquidum summit, mulsumq; sinapiq;
Atq; palato agitat pariter, retinensq; mouensq;
Allia nonnulli mandunt: olei'ue liquore
Perfundunt calido cerebrum, nasiq; latebras.
Quidam lactucæ credunt prodesse sapes.
Curandi modus hic et suauis, et utilis idem est.

Elephantiasis propellendæ.

EST Elephas morbus tristis quoq; nomine dirus,
Non solum turpans infandis ora papillis,
Sed atq; præcipitans funesto fata ueneno.
Huic erit aduersus cedri de cortice succus,
Mustellæq; cinis: uel fusus sanguis ab illa.
Nonnulli dixerunt serum, prodesse bibendo.
Mentastri folium potu, apposituq; salubre est.
Nec frustra bulbos, et sulphura iungis aceto,
Qui cupis horribiles ad pristina reddere uultus.
Prætere a nitrum debes cum melle iugatum
Spargere lacte bonis: uarias sic ungere frontes.
Cerusam, et chartam, quam gens ægyptia mittit
Thure simul misce atq; oleo, quod flore rosarum
Conditum est: line sic faciem, sic redde salutem.

Cutis, et faciei uitij propellendis.

INUIDA si maculet faciem lentigo decoram,
Nec prodesse ualent naturæ dona benignæ,
Eruam, atq; acidum laticem simul illine malis.

Proderit

Proderit & bulbus mellis dulcedine victus,
 Cruda ne dulcicido miscetur cepa liquor:
 Sanguine vel leporis morbus delebitur oris.
 Frons salicis cum flore suo contrita modetur.
 Sapiolæ cineres ex ossibus omnia tollunt.
 Cygneos adipēs hilari misceto lyæo:
 Omne malum propere maculoso ex ore fugabis.
 Horrebit si linor atrox, aut nigra cicatrix,
 Attrito sapone genas purgare memento.
 Rugarum sulcos lentisci mastice tendes.
 Si uero uitium est, quod ducat ab impete nomen
 Hoc matutina poteris cohibere salina:
 Seu folio platani, quod mansum mane domabis.
 Fœda fluunt curui quæ purgamenta cameli
 Vrentur, cineremq; dabunt: iungentur aceto
 Mascula ihura simul: diuinaq; cura nalebit.

Aurium uitij succurrendis.

CVM scæuus teneras dolor alte sauciat aures,
 Fraxinea in flammis fundit, quem talea suatum
 Infilles: siue obscænos ex uirgine rores:
 Aut suatum ex folio dederit, quem populus alba.
 Sæpe chelidoniæ rabidum sociatur acetum,
 Adiunctoq; nitro procedit cura salubris.
 Mentastri liquor expressus conducere fertur.
 Infectum uiolis oleum bene consulit auri.
 Annosa rubros si legeris arborē uermes
 Ex oleo tere: sic tepidos infunde dolenti.
 Si uero obstrusa sensus morietur in aure,
 Lumbricos terræ, scæuumq; ex anseris raucis
 Excoque: sic ueterem poteris depellere morbum.
 Felq; bouis surdis etiam prodesse loquuntur:
 Si iungas olidæ graue quod nānxere capellæ.
 Si uero in autas animal penetrauerit aures
 Proderit admixto pauidi fel muris aceto.
 At si lymphæ nocens peruasērit: anseris aptus
 Immittetur adeps ceparum non sine succo.
 Qui grauis est oculis sensum tamen auribus auget.
 Vis & phœbigenæ diuinam discere curam:
 Sicq; uel annosis confecta doloribus auris:
 Allia tum septem numero, septemq; lupinos

Q. Serenus.

¶ iij

Q. SERENI

Cretaceam dabis in testam: tum delphici frondis
Addatur: mixto totum feruescat aceto:
Doctus eris tepidos illinc immittere rores.

Oculorum dolori mitigando.

SUMMA boni est, alacres homini contingere uisus.
Quos quasi custodes, defensoresq; pericli
Prospiciens summa natura locauit in arce:
Sic tamen ut nullos paterentur desuper ictus:
Atq; supercilio pauidi tegerentur opaco.
Sed dolor immeritum lumen si forte laessit,
Lana madens oleo noctu connectitur apte,
Viuentis ue nepae lumen gestatur amicum:
Ex folio caulis cineres, confractaq; thura,
Et laticem bacchi factae cum lacte capellae
Desuper inducas: atq; una nocte probabis.
Hyblei mellis suca cum felle caprino
Subueniunt oculis dira caligine pressis.
Vettonicae mansus siabit lumina sucus.
Si tenebras oculis obducit pigra senectus
Expressae marathro guttae cum melle liquenti
Detergere malum poterunt: uel uulturis atri
Fella, chelidoniae fuerint quis gramina mixta:
Haec etiam annosis poterunt succurrere morbis.
Fel quoq; de gallo mollium simplice lymphe
Exacuet pueros dempta caligine uisus.
Sine columbarum finus admiscetur aceto:
Sed fel perditis parili cum pondere mellis:
Vina chelidoniae simili ratione iungantur,
Efficiuntq; suo praeclaros unguine uisus.
Aspera quinetiam mulcent, et rupta reducunt.
Si genus est morbi miserum quod lumen adurit,
Hic calor infuso miscetur lacte canino:
Anguib; ereptos adipem ærugine misce:
Hi poterunt ruptis oculorum iungere partes.
Si uero horrendum ducent glaucomata peplum:
Spiritus alterius prodest: qui grana cumini
Pallentis madens uisus exalat in ipsos.
Si tumor infestat, rufos et gliscit in orbes,
Turgentibus oculis nili circumline cæno.

Dentium

Dentium vitio, & oris fautori medendo.

HAUD facile est acrem dentis tolerare dolorem:
 Quo magis est æquum medicam pernoscere curam:
 Cum baccho violas decoxeris, ore teneto.
 Mansus item prodest succis oleaster acerbis.
 Hinc obsædo fugit: linguae quoq; vulnera cedunt.
 Cum uino piper, & uirum tepido inde dolenti.
 Sæpe chelidonia succo, uel lacte capellæ
 Sanescunt dentes: aut tauri felle iuuantur.
 Aut acidi latices clauso uoluntur in ore
 Manditur apta rubus gingiuus, & bona labris
 Lentiscus, myrtusq; emendant oris odorem.
 Quod uero assumpsit nomen de dente fricando
 Cernuino ex cornu cinis est: aut ungula porcæ
 Torrida: uel cinis ex ouis, sed non sine uitro:
 Muricis aut tosti: uel bulbi extincta fauilla:
 Ambitiosa putas: sunt ista salubria cunctis.
 Exesos autem dentes si forte quereris,
 Vre finum muris, patulisq; & hiantibus adde.
 Vel anerem dentis cernuini extinguere aceto
 Conuenit: atq; canis immittere partibus apte.
 Prodest & puluis lumbrici corpore tosto.
 Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.
 Sæpe etiam gelida gingiuas collue lymphæ:
 Dentibus ut firmum possis seruare uigorem.
 Si uero infandum proserpit ad intima uulnus,
 Permiscto salem parili cum pondere iuris:
 Hinc tractato locum: miram experiere medellam.
 Aut tu sume pilam, quæ caudis hæret ouinis:
 Hæc siata dabit molles, & fracta firinas.
 Huius & attritu terrum mulcebitur ulcus.

Vnae faucibus, & quæ mollienda sunt medendis.

EGRESCVNT teneræ fauces, cum frigoris atri
 Vis subijt: uel cum uentis agitatilis aër
 Vertitur: atq; ipsas flatus grauis inficit undas:
 Vel rabidus clamor fracto cum forte sonore
 Planum radit iter: sic est Hortensius olim
 Absumptus: causis etenim confectus agendis
 Obtinuit: cum nox domino uiuente periret:
 Et nondum extincti moretur lingua disertæ.

u iij

Q. SERENI

Ergo omni studio quæres inhibere dolorem:
 Simplicibus lymphis confunditur aerium mel:
 Additur excussus nuxea similagine fursur:
 Decocta hæc clauso simul exercentur in ore.
 Præterea fauces extrinsecus ungere prodest
 Vrsino & tauri seuo, cærisq; remissis:
 Omnia quæ geminis æquabis lancibus ante.
 Disce etiam miram ex humili medicamine curam:
 Aethæo melli iungas agreste papauer,
 Decoctumq; simul mandes, mansumq; uorabis.
 Crinitæ porri radices quinq; coquantur:
 Hinc aqua non feruens uoluatur fauce sonora:
 Nec tamen in sto machum descendat gutta patentem.
 Si uero afflictam langor deiecerit unam,
 Tunc horas aliquot pronus recubare memento:
 Aut illam puluis tosti releuabit aneti,
 Aut cinis ex cochlea: uel torrida brassica flammis.
 Verum angina sibi mistum sale poscit acetum.
 Quod prodest clauso uersatum agitare palato.

De rigore ceruicis.

AT SI ceruices, duratæq; colla rigebunt,
 Mira loquar: geminus mulcebitur unguine poples:
 Hinc longos pariter nervos medicina sequetur:
 Anseris aut pingui torpentia colla fouebis:
 Illitur & ualido multum lens cocta in aceto
 Aut capræ fimus & bubuli, aut ceruina medula
 Hoc etiam immotos flectes medicamine nervos.
 Quos autem uocitant colles attingere dextra
 Debebis, qua Gallus erit pressante peremptus.

Tussi, & coleribus medendis.

NOXIA si penitus colerum sanire uenena
 Perspicias, cocta lactucæ fronde leuabis.
 Proderit & caules assumere sæpe madentes.
 Interdum fauces tussi quatiuntur atroci:
 Allia tum sumes & cocta, & melle peruncta:
 Semina uel raphani permixto dulcia melle:
 Aut si fraxinea semen de fronde renellis:
 Interiora uora, uentus contingere dente.
 Ouum melle teres, domitum feruentibus undis,
 Marrubium uel potens: hæc faucibus optima sumes,

Frenabisq;

Frenabisq; grauem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho.

QVI stomachum regem totius corporis esse
 Contendunt, uera niti ratione uidentur.
 Huius enim ualidus firmat tenor omnia membra:
 At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.
 Quin etiam nisi cura iuuat, uitare cerebrum
 Fertur, & integros illinc auertere sensus.
 Lactuce semen nigrae, quod lignea pila
 Triuerit: admixto ieiunus sumito melle.
 Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit uno:
 Aut tritum semen raphani, mulsumq; iuuabit:
 Siue duae partes absinthii, ac tertia rutae
 Decoctis potantur aquis, siliquaesq; madentes:
 Semina uel marathri foetae cum lacte capellae:
 Pulegium quoq; decoctum curabit amice:
 Et potu, & fotu stomacho conducit anetum:
 Seu cochleas undis calefactas, ac propè iunctas
 Suppositis torrens prunis: uinoq; geroq;
 Persusas cape: sed prodest magis esse marinas.
 At male digestis si crapula saeuierit escis,
 Ex pipere, & calida florem de rore marino
 Ebibe: seu salibus piper adde, & tenue cuminum:
 Quae coctis tanges epulis, ac raptu uorabis:
 Aut cubitum pergens suauem cape tristis aneti.
 Ventrículum Mergi sale iacto contere nalde
 Tosto pane super piperis quae puluere multo
 Miscantur: capies diuinum munus in istis.
 Grana peregrini piperis diffundito quinq;
 Niliaco melli: quae mane inserta capeffer.
 Proderit hoc stomacho, uictas & conquoquet escas:
 Felli uomitu, uel phthisi arcendis.

LVTEA si crescunt, praecunctis noxia fella:
 Allia parua nouem, piperis tot permole grana:
 Quae cyatho diluta gari mandesq; bibesq;
 Haec iterum septena capis post deniq; quina.
 Praeterea caulem, frondet si parua sabucus,
 Decocto sale permisceas: ac iungis oliuo:
 Tunc capis, ac tali auxilio fella horrida purgas.
 Profunt & pelagi latices, quos pondere iusto

Q. SERENI

Dulcibus affocias lymphis, melliq; liquenti:
Et niueus prodest ex ubere succus asellæ:
Si tepido uino infundas, ac mella, piperq;
At uomitum radix narossi pota mouebit.
Si uero phthisis annoso sedet improba morbo,
Inuitas uino cochleas hausisse inuabit.
Proderit & ueteris seni pila sumpta suilli:
Quæ capulas quoq; producit medicina salubris.

Mammis sanandis, uel stringendis.

VBERA facundo multum lactantia succo
Sæpe sibi noxæ nimium manando fuerunt.
Fecit igitur ualida duri reprimuntur aceti.
Post partum tumidas iniuste assurgere mammas
Interdum aspicias: harum mala commemoratur
Maurinus finis ex pluuio sedare liquore.
Sic autem clausas penitus dolor angit acerbus,
Lumbricis terræ turgentes unge corymbos.
Si castigatas studium est præstare papillas,
Ex hederæ fertis ambas redimere memento:
Protinus, & raptas flammis mandare coronas:
Anseris aut seuum pariter cum lacte tepente:
Aut ouum illinito tulerit quod garrula perdix.
Præterea pluuio decoctæ papauera rore
Hærescant multis post absoluenda diebus.
Vis & phæbigenæ cœlestia sumere dona,
Vbera cum tetris laniata doloribus horrent:
Nauis ramentum, & quæ nomine præssion herba est:
Et quæ uulgari sermone insana uocatur:
Græcus ὀκυνία, propria scit dicere lingua:
Necnon & calami radix, lapathiq; legumen
Mixta dabunt miras experto crede medelas.

Reiectioni cibi, aut sanguinis abstinendæ.

SI stomachus nondum concitatus expuit escas,
Sed magis atq; magis uitium renouando ualefcit:
Allia cedemus, crebrumq; trahemus odorem.
Sic etiam rutilus fertur de pectore sanguis,
Sorbitum mentæ, raphanus uel ætha inuabit.
Sæpe lapis teritur: specularem nomine dicunt:
Et mixtis hauritur aquis: sistiq; eruoem.
Vritur interdum raptus de subere cortex:

Et cinis ex calido prodest epota lyæo.
 Quorum cinis, aut coclearum, aut deniq; pellis.
 Aut cinis è salicum ramis prodesse putatur:
 Aut platani pilulas acri infundemus aceto:
 Nullus erit sanguis, quem non abus iste moretur.
 Iecoris, & lateris utriusq; medendis.
 SI mollis iecoris fibras dolor hauriet acer,
 Protinus ex mulsâ potanda eleliphæos herba est:
 Sumitur & semen: quod fraxinus alta profudit:
 Vulturis atq; iecur: uel ius perdiæ apricæ.
 Præterea simili dragma pix dura, piperq;
 Franzuntur: sic in mollito puluere iuncta
 Egelidis miscentur aquis: recreantq; bibentem.
 Abscânhi quoq; decocti potabitur humor.
 Si latus immeritum morbo tentatur acuto,
 Accensum extingues lapidem stridentibus undis:
 Hinc bibis: aut aceris radicem tundis, & unâ
 Cum uino capis: hoc præsens medicamen habetur.
 Quid referam multis composita philonia rebus:
 Quid loquar antidotum? uanus quis ista requirat?
 At nos pauperibus præcepta feramus amica.
 Necnon & iecoris quaeretur fibra lupini:
 Iungenturq; simul costum, poliumq; piperq;
 Quæ diluta mero dantur potanda lyæo.
 Est & uis morbi, quod telum commemoratur:
 Cum subito dolor insanus furit incitus ictu:
 Persicus huic potum è nucleo dabit interiore:
 Quæ mihi cura satis casu monstrante probata est.
 spleni curando.

QUANDO lyen tumido circumligat ilia uinclo,
 Et plenum splenis demonstrant membra rigorem,
 Mollibus ex hederâ tornantur pocula lignis:
 Hinc trahet assuetos æger quoscunq; liquores:
 Aut uiridis coctorum olerum potabitur unda.
 Proderit exucto fluminalis hirudo cruore:
 Sive miria potens seu ros cum pane marinus:
 Aut hederæ succus potu, appositusq; inuabit.
 Necnon intactam ferro, quam uideris alnum,
 Huic liber eripitur, ferro sine decoquiturq;
 Donec uiscerum pars tertia subsit aquarum.

Q. SERENI

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.
 Nonnulli memorant consumi posse lienem,
 Erunt si semper ieiuno sumpserit ore.
 Arida ficus item feruente domatur aceto:
 Et trita illinitur: uel splen apponitur hædi.
 Marrubium in uino potum prodesse loquuntur.
 Præterea piper, ac nepete cum flore, et anethum,
 Capparis, atq; Apium, buglossaq; iungitur una:
 Horum decoctos latices potare salubre est.
 Puleium, abrotanum nitida cum mastice coctum,
 Ac thymbræ speciem, quam commemorant cephaloten:
 Prædixit spleni deus idem posse mederi.
 Dulcia Plautus ait grandi minus apta lien:
 Splen tumidus nocet: et risum tamen addit ineptum:
 Ut mihi sardois uideatur proximus herbis:
 Irrita quæ miseris permiscet gaudia fati.
 Diatur exectus faciles auferre cachinos,
 Perpetuoq; æuo frontem præstare seueram.

Præcordijs sanandis.

LANGUIDA si duro turgent præcordia morbo,
 Misceatur mulse farri sextarius unus:
 Necnon et lini tunsum, siliquæq; legumen:
 Hæc decocta simul, nondumq; tepentia nectis:
 Aut quæ poma cydon creteis misit ab oris
 Cocta lines: durum ut possis mollire tumorem:
 Oïma præterea, bulbuæ linuntur amari.
 Proderit et lymphis corpus mersare marinis.
 Quin etiam catulum lactantem apponere membris
 Conuenit: atq; malum transcurrere fertur in illum:
 Cui tamen extincto manus debetur humandi.
 Ne iunctus uitium ducat de coniuge coniunx.
 Quod superest styraci iunges ramenta carinæ.
 Quodq; decem ex rebus deattartyma rite uocatur.
 Mastice addentur cum puluere mollia farra:
 Talibus auxilijs præcordia tuta resident.

Lumbis, et renibus sanandis.

CUM seuit penitus hærens iniuria lumbis,
 Igne lapis candens datur exultantibus undis:
 Hoc poteris potu tristem superare dolorem.
 Aut pice cum molli nitrum, sulphurq; et acetum

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.
Proderit hanc ægris erebro perducere membris.
Aut caput asparagi cum uino sume uetusto:
Seu maior appone: modus conducit uterque.
Aut adipi mixtum lumbis inducto sulphur:
Sæpe chelidoniam cum succo palladis addes,
Farrâq; quæ tremulis prosunt sudantia flammis.
Fertur amygdalinæ succus natis esse bibendus:
Pinfitur, & tepidis sorbebitur addita lymphis.
Aut tres ex uino cochleas feruescere coger:
Cumq; suis domibus franges, piperis quoq; grana
Ter quinq; adijcies: potuq; inuaberis illo.
Fursur item parca fuerit cum feruidus unda,
Post oleo madidus succis immittitur aptis:
Quæ uix passuris urentia iungito membris.
Prodest ceruinæ medicinis natura medullæ.
Nec nocuit ciceris cocti potasse liquorem:
Aut mistam teneris mandisse lilis fæta maluis:
Contritumq; simul cum mastice confer anetum.
Quodq; decem rebus componi ex nomine clarum est:
His contingit locum. deus hæc mihi certa probauit.
Ventriculi dolori mitigando.

SI DOLOR insanus tota desecuit in aluo,
Heministibus in lymphæ ualidam quoque rutam,
Aut apium: donec pars duplex desit aquarum.
Potus erit medicus non detrectante palato.
Præterea nunci sterilis testa uritur oui,
Quæ postquam in tetram fuerit conuersa farinam,
Ex calidis potatur aquis: & pota medetur.
Necnon iungenda est utero noua uirga miricæ
Illesæ hæc ferro, terrâq; intacta geratur:
Aut medio uentris prodest aspergere terram:
Quam signauerunt uestigia pressa rotarum.
Proderit & puluis facili sub cardine raptus.
Quin etiam & lymphis coctum potare cuminum
Conueniet, quod iam nobis documenta probarunt.
Menta quoque hoc pacto medicos dabit hausta sapes.
Cæliacos autem recreabis pane salubri,
Quem madido farre efficies, ac mollibus onis:
Quorum testa fero prius euanescet aceto.

Q. SERENI

Refert & teretes bulbos mollire terendo:
Cumq; his lenei clarum potare fluentum.

Hydropisi depellendæ.

CORRUPTI icoris uitio, uel splenis acervo
Crescit hydrops: aut cum siccata febre medullæ,
Atq; auidæ fances gelidum traxere liquorem.
Tum lymphæ intercus uitio gliscente tumescit,
Secernens miseram proprio de uiscere pellem.
Conueniet teneræ radix decocta sabuci
In geminis calidi cyathis potanda lyæi.
Fraxineum semen cum bacchi rore bibendum est.
Aut calido filicis radicem mollit iaccho,
Qui subito raptos uentos, sucosq; reuellit.
Nec non apposito curantur dropace membra:
Vngvine quo frangit uirus langoris aquosi.
Necnon in tepidis conuolues corpus arenis.
Apposituq; leues Nepetæ, gustuq; innabunt.
Sæpe & scyllino pelluntur noxia baccho.
Helleboro bene purgatur lymphaticus error.
Aut huius uicæ quod fert semen lenta genista
Miscetur: mulsis coctusq; educitur undis.
Est qui præualidum nitro sale miscet acetum:
Atq; olei suco refricat turgentia membra.

Ventri molliendo.

SÆPE cibi specie, uitio uel corporis ipso
Potibus, aut duris restricta morabitur aluus.
Vincetur talis mora gramine mercuriali,
Cuius aquam cocti minimo cum melle bibemus.
Prunæq; conueniunt quæ mittit clara Damascus.
Multos præterea medici componere sucos
Assuerunt: preciosa tamen cum ueneris emptum
Falleris: frustra q; immensa nomisinata fundes.
Quin agge, & in tenui certam cognosce salutem.
Aut igitur tectum lana supponis alumen:
Aut edis in patinis teneræ decocta saluci:
Vel salsum mulsam capræ cum lacte capeffis.
Crede tamen potum meliorem lactis equini:
Dicitur & ualidos asinæ lac uincere sucos.
Syluestris fici lachrymam prodesse loquuntur:
Quodq; satis melius uerbis dicemus Horati.

» Mitulus & uiles pellent obstantia conchæ:
 » Sed choclas prius urtica, aut fursure pasci
 » Purior hinc gustus noxa sine mouerit alium.
 Sæpe thalassomeli iunctum cumulauimus hymbri.
 Hæc purgant parili fuerint si pondere mixta.
 Solutioni uentris, & dysenteriae compeſcendæ.

T A M uarij casus mortalia sæcla fatigant
 Ut sine diuersis obnoxia corpora morbis.
 Sæpe etenim nimio cursu fuit impetus alui:
 Frenat commixto cum feruet brassica uino:
 Aut cerasi uictum longo iam tempore pomum.
 Suas amineæ uitis cum pane medetur:
 Mel bene permixtum calido potatur aceto.
 Vile quidem facili factum, tamen utile opinor,
 Si lentent medica data purgatoria dextra,
 Adiecto piperis medicatur puluere calda.
 Sin autem longo decurrent intima fluxu,
 Atq; immane malum multo iam tempore gliscit,
 Torridus ex uino cortex potabitur oui.
 Ramentum niuei credunt prodesse Elephant.
 Arbore pyramæa cortex direpta medetur
 Axe sub atrito pix nigro mixta lyæo
 Immenſum poterit potu retinere fluorem:
 Nummis aut iussu cedrum cum mastice mîſces:
 Mollitamq; picem, & rasum de nauibus unguen
 Languida quo fidens medicamine membra fouebis.
 Proderit & pueris quos dentis origo fatigat
 Castaneas coxisse nuces, & sorba uetusta,
 Atq; apium, caulesq; rubus quos fundit acuta:
 Potio quæ fluidam consumpta morabitur alium.

Lumbricis, & tineis purgandis.

Q U I D non aduersum miseris mortalibus addit
 Natura? interno cum uiscere tinea serpens,
 Et lumbricus edax uinane inimica creentq;
 Quod genus assiduo laniat præcordia morsu.
 Sæpe etiam scandens oppletis faucibus hæret:
 Obsessaq; uias uitæ concludit hanelæ.
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus:
 Vel nepetæ tritum ex uino, uel lacte capellæ:
 Necnon & suas medica potu saceti.

Q. SERENI

Prodest prætereacum baccho persica frondis:
Democritus memorat mentæ conducere potum.
Sumitur abrotanum, necnon & uile melanthum:
Allia per sese sanant: aut ius coriandri.
Quin & marrubium decoctum, haustumq; inuabit,
Puleium'ue potens, & agreste iugatur anetum.
Synthesis hæc prodest unda mollita calenti.
Colo sedando.

CVM COLVS inuisum morbi genus intima carpit
Mande gleritam uolucrem, quam nomine dicunt:
Aut pauidi leporis madefactæ coagula pota:
Sine apio tritas nepetas cum mastice iunges.
Necnon & species ambas redolentis aneti,
Quarum decoctos patiens haurito liquores.

Vesicæ, & calculo purgando: & urinae provocandæ.

SI CUI uesicæ tardus cunctabitur humor
Hæc mora rumpetur uino peruicta uetusto.
Prodest & paruos acidos potare sabuci.
Aut hederæ suauis: aut lachrymosi trita synapi.
Necnon resinas ex oricia terebintho
In speciem eruiliæ paruos glomerabis in orbes:
Quos ternos tepida mixtos hausisse medella est.
Quondam etiam nimio præceps urina fluento
Irrigat exuias, obscenæq; inficit hymbri.
Ergo cinis nepetæ suauis uel proderit haustus:
Et uino tritus datur, aut cum lacte capellæ
Tum leporis cerebrum ex uino potare decabit.
Si dolor internam uesicæ concoquit aluum
Subueniet radix & frons epota cupressi:
Puleium'ue potens domitum feruentibus undis.
Si uero in lapides densus conuertitur humor
Qui retinet cursus, gemitumq; dolore frequentat,
Saxifragam, seu sarxeiphagon: suauerrere credens.
Præterea semen myrti syluestris iaccho,
Atq; oleo mixtum bibitur: nec deficit acetum:
Vinaq; sumantur fricta condita cumino.
Sine palumborum capitur finus aëriorum
Dulcicidis sparsus suauis, trituq; solutus.
Necnon obscenus capræ potabitur humor:
Obruit hic morbum, labefactus saxa remittit.

De conceptione,

De conceptione, & partu.

IRRITA coniugij sterilis si munera languent,
 Nec sobolis spes, multos iam uana per annos
 Faemineo fiat uitio res: nec ne silebo.
 Hoc poterit magni quartus monstrare Lucreti.
 Sed natura tamen medicamine uicta potenti
 Sæpe dedit foetus studio curante paratos.
 Aut igitur leporis consumit faemina uulnam:
 Aut ouis in stabulis fractas cum ruminat herbas
 Pendentem spumam molli deducit ab ore,
 Atq; illam meminit mixto potare falerno:
 Mercurialis item capitur communiter herba:
 Sic cubitum noctu coniunx festinat uterq;
 Ast ubi iam certum spondet prægnatio foetum,
 Ut facili uigeat seruata puerpera partu,
 Dictamnium bibit: & cochleæ manduntur edules.
 At si per menses minus octo moratus in aluo
 Irrumpit thalamos: & nexus soluit inertes,
 Pulei bene purgati tunc conuenit hymber,
 Cuius opem ueram casus mihi sæpe probarunt.
 Quin etiam sterces supponunt uulturis atri:
 Sentiat ut minime partus qui proximus urget.
 Oua etiam rutæ, & fragili miscentur anetho:
 Quæ diluta simul uino, atq; exhausta medentur.

Profluuio cuiusq; sanguinis, & matrici.

SI modicus pleno manat de corpore sanguis
 Subuenit: at nimius cum uita funditur ipsa.
 Quapropter multo naris completa cruore
 Cum fluit, attritus cimex conducit odore:
 Lana oleo madefit, sed nondum lota rosato:
 Hæc datur in nares, uel claudit densius aures.
 Contritis prodest cochleis obducere frontem:
 Aut galli cerebro, uel sanguine mitte columbæ.
 Quod nisi supprimitur, sanguis potandus & ipse est.
 Præterea pharys caput emetire papyris:
 Detrahe quod superest, aliò genitalia necte.
 Faemineas prodest illinc uincire mumillas.
 Menstruus immenso si profluit impete sanguis,
 Suauida lana malos remoratur subdita cursus.
 Mortua quin etiam producit corpora partus.

Q. Serenus.

x

Q. SERENI

Sed quæcunq; fluit uis immoderata cruoris,
 Subernus cortex calidis potatur in undis,
 Ante minutatim studio uincente terendus.
 Sed si forte cruor clausa cunctabitur aluo,
 Euleij calido purgatur fœmina potu.
 Aut molles nepetæ, aut rutæ quæcunq; bibentur.
 At si puniceos fundit uestigia liquores,
 Marrubium ex passo tritum perfunditur undis:
 Hi poterunt haustus rutilum purgare liquorem.
 Reliquias partus dictæ detrahit herba.
 Quod si fœminei properabit sanguinis hymber,
 Est qui frustra molæ percussu decutit uno:
 Quorum aliquod lanis tectum ad præcordia neffit
 Hæc simul incantans sibi debere cruorem,
 Ut lapis ille uisæ solitos iam desinit orbes.

Pilis quibuscunq; internecadis, quæ oculos impediunt.

NOBILIS hirsutus horret lasciuia setas,
 Et gaudet rapto nudari flore pilorum:
 Sed bona nonnunquam uellendi causa uidetur,
 Corpora cum releuat ratio manifesta salutis.
 Namq; oculos infesta pilorum tela lacessunt:
 Quodq; illis dederat uallum natura tuendis
 Inde inimica seges proprios desemit in orbes.
 Ergo locum crinis uulsi contingit cruore,
 Quem dat auis tremulis simulat quæ pellibus alas:
 Sanguine uel Ricini, quem nigro de cane uelles.
 Præterea quasq; uoles auertere setas,
 Atq; in perpetuum rediuiua obcludere tela,
 Corporibus uulsi saniem perducito ranæ.
 Sed quæ parua sita est, et rauco garrula questu,
 Necnon quæ stagnis cessantibus hæsit Hirundo
 Sumitur, et uiuens sania torretur in olla:
 Hæc acidis ungit permixta liquoribus artus,
 A uulsaq; uetat rursus percrecere sylvam.

Omnibus obscænis medendis.

DICENDVM Quæ sit membris medicina pudendis.
 Languidus antiquo purgatur penis iaccho:
 Ac super illinitur facunda felle aspellæ:
 Mane nouo myrti frondes commandere prodest.

Qui

Qui dolet, atq; illas in vulnus despuat ipsum.
 Fece etiam vini genitalia lauta leuantur:
 Et tumidos testes nerea lymphæ cohercet.
 Vel bulbi ex mulso, uel cera immista cupresso:
 Aut faba cum tepidis baccho decocta fluentis
 Ramicis immensum fertur cohibere tumorem.
 Far madidum lymphis: medica cum fronde cupressi:
 Vnde etiam potu frons hæc memoratur amica.
 Sin autem existit durum tibi glandibus inguen,
 Proderit induci coelheas cum melle minutas.
 Obscenos si ponè locos noua uulnera carpent,
 Horrentum mansa curantur, fronde ruborum.
 Aut si iam ueteri succedit fistula morbo,
 Mustellæ cinere immisso purgabitur ulcus.
 Sanguine tum ricini, quem bos gestauerit ante
 Herba chelidonie fertur cum melle mederi:
 Herbaq; cum seuo folijs de mille uocata.

Scies, & articulari morbo.

SAEPIVS cautus uicta coxendice morbus,
 Tersur, & gressus diro languore moratur:
 Populus alba dabit medicos de cortice potus:
 Necnon & teneræ gracili de fronde genistæ.
 Arreptos caules, acidoq; liquore madentes
 Sumere conueniet, rubic quoq; ducere potum:
 Aut ex irino cochleas haurire lyæo.
 Si uero articulos tabes inimica per omnes
 Hæserit: ex ficu betas ac melle ligabis
 Vel pelagolatices, simul & baccheia dona
 Sumere curabis: nimio sed parato uino.
 Ennius ipse pater dum pocula siccant iniqua,
 Hoc uitio tales fertur meruisse dolores.

Furunculo medendo.

CVM sanguis nimius puri commistus atroci
 Aestuât: & papulas alte sustollit acutas,
 Resinam misces, & saxis ordea fracta
 Conspersa hæc tepidis apponere conuenit undis:
 Vis & hyoscyami cæræ, sæuoq; ingratum
 Nectere: non minus hæc poterit nudicæ iuuare,
 Prætereaq; finum ex gallo, quem legeris albo,
 Imbribus ex acidis fidens appone dolenti.

Q. SERENI

Auribus aut pecudum molles expromito sordes:
Yngvine quo fosis dabitur mediana papillis.

Carboni medendo.

HORRENDVS magis est, perimit qui corpora carbo
Vrit hic inclusus, vitulia rumpit acerbus.

Hunc ueteres quondam uarijs pepulere medelis

Tertia nanq; titi, simul et centesima liui

Charta docet ferro talem candente dolorem

Exectum: aut potio raparum semine pulsum.

Ni fieret dicens uix septem posse diebus

Vitam produci, tanta est uolentia morbi.

Dulcacidum, laticemq; cumini semine iunges:

Atq; finum pariter paphiae compone columbae.

Hinc line duratas partes: et clausa uenena.

Præterea triti referant adoperta lupini.

Nonnullus calcem uiuam dissoluit aceto:

Fumantemq; niuem papulis apponit acerbis.

Est qui gallinae perducit stercore corpus:

Allia uel piperi parce commixta linuntur

Pythagoræ cognata leui condita cumino

Proderit, et madida fermentum polline turgens.

Pani, uonica, et serum depellendis.

SVNT alij, quos dura mouet natura tumores

Non minus horrendi, sed non ita perniciosi:

Vomica qualis erit: uel eidem proxima quædam.

Simplice resina miscentur hordea tinsa:

Et mulsos amnes: et purgamenta columbae:

His bene decoctis languentia membra fouentur.

Mollis odorato faba iungatur coriandro

Proderit appositum: mollitq; aperitq; tumorem.

Aut de phasganio radix decocta palustri:

Quæ salis admixto tondetur condimento.

Proderit et mansum, quod traxeris arbore uiscum.

Gramen Hyoscyami ceræ, seuq; uetusto

Conalia: mixtisq; locos perduce dolentes.

Exercere etiam corpus medicina potens est.

Onum defundis in fictile, deinde putamen

Marrubij succo implebis, post nalle liquenti:

Omnia consociata tepenti prospera pota

Sumuntur, referantq; malum, purgantq; leuantq;.

Igni

Igni sacro medendo.

EST etiam morbi species, quæ dicitur ignis:
Languida quo multo torrentur membra calore.
Vel tu uicino seuum bonis igne remittis,
Mollitumq; lines: dederis uel fotibus oua:
Sed non cocta dabis: sic torrida membra fouebis.
Lumbricus terræ mixto inducetur aceto:
Aut parili noua Ruta modo: sed iungis oliuum:
Ouaq; cum betis profusa super illita iritis.
Allia dant ancrem sociandum oleoq; giroq;
Vngue quo gliscens deponet flamma furorem.
Sæpe chelidonia pars candida iungitur oui,
Quæ medico potu, sed uili trita capeffer:
Admiscere memor lymphas, amnemq; salerni.
Podagræ depellendæ.

QVAEDAM sunt rabidæ medicamina summa podagræ
Cui ter tricenæ species epidaurius ipse
Dixit inesse deus: requiem tamen huic dare morbo
Faserit: Et tristem saltem mulcere dolorem.
Ergo age, Et arreptam salicis frondemq; librumq;
Cum uino tere: sic contractos perline nervos:
At cum prima mali sese ostentabit origo,
Fervida non timidus tolera cauteria plantis:
Seminecis uel hirci reſerato pectore calces
Inſere: sic diræ reprimes primordia pestis:
Aut ſi corruptus perſederit altius humor:
Trita cupreſſus ibi baccho iungetur acerbo,
Panibus Et teneris cohibebunt addita queſtus.
Parua ſabucus item eſt hircino collita ſeuo:
Triticeæq; acido manantes amne farine:
Aut nitidum ranæ decoctum niſcus oliuo:
Sine chelidonia ſucus ſale mixtus aceto.
Sunt quibus appoſita ſciatur hirudine ſanguis:
Non audita mihi ſit ſas, ſed lecta referre.
Hoc quidam rabidus morbo per tempora miſſis
Vicino plantis frumenti preſſit acervo:
Enaſitq; grauem caſu medicante dolorem.
Vulneribus ferro, aut uerberibus factis.
NATVRÆ uitijſ medicas obieciſſus artes:
Nunc Et fortune iaculis obſiſtere par eſt.
Q. Serenus.

x iij

Si cui forte lapis teneros violauerit artus,
Necte adipēs vituli, simul & tritē chamæsson.
Nec pudeat luteæ sterco producere porce.
Sin autem feno est laceratum uerberare corpus,
Tum lexiua cinis ceras dissoluit, & oua:
Admixtoq; oleo uibices comprimit attras.
Si uero infrenus manat de uulnere sanguis,
Purpura torretur conchili perlita succo:
Huius & atra cinis currentem detinet undam
Verrucæ quoq; defectæ frenare cruorem
Dicitur ambustus tyrio de uellere puluis.
Præterea nimios reserati uulneris amnes
Feniculi cinis astringit, uel fimbria porri:
Sive finus manni cum testis uritur oui,
Et reprimat fluidos miro medicamine cursus.
Vlneribus quibuscunq; casibus actis.

CVM magna humanæ sint pondera conditionis:
Tam multæ innumeri species mihi uulneris adsunt.
Vt nequeam proprijs cunctis adscribere curas.
Iisdem igitur monitis casus sanabimus omnes
Sic tamen, ut nullus medicinam eluserit error.
Ergo modus quicunq; obtingit uulneris atri,
Contritus cum melle dabit medicamina bulbus:
Herbaq; quæ folijs nomen de mille recipit.
Appositu prodest adipi permixta uetusto
Succida cum tepido nectetur lana lyæo:
Ambustus uel cinis complebit uulneris ora.
Concludit uero, uel frons, uel ramus ab ulmo.
Vt succis hederæ pulchrescat fœda cicatrix.

Ab homine, uel simia morsus.

SIVE homo, seu similis turpissima bestia nobis
Vulnera dente dedit: uirus simul intulit atrum
Betonicam ex puro prodest assumere baccho.
Necnon & raphani cortex decocta medetur:
Si trita admorsus fuerit circumlita membris.

serpentū morsibus, & uenenis pellendis.

CVSPIDE non quisquā, longe neq; cæde larissæ
Fulmine non gladij, uolucris nec felle sagittæ,
Quam citā uipereo potis est affligere ictu.
Quare aptam dicamus opem, succoq; medentes.

Cui

Cui nocuit serpens, fertur caput illius apte
 Vulneribus iungi: sanat quæ sauciat ipsa
 Vt larissæa curatus Telephus hasta.
 Proderit & caulem cum uino haurire sabuci:
 Aut coctum raphani librum, tritumq; ligare:
 Siue etiam excelsa folium de mole cupressi
 Mandabit lactens caprifici sacus opellam:
 Aut tithymalus atrox uulnus contrita perungit
 Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,
 Ex illo radix tepido potatur in amni.
 Ceruino ex foetu commixta coagula uino
 Sumuntur: quæ res membris agit atra uenena.
 Aut ferula radix potatur in hymbre lyæi
 Betonicae uel leues, gallinae aut iura uetustæ.
 Si uero horrendum uulnus fera iecerit aspis,
 Urinam credunt propriam conducere potu.
 Varronis fuit ista senis sententia: necnon
 (Plinius ut memorat) sumpti iuuat hymbes aceti.
 Dicendum & quæ sit præcorx medicina timenti:
 Cautio namq; potest diros peruertere morsus.
 Si iecur exectum tardo de uulture portes
 Erucis, uel si totos perduxeris artus,
 Quas prius attritis uehementi spargis aceto:
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis:
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.
 Toxica præterea qua sint pellenda medela
 Expediam: sanguis poterit prodesse caninus:
 Qui facili potu antidotos imitatur honestos.
 Vis & mirificos catus prædiscere odores:
 Aænsis quibus arceatur teterrima serpens,
 Aut styracem torres: aut duri uulturis alam:
 Vel nepetam: aut frondem rigida, strpemq; mirica.

Ichibus Scorpion, & moribus Muris cæci, uel Aranei.

SUNT minimæ species: sed diræ uulnere pestes
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallant:
 Scorpions ut grauis est, & araneus hæc mala semper
 Captant securos multa iam nocte sopores,
 Et documenta dedit nobis prostratus orion,
 Magna quod exiguis perimantur membra uenenis.

x iiij

At qui vulnus atrox inuassit scorpius ardens
 Continuo capitur: tunc digna cederet insus,
 Vulneribusq; actus fertur reuocare uenenum:
 Aut calidis pelagi lymphis loca laesa fouentur:
 Sine meri potu dissoluitur improba pestis.
 Ad cunctos autem morsus, ictusq; minorum:
 Casus aptus erit pauidæ de lacte capellæ:
 Cuius hoc assumi debet origani herba:
 Hæc duo mirificis curabunt icta medellis.
 Nec non feniculo calidum annectatur anethum
 Aut uinum sulphur siat cum fece lyæi:
 Exiguo piperis cerebrum conspergito galli:
 Quo lita sanescunt depulso membra dolore.
 Sin autem muris nocuit uolentia cæci,
 Quæ sola signauit uoluendis orbita plaustris,
 Illine: mira datur uili de puluere cura.

Subitaneo dolori, feбри, atq; ostro opo.

NON nunq̃ existit subiti noua causa doloris:
 Cuius origo latet, uerus reprimenda medellis.
 Nanq; chelidoniam mixto sale necere prodest:
 Velleraq; infuso recalentia sulphure sanant.
 Ostro opo lento concludit melle perungi.
 Sin autem calidæ depascent corpora febres,
 Tunc apij suauis leni sociatur oliuo:
 Membra lines: foruq; ferus mulcebitur ignis.
 Nec spernendus adeps, dederit quem bestia Melus.
 Semineis cerui lachrymam miscere liquori
 Conuenit: atq; artus illinc mulcere calentes:
 Febribus at longis galli des iura uetusti.

Ad Typum quartanæ.

NEC tu crede leuem dilato tempore febrem:
 Quæ spacium sibi dat, magis, ut cessando caleseat
 Lentato quæ crassatur quartana calore:
 Ni medicas adhibere manus discamus et herbas,
 Allia non pudeat terno cum amice trita,
 Et diluta mero medijs haurire diebus.
 Aut facilem icoris murini ducere fibram.
 Quatuor et duri iungantur scrupula bacchi:
 Mira est absinthii cum simplici potio lymphæ.
 Sume tribus digitis apprehensum semen anethi,

Tantundem

Tantumdem marathri, mulsim nec desit aceto,
In cuius cyatho prædicta salubriter hauris.
Illa quinetiam spartum suppone tument.
Aut leporis trepidi diluta coagula trade.
Prodest & potus sed mulsus doridis humor.
Quidam etiam miranda ferunt ueniente calore
Iurantes ludum ueneris, munusq; petendum.
Sed prius est oleo partus feruescere ranae
In triuijs, illoq; artus perducere succo.

Ad Typum tertianæ.

EST etiam alternis febris rediitina diebus:
Tempora discernens quasi iustæ pondera libræ:
Ut possis igitur talem prohibere firem,
Tu uolues cera sine caudis grana cumini,
Puniceaq; indes pelli, colloq; ligabis.
Pulei ramus lane uelatus amictu
Tempore suspecto medicos præbebit odores.
Præterea amex potatur tritus in ouo,
Horridus attractu, sed gustu commodus apte.

Ad Typum quotidianæ.

AT qui continuis non cessat adire diebus,
Sed tantum certis morbus discriminat horas,
Triticum metuit granum (si credere dignum est)
Quod latitans fracto fuerit sub pane repertum.
Nec non ossa iuuant septis inuenta domorum:
Conuenit hæc tereti pendentia subdere collo.
Multaq; præterea uerborum monstra silebo:
Nam febre uario de pelli carmine posse
Vana superstitio credit, tremulaq; parentes.

Hemitritæo depellendo.

MORTI ferum magis est, q̃ græcis hemitritæum
Vulgatur uerò: hoc nostra dicere lingua
Non potuere ulli: puto nec uoluere parentes.
Inscribis chartæ quod dicitur abra ca bra
Sæpius, & subter repetis, sed detrahe suam:
Et magis atq; magis desint elementa figuris:
Singula quæ semper rapies, & cætera figes,
Donec in angustum redigatur littera conum.
His lino nexis collum redimire memento.
Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.

Q. SERENI

Coryallum uero, si collonectere uelles:
Ne dubites illo ueros miscere smaragdos.
Talia languentis conducunt uincula collo:
Letalesq; abiget miranda potentia morbos.
Fracturis, & luxis sanandis.

INFANDVM dictu cunctis procul absit amicis:

Sed fortuna potens omen conuertat in hostes.
Vis indigna nouo si sparserit ossa fragore,
Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis:
Linthea deinde, superq; inductasnectere lanas:
Sapius & sucos conspargere pinguis oliui:
Bis septem credunt coalescere cuncta diebus:
Aut ueteri baccho caprae finus inde petulae:
Hoc aperit clausum, trahit haerens, sanat apertum.
Sin uero caput infestus colliserit ictus,
Ex oleo neeti uestis debebit arachnes:
Nesciet haec illinc, nisi cum sanarit, abire.
Quod si luxa suo decedent membra tenore,
Vrere faemineos crines, ac iungere seuum
Congruet, ac tali medicamine mota ligare.
Aut malam ex pingui tritam apposuisse inuabit:
Aut si conclusum seruauit tibia uulnus.
Stercus ouis placidae iunges, adipisq; uetustos:
Pandere quae poterunt ulcus, patuloq; mederi.
Neruis inactis, & dolentibus, atq; contractis.

H A V D quisquam credet disiectos uulnere neruos

Ad solitum rursus reuocari posse vigorem:
Sed prodest tetræ lumbricos indere tritos:
Quis uetus, & rancens sociari axungia debet.
Si uero occultus neruos dolor urit inertes,
Vulturis excisos adipis, rutamq; remitte:
Aut ceram, & tali recreabis languida fota.
Conuenit & pelagi calidis perfudier undis.
Carica cum betis lento uel melle inquitur:
Aut baccho madefacta ceres cum fronde cypressi:
Quo poteris potu recreare rigentia membra.
Sin autem subito replicantur corpora morbo,
Contractos reuocat neruos caryo sumpta columbae.
Aegris somno asciendo.

NON solum miseros teterrima febris adurit:

Sed super optato pergit uiduare sopore:
 Ne prosit placidi cœlestia munera somni.
 Charta igitur, uarijs quam pinxit littera uerbis
 Vritur, inde cinis calido potatur in amni.
 Prodest puleium capiti substernere sæpe.
 Proderit et mixtam lymphis potare cypressum
 Palladijs itidem succis, quos flore rosarum
 Iungis, et immisces madidum, tritumq; papauer:
 Quo lita frons facilem præbebit nocte quietem.
 Necnon mandragoræ gustu sopor additur altus.
 Dilue præterea glomeratam quam gerit intus
 Lanam aries inter geminæ coxendicis umbras:
 Inde soporati ducentur gutture potus.

Leithargiæ expellendæ.

DIXIMUS hanc sortem miseris mortalibus esse,
 Ut sint sæpe mala inter se contraria morbi,
 Deniq; nonnunq; somno sic membra grauantur,
 Ut coniungantur letho sopor altus acerbo.
 Ergo leui flamma torrentur cornua capræ:
 Quo nidore grauem depellent lumina somnum.
 Aut ueneris labrum, quæ dicitur herba bibetur:
 Quæ teritur prius: et uino confusa liquefat.
 Conueniunt acidis euphorbia mixta fluentis:
 Gramina uel rutæ, gemina si nare trahuntur.
 Quidam dira inbent septeno cimice trito
 Ut uitentur aquæ, cyathusq; bibatur earum:
 Hæc potiora putant, quam dulci morte perire.
 Comicali morbo medendo.

EST subiti species morbi, cui nomen ab illo est,
 Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.
 Sæpe etenim membris atro languore caducis:
 Consilium populi labes horrenda diremit.
 Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ
 Conceptum, talis quem sæpe ruina profundit.
 Prodest cum ueteri baccho fel multuris atrî,
 Sed cochlear plenum gustu tibi sufficit uno:
 Aut cruor ex prognæ mixtus cum polline thuris:
 Aut apium elixum: aut conditum melle fel agni:
 Marrubiumue pari confusum pondere mellis:

Q. SERENI

Cui tu terna dabis gustu cochlearia in uno.
Aptus mustelæ cinis est, & hirundinis unda.
Præterea pluvias hominis quas calva supina
Excepit proiecta sinu, consumere prodest:
Aut lapis ex nido uaga quem congescit hirundo
Vellitur: ex nexu fouet, attollitq; iacentem.
Pellitur (ut fama est) gustu quoq; langor anethi.
Regio morbo pellendo.

REGIUS est uero signatus nomine morbus:
Molliter hic quoniam celsa curatur in aula:
Huic rubia ex mulla fertur conducere lymphæ.
Allia trita dabis uino madefacta calenti.
Vellera cum uino suffiri sulphure prodest.

Detibus, uel strigis inquietatis infantibus.

NVDVM hoïem primû mundi natura profudit:
Insuper excruciat, niueis cum dentibus armat.
Collo igitur molli dentes ne dentur equini,
Qui primi fuerint pullo crescente caduci.
Aut teneris cerebrum ginguis illine porci:
Aut leporis niueo bibitur cum lacte caprino.
Præterea si forte premit stryx atra puellos,
Virosa immulgens exertis ubera labris,
Allia præcepit Titini sententia necti:
Qui ueteri claras expressit more togatas.
Combusturis igne, uel frigore factis.

SVNT diuersa quidem mala frigoris, atq; caloris:
Sed tamen amborum simili nocet ulcere uirus.
Illa quoq; uista putas, quæ sunt niue læsa rigente.
Conuersa in cinerem platani pila curat utrumq;
At uero ambustum flammis qui candidus oui
Sucus inest: penna inductus sanare ualebit.
Aut tu succosæ cinerem perducato lanæ:
Aut uinam ex oleo ueteri composito calorem:
Ordea uel franges, atq; oui candida iunges:
Adsit adeps porcæ: mira est hæc forma medelæ.
Iunge chelidonijs, ac sic line uulnera succis:
Quodq; recens ipsis glacies, azungia simplex
Mulcet: & ex facili grata est medicamine cura.
Venenis prohibendus.

VT tutus fias infestæ fraude nouercæ,

Vel quicunq; tuo arpetur liuidus auctu,
 Non expectatis eat obuia cura uenenis.
 Ante cibos igitur inglandis foetus edatur.
 Profunde electri uariantia pocula uirus.
 Præterea coctæ querno cum cortice lymphæ
 Conueniunt potus: demersa'ue ficus oliuo.
 Sæpe etiam raphanum prædixit nomen edendum.
 Antidotus uero multis mithridatia fertur
 Consociata modis: sed Magnus scrinia regis
 Cum raperet uictor, uilem deprehendit in illis
 Synthesin, & uulgata satis medicamina risit.
 Bis denum rutæ folium, salis & breue granum,
 Inglandesq; duas, terno cum corpore fici
 Hæc oriente die parco conspersa lyæo
 Sumebat, metuens, dederat quod pocula matri.
 Venenis datis.

SI nequit infandum præuerrere cautio uirus,
 Proximus ille gradus data pocula pellere cura.
 Lac asinæ, placidæq; bouis prodesse loquuntur.
 Betonicam ex paruo sumunt pleriq; lyæo
 Quod si hederæ succos, quæ truncos implicat altos
 In stilles paruis, poterunt haud ulla nocere
 Pocula, quæ quisquam senis uitiauerit herbis.
 Si quis Hyoscyamum gustarit lacte capellæ
 Exhausto rabidos poterit mulcere furores
 Vulneribus, & rei dubiæ curandis.

VULNERA tabescunt spacio uitiata dierum:
 Curaq; nil prodest, nec ducitur ulla cicatrix:
 Sed tamen herbarum tam mira potentia pollet,
 Vlcus annosi sinus ut coalescere possit:
 Marrubium si tu recoquas illoq; liquore
 Vultus atrox foveas, cineres uel hirundinis alte
 Inducas: leporis'ue aspersa coagula uino:
 Aut hederam baccho decoctam, & semen anethi:
 Aut cineres alni tardo cum melle ligentur.
 Lumbrici terræ poterunt conducere vulnus:
 Aut facilis lapathi coma latior ulcera purgat:
 Et comixtus adeps, sed nonnullo sale tactus.
 Pineæ præterea uino cum sulphure cortex:
 Et picæ cum spissa iam perditæ membra reponit.

Q. SERENI

Et pice cum spissa iam perditā membra reponit.
Verrucis tollendis.

INTERDVM existit turpi verruca papilla
Hinc quondam fabio uerum cognomen adhæsit;
Qui solus patræ cunctando restituit rem.
Id poterit uitium sanguis curare lacertæ:
Aut urina canis cum terra inducta madenti:
Aut herbæ succus, quæ fertur nomine lichen.
Est tithymalus item tali satis apta medellæ,
Si rupta immensos fundit verrucæ cruores,
Purpureo triti cinere de uellere prosunt,
Quod fuerit uero conchyli sanguine tinctum.

Hæmorrhoidis medendis.

EXCRV ciant turpes anum si forte papillæ,
Agrestis prodest radix super addita porri:
Ne uiolet, sana, in iuglandis fragmine clausum.
Sal niueum sumes, bethicum quem nomine dicunt,
Dulcia cumq; nigra iunges fuligine mella,
Apponesq; super: pellit medicina dolorem.

Sequuntur. XXVI. uersus, qui in alijs impressis
codicibus desiderantur.

Paralysi depellendæ. primo die ita agendum.

HVNC quicumq; cupis citius depellere murbum,
Protinus antidotum studio tu perface mûrum:
Salicet ut ualeas languenti ferre medelam.
Castoreas siliquas bis sex perquirere cura:
Tristis item digitis lympham metire duobus.
Deniq; tunc capies phyalam, quæ iustior extat:
Aut equidem flammæ. sed prunas subijce solleys.
Proderit interea tepidum potantibus illud:
Ieiunis sed enim potius præbere memento.

Secunda ita medendum est.

CVNQVE secunda dies orbi peruenierit omni
Haud alijs rebus prudens adiungere cures.
Castoris, atq; nouem siliquas appendito statim:
Atq; duos semis digitos metire memento.
In calice atq; probo lympham miscere duobus
Qui patitur tepidum languens hinc sorbeat ipse.

Tertia die ita curandum est.

GRATIOR atq; dies ternus cum uenerit imo,
Rurſus in ægroto conſtanter fer medicamen,
Caſtoreas ſiliquas iterum quæ pondere ſint ſex:
Hinc etenim binos digitos metire memento
De lymphæ liquida ſed enim ſubiungere cura
Et ſimili debes tepidum præbere modo tunc.

Ita peragendum eſt à quarta die uſq; ad ſextum,
Et à ſeptima uſq; ad nonam, à decima uſq; ad
duodecimam, Et mirifice prodeſt.

Quid quarta die, Et reliquis peragendum ſit.

QVARTVS Et ille dies conſentit. nec ne priori
Quintus Et eſt ſimilis percellens nanq; ſecundo.
Sextus itemq; ſimul concordat deniq; tertio:
Septimus uſq; nonum percurritur ordine primo:
Sic decimas currens conſcenditur ad duodenum.


* a b c d e f g h i k l m n o
p q r ſ t u x.

Omnes ſunt quaterniones, præter t. duernionem.

VENETIIS IN AEDIBVS ALDI, ET AN-
DREAE ASVLANI SOCERI MENSE
MARTIO. M. D. XXVIII.

005266 469









26. x